



الإدارة المركزية للتعليم العام
مكتب تنمية مادة العلوم

الكيمياء 2026

الصف الثاني الثانوي
الفصل الدراسي الأول

الواجب المنزلي

الأسبوع 2

إعداد:

أ. سامح منصور

أ. عبدالله عبدالواحد

مستشار مادة العلوم:

د. عزيزة رجب خليفة

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام:

د. هالة عبدالسلام خفاجي

الاداء المنزلى (الأسبوع الثانى)

أختر الاجابة الصحيحة:-

1- احسب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن خلط 20g من غاز أول أكسيد الكربون مع كمية وفيرة من غاز الأكسجين عند الظروف القياسية من الضغط و درجة الحرارة (STP) وفقاً للمعادلة التالية:



[C=12 g/mol, O=16 g/mol]

(ب) 8 L

(أ) 45 L

(د) 16 L

(ج) 23 L

2- عدد المولات من غاز يشغل حجم مقداره 4L عند 25°C و 1atm .

(ب) 0.93 moles

(أ) 0.18 moles

(د) 8.96 moles

(ج) 0.17 moles

3- احسب كتلة غاز الأكسجين اللازمة لتتفاعل تماماً مع 2.93×10^{21} ذرة من الماغنسيوم لتحضير أكسيد الماغنسيوم ؟

[O=16g/mol, Mg=24g/mol]

(ب) 6.18×10^{-4} g

(أ) 2.68×10^{-2} g

(د) 7.78×10^{-2} g

(ج) 1.56×10^{-1} g

4- يحترق غاز البروبان (C_3H_8) تماماً في كمية وفيرة من غاز الأكسجين (O_2) وفقاً للمعادلة التالية :



- اذا علمت أن 11.0 g من غاز البروبان احترقت تماماً ، فإن حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عند (rtp) يساوي


(ب) 30 L

(أ) 30 cm^3

(د) 55L

(ج) 18 L

5 - يتم الكشف عن أيون الفوسفات في ملحه الصوديومي باستخدام محلول نترات الفضة وفقاً للمعادلة التالية:



- إذا بدأت بعينة نقية من ملح فوسفات الصوديوم كتلتها 5g ، احسب كتلة الراسب المتكون؟

[$\text{Na}_3\text{PO}_4=164 \text{ g/mol}$, $\text{AgNO}_3=170\text{g/mol}$, $\text{NaNO}_3=85\text{g/mol}$, $\text{Ag}_3\text{PO}_4=419\text{g/mol}$]

(ب) 12.32 g

(أ) 12.77 g


(د) 5.00 g

(ج) 1.95g

6- يتفاعل غاز الميثان مع غاز الأكسجين وفقاً للمعادلة الآتية :-



- اذا اضيف 60g من غاز الأكسجين إلى 20g من غاز الميثان في اناء مغلق ، احسب كتل الغازات الناتجة في نهاية التفاعل.




7- يتم اختزال أكسيد الحديد (III) باستخدام غاز أول أكسيد الكربون وفقا للمعادلة التالية:



- زن المعادلة السابقة ثم احسب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون المتصاعد عند 273°K و 1 atm الناتج من تفاعل 1.6 g من أكسيد الحديد (III) مع 1.68 g من غاز أول أكسيد الكربون.
(Fe = 56 , O=16 , C=12)


8- تفاعل التعادل بين هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريتيك يتم وفقاً للمعادلة:-



- إذا أضيف 80 g من هيدروكسيد الصوديوم إلى 49 g من حمض الكبريتيك، حدد المواد المذابة في الماء عند نهاية التفاعل .

9- يمكن تحضير غاز النشادر (NH_3) من عنصريه ، غاز النيتروجين (N_2) و غاز الهيدروجين (H_2) :
- كم جرام من غاز النيتروجين تلزم لتحضير 72 L من غاز الأمونيا عند STP ؟
(N=14 g/mol, H=1 g/mol)

10- أحسب كتلة فلز الألومنيوم التي يمكن أن تتأكسد تماما ب 44.8L من غاز الأكسجين عند STP و وفقا للمعادلة التالية :





الإدارة المركزية للتعليم العام
مكتب تنمية مادة العلوم

الكيمياء 2026

الصف الثاني الثانوي
الفصل الدراسي الأول

التقييمات الأسبوعية

الأسبوع 2

إعداد:

أ. سامح منصور
أ. عبدالله عبدالواحد

مستشار مادة العلوم:

د. عزيزة رجب خليفة

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام:

د. هالة عبدالسلام خفاجي



التقييم الأسبوعي (الأسبوع الثاني)

السؤال (1):

- اليوريا سمد له أهمية خاصة في الزراعة ، يتم تحضيره صناعياً من تفاعل غاز الأمونيا (NH_3) وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) وفقاً للمعادلة غير المتوازنة التالية:



- (Atomic Masses: N=14.0 g/mol, C=12.0 g/mol, O=16.0 g/mol, H=1.0 g/mol)
- في تفاعل دفعي كبير، تم خلط 6.0×10^4 g من غاز الأمونيا (NH_3) مع 1.1×10^5 g من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2).

1. زن المعادلة الكيميائية.

2. استنتج العامل المحدد للتفاعل.

3. احسب كتلة اليوريا [$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$] (بالكيلوجرام) التي يمكن انتاجها من هذا التفاعل.

4. احسب كتلة المادة المتبقية من المتفاعل الآخر (بالكيلوجرام)

السؤال (2):

- قام أحد الطلاب بإجراء تجربة لتحضير أكسيد الحديد III (Fe_2O_3) عن طريق تفاعل فلز الحديد (Fe) مع غاز الأكسجين (O_2) عند درجة حرارة عالية. وفقاً للمعادلة المتزنة:



- بدأ الطالب بـ 11.17g من فلز الحديد الصلب (Fe) ليفاعل مع 4.48 لترًا من غاز الأكسجين (O_2) المقاس عند 25°C و 1 atm

$$[\text{Fe}=55.85 \text{ g/mol}, \text{O}=16.00 \text{ g/mol}]$$

1- ما هو العامل المحدد للتفاعل.

2- احسب الناتج من Fe_2O_3 بالجرامات.

3- احسب كتلة العامل المحدد للتفاعل اللازمة للتفاعل مع الزيادة من المتفاعل الآخر



السؤال (3):

- إذا علمت أن 7.3 g من حمض الهيدروكلوريك تلتزم لإتمام التفاعل مع عينة 12.5 g من كربونات الكالسيوم، وفقاً للمعادلة غير المتزنة التالية:




1- حدد ما إذا كانت العينة نقية أم غير نقية.

.....
حسب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون المتصاعد عند 298° K و 760 mmHg

3- احسب كتلة الشوائب في العينة إذا وجدت.

السؤال (4): اختر الإجابة الصحيحة: -

1- أمامك أربعة بالونات تحتوي على غازات مختلفة في نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط، ادرس الشكل جيداً ثم أجب.



- البالونات التي تحتوي على نفس عدد جزيئات الغاز هي:

(أ) البالونان (1) و (4)، لأنهما متساويان في الحجم تحت نفس الظروف من الحرارة والضغط

(ب) البالونان (2) و (3)، لأنهما يحتويان على أخف الغازات

(ج) البالونان (1) و (2)، لتقاربهما في الحجم

(د) جميع البالونات الأربعة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات

- إذا علمت أن حجم البالون (2) ضعف حجم البالون (3)، فإن النسبة بين عدد الجزيئات وعدد الذرات في البالونين على التوالي هي:

(أ) 1 : 2 لكل من عدد الجزيئات وعدد الذرات


(ب) 1 : 2 لعدد الجزيئات، و 4 : 1 لعدد الذرات

(ج) 2 : 1 لعدد الجزيئات، و 4 : 1 لعدد الذرات

(د) 1 : 4 لعدد الجزيئات، و 2 : 1 لعدد الذرات



- إذا علمت أن حجم البالون (1) يساوي 4.48 L عند 25 °C و 760 mmHg ، فإن حجم غاز البالون (2) اللازم للتفاعل تمامًا مع الغاز الموجود في البالون (1) وفقًا للمعادلة:



يساوي (L) :

(أ) 4.48

(ب) 2.24

(ج) 8.96

(د) 17.92

2- يتم تحضير غاز الأمونيا (NH₃) من تفاعل غاز النيتروجين (N₂) و غاز الهيدروجين (H₂):

- ما عدد جرامات غاز النيتروجين اللازمة لتحضير 72 لترًا من غاز النشادر عند STP ؟



ما عدد جرامات غاز النيتروجين اللازمة لتحضير 72 L من غاز النشادر عند STP؟


(أ) 35.99

(ب) 33.60

(ج) 42.00

(د) 44.99

3- يتم التفاعل بين فلز الألومنيوم (Al) وغاز الكلور (Cl₂) لإنتاج كلوريد الألومنيوم (AlCl₃) وفقًا للمعادلة التالية:



- قام كيميائي بخلط 20 g من الألومنيوم (Al) مع 30 g من غاز الكلور (Cl₂) في وعاء التفاعل.

- أي مما يلي يعبر عن المادة المحددة للتفاعل؟

(أ) الألومنيوم (Al)، لأن كتلته أكبر من كتلة الكلور

(ب) غاز الكلور (Cl₂)، لأن عدد مولاته (0.42 mol) أقل من الكمية اللازمة للتفاعل الكامل مع كل

الألومنيوم الموجود (0.74 mol)

(ج) كلا المادتين تستهلكان في نفس الوقت تمامًا

(د) لا يمكن تحديد المادة المحددة دون معرفة درجة الحرارة والضغط

- كتلة كلوريد الألومنيوم (AlCl₃) الناتجة من التفاعل تساوي تقريبًا (g) :

(أ) 18.8

(ب) 37.6

(ج) 49.4

(د) 75.2

- احسب كتلة (بالجرام) المادة المتفاعلة الزائدة المتبقية بعد انتهاء التفاعل



(ب) 12.4

(أ) 6.2

(د) 49.6

(ج) 24.8

