



جمهورية مصر العربية  
وزارة التربية والتعليم  
والتعليم الفني  
الادارة المركزية لشئون الكتب

# الرياضيات

الفصل الدراسي الأول  
الصف الأول الثانوي



للباحثين تطبيقات عملية في مجالات متعددة منها إنشاء الطرق والجسور وتنطيط المدح وإعداد خرائطها التي تعتمد على توازى المستقيمات والمستقيمات القاطعة لها وفق تناسب بين الواقع الحقيقي والظول في الرسم.

## إعداد

أ/ عمر فؤاد جاب الله

أ.د/ عصاف أبو الفتاح صالح

أ.د/ نبيل توفيق الضبع

أ.م.د/ عصام وصفي روحايل

أ/ سيرافيم إلياس إسكندر

أ/ كمال يونس كبشه

## مراجعة

أ/ سمير محمد سعداوي      أ/ فتحي أحمد شحادة

### إشراف علمي

مستشار الرياضيات

### إشراف تربوي

مركز تطوير المناهج

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

٢٠٢٠/٢٠١٩



# المقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدنا ونحن نقدم هذا الكتاب أن نوضح الفلسفة التي تم في ضوئها بناء المادة التعليمية ونوجزها فيما يلى:

- ١ التأكيد على أن الغاية الأساسية من هذا الكتاب هي مساعدة المتعلم على حل المشكلات واتخاذ القرارات في حياته اليومية، والتي تساعد على المشاركة في المجتمع.
- ٢ التأكيد على مبدأ استمرارية التعلم مدى الحياة من خلال العمل على أن يكتسب الطالب منهجية التفكير العلمي، وأن يمارسوا التعلم المترافق باللمسة والتشويق، وذلك بالاعتماد على تنمية مهارات حل المشكلات وتنمية مهارات الاستنتاج والتعليل، واستخدام أساليب التعلم الذاتي والتعلم النشط والتعلم التعاوني بروح الفريق، والمناقشة وال الحوار، وتقبل آراء الآخرين، والموضوعية في إصدار الأحكام، بالإضافة إلى التعريف ببعض الأنشطة والإنجازات الوطنية.
- ٣ تقديم رؤى شاملة متماسكة للعلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع (STS) تعكس دور التقدم العلمي في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى التركيز على ممارسة الطلاب التصرف الوعي الفعال حيال استخدام الأدوات التكنولوجية.
- ٤ تنمية اتجاهات إيجابية تجاه الرياضيات ودراستها وتقدير علمائها.
- ٥ تزويد الطلاب بثقافة شاملة لحسن استخدام الموارد البيئية المتاحة.
- ٦ الاعتماد على أساسيات المعرفة وتنمية طرائق التفكير، وتنمية المهارات العلمية، والبعد عن التفاصيل والخشوه، والابتعاد عن التعليم التقيني؛ لهذا فالاهتمام يوجه إلى إبراز المفاهيم والمبادئ العامة وأساليب البحث وحل المشكلات وطرائق التفكير الأساسية التي تميز مادة الرياضيات عن غيرها.

### وفي ضوء ما سبق روعي في هذا الكتاب ما يلى:

- ★ تقسيم الكتاب إلى وحدات متكاملة ومتراقبطة لكل منها مقدمة توضح أهدافها ودورها ومخطط تنظيمي لها والمصطلحات الواردة بها باللغة العربية والإنجليزية، ومقسمة إلى دروس يوضح الهدف من تدريسيها للطالب تحت عنوان سوف تتعلم، ويببدأ كل درس من دروس كل وحدة بالفكرة الأساسية لحتوى الدرس وروعى عرض المادة العلمية من السهل إلى الصعب ويتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتناول الربط بالمواد الأخرى والحياة العملية والتي تناسب القدرات المختلفة للطلاب وتراعي الفروق الفردية بينهم وتوّكّد على العمل التعاوني، وتكامل مع الموضوع.
- ★ كما قدم في كل درس أمثلة تبدأ من السهل إلى الصعب، وتشمل مستويات تفكير متعددة، مع تدريبات عليها تحت عنوان حاول أن تحل وينتهي كل درس ببند «تحقق من فهمك».
- ★ تنتهي كل وحدة بملخص للوحدة يتناول المفاهيم والتعليمات الواردة بالوحدة.

وأخيراً .. نتمنى أن تكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل لما فيه خير لأولادنا، ولصرنا العزيزة.  
والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل



# المحتويات

## الجبر والعلاقات والدوال

الوحدة  
الأولى

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| ٤  | حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد.                | ١ - ١ |
| ٩  | مقدمة عن الأعداد المركبة.                               | ٢ - ١ |
| ١٥ | تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.                      | ٣ - ١ |
| ١٩ | العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها. | ٤ - ١ |
| ٢٦ | إشارة الدالة.   | ٥ - ١ |
| ٣٣ | متباينات الدرجة الثانية في مجهول واحد.                  | ٦ - ١ |
| ٣٧ | ملخص الوحدة.  |       |

## التشابه

الوحدة  
الثانية

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| ٤٢ | تشابه المضلعات.                          | ١ - ٢ |
| ٤٨ | تشابه المثلثات.                          | ٢ - ٢ |
| ٦١ | العلاقة بين مساحتى سطحى مضلعين متشابهين. | ٣ - ٢ |
| ٧١ | تطبيقات التشابه فى الدائرة.              | ٤ - ٢ |
| ٧٩ | ملخص الوحدة.                             |       |

## نظريات التنااسب في المثلث

الوحدة  
الثالثة

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| ٨٢  | المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. | ١ - ٣ |
| ٩٤  | منصفا الزاوية والأجزاء المتناسبة.        | ٢ - ٣ |
| ١٠٣ | تطبيقات التنااسب في الدائرة.             | ٣ - ٣ |
| ١١٢ | ملخص الوحدة.                             |       |

## حساب المثلثات

الوحدة  
الرابعة

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| ١١٦ | الزاوية الموجهة.                               | ١ - ٤ |
| ١٢٤ | القياس الستيتني والقياس الدائري لزاوية.        | ٢ - ٤ |
| ١٣١ | الدوال المثلثية.                               | ٣ - ٤ |
| ١٣٩ | الزاويا المتنسبة.                              | ٤ - ٤ |
| ١٤٩ | التمثيل البياني للدوال المثلثية.               | ٥ - ٤ |
| ١٥٣ | إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية. | ٦ - ٤ |
| ١٥٧ | ملخص الوحدة.                                   |       |

## الجبر

### الوحدة

# الجبر وال العلاقات والدوال

## Algebra, Relations and Functions

### أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يكون معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد جبرياً وبيانياً.
- يحل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد بعمومية معادلة أخرى من الدرجة الثانية في متغير واحد.
- يوجد مجموع وحاصل ضرب جذري معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد.
- يبحث إشارة دالة.
- يوجد بعض معاملات حدود معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد بعمومية أحد الجذرين أو كليهما.
- يتعرف مقدمة في الأعداد المركبة (تعريف العدد المركب، قوى ت، كتابة العدد المركب بالصورة الجبرية، تساوى عددين مركبين).
- يتعرف المميز لمعادلة الدرجة الثانية في متغير واحد.
- يبحث نوع جذري معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد بعمومية معاملات حدودها.
- يحل مطالبات من الدرجة الثانية في مجهول واحد.

### المصطلحات الأساسية

Complex Number	عدد مركب	Equation	معادلة
Imaginary Number	عدد تخيلي	Discriminant of the Equation	جذر المعادلة
Powers of a Number	قوى العدد	إشارة دالة	Root of the Equation
Inequality	مطالبة	Sign of a function	معامل الحد

دروس الوحدة

الدرس (١ - ١): حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد.

## الدرس (١ - ٢): مقدمة عن الأعداد المركبة.

الدرس (١ - ٣): تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.

الدرس (١ - ٤): العلاقة بين جذرى معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها.

## الدرس (١ - ٥): إشارة الدالة.


الدرس (٦ - ١): متابيات الدرجة الثانية في مجهول واحد.

## الادوات المستخدمة

آلة حاسبة علمية - ورق مربعات - حاسب آلي - برامج رسومية

- بعض المواقع الإلكترونية مثل:

[www.phschool.com](http://www.phschool.com)



## تمثال لمحمد بن موسى الخوارزمي

لذة تاريخية

الجبر كلمة عربية استخدمها محمد بن موسى الخوارزمي (القرن التاسع الميلادي في عصر الخليفة العباسى المأمون) فى كتابه الذى ألفه، وكان عنوانه «الجبر والمقابلة»، والذى وضع فيه طرقاً أصلية لحل المعادلات، وبذلك يعتبر الخوارزمي هو مؤسس علم الجبر بعد أن كان الجبر جزءاً من الحساب. وقد ترجم الكتاب إلى اللغات الأوروبية بعنوان «الجبر» ومنها أحد كلمات «الجبر» (algebra).

والجذر هو الذى نرمز له حالياً بالرمز  $s$  (إشارة إلى حل معادلة الدرجة الثانية) وقد وضع الخوارزمى حلولاً هندسية لحل معادلات الدرجة الثانية التى تتفق مع طريقة إكمال المربع. واشتغل كثير من العلماء العرب بحل المعادلات، ومن أشهرهم عمر الخيام الذى اهتم بحل معادلات الدرجة الثالثة. وجدير بالذكر أنه ظهر فى بردية أحمس (ق.م ١٨٦٠) بعض المسائل التى يشير حلها إلى أن المصريين فى ذلك الحين قد توصلوا إلى طريقة لإيجاد مجموع المتتابعة الحسابية والمتتابعة الهندسية.

وقد وصل علم الجبر حالياً إلى درجة كبيرة من التطور والتجريد؛ فبعد أن كان يتعامل مع الأعداد أصبح يتعامل مع كيانات رياضية جديدة مثل: المجموعات، والمصفوفات والمتغيرات وغيرها.

والأمل معقود عليكم - أبناءنا الطلاب - في استعادة  
مجدنا العلمي في عصورة الذهبية المصرية الفرعونية  
والعصور الإسلامية، والتي حمل علماؤنا فيها لواء التقدم  
ومنشاعراً، المعرفة إلى العالم شرقاً وغرباً.



# ١ - ١

## سوف تتعلم

- مفهوم المعادلة الجبرية ذات المتغير الواحد.
- التمييز بين المعادلات وال العلاقات والدوال.
- حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد جبرياً وبيانياً.

# حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد

## Solving Quadratic Equations in One Variable



سبق أن درست المعادلات الجبرية في متغير واحد، وفي هذا الدرس سوف تدرس المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية في متغير واحد.

والآن سوف نستعرض ما سبق لك دراسته من المعادلات الجبرية ذات المتغير الواحد.

**١-** تسمى المعادلة:  $as^2 + bs + c = 0$  حيث  $a \neq 0$ . بأنها معادلة من **الدرجة الأولى** في **متغير واحد هو س** (لأن أكبر قوى فيها للمتغير س هو العدد ١).

**٢-** تسمى المعادلة:  $as^2 + bs + c = 0$  حيث  $a \neq 0$ . معادلة من **الدرجة الثانية في متغير واحد هو س** (لأن أكبر قوى فيها للمتغير س هو العدد ٢).

**وعلى ذلك** فالمعادلة:  $as^2 - bs + c = 0$ . تسمى معادلة من الدرجة الثالثة. (لأن أعلى س فيها للمتغير س هو ٣).

### Equations, relations and functions

### المعادلات والعلاقات والدوال

سبق أن درست حل معادلة الدرجة الثانية جبرياً كالتالي، بطريقتين:

**أولاً:** بتحليل المقدار  $as^2 + bs + c = 0$  حيث  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ .  
إذا كان ذلك ممكناً في ص).

**ثانياً:** باستخدام القانون العام، ويكون جذراً المعادلة  $as^2 + bs + c = 0$  هما:  
 $s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  حيث  $a$  معامل س،  $b$  معامل س،  $c$  الحد المطلق.

والآن سوف تدرس حل معادلة الدرجة الثانية بيانياً.

## المصطلحات الأساسية

Equation	معادلة
Relation	علاقة
Function	دالة
Factor	عامل
Coefficient	معامل

## الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية
- ورق رسم بياني

### حل معادلة الدرجة الثانية بيانياً

### Solving quadratic equation graphically

#### ذكر

#### المقدار الثالثي

$as^2 + bs + c = 0$  حيث  $a, b, c \in \mathbb{R}$   
تحلية كحاصل ضرب كثيري حدود  
معاملاتها أعداد صحيحة إذا وفقط إذا  
كان المقدار  $b^2 - 4ac$  مربع كامل

#### مثال

**١** حل المعادلة:  $s^2 + s - 6 = 0$  بيانياً،


ثم تتحقق من صحة الحل.

#### الحل

لحل المعادلة  $s^2 + s - 6 = 0$  بيانياً نتبع الآتي:

**★** نرسم الشكل البياني للدالة  $D$  حيث  $D(s) = s^2 + s - 6$

★ نعين مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات، فتكون هي مجموعة حل المعادلة.



**تذكر**  
إذا كان  $a, b$  أعداداً حقيقة  
وكان  $a \times b = 0$   
فإن:  $a = 0$  أو  $b = 0$

**أمثلة ملحوظات**

**اختبار الخط الرأسى**  
Vertical line test

**الخط الرأسى يقطع المنحنى**  
في نقطة واحدة فقط

**ليست دالة**  
الخط الرأسى يقطع المنحنى  
في نقطتين أو أكثر

لرسم الدالة  $d(s) = s^2 - 6s + 9$  نشيء جدولًا لبعض قيم  $s$ ، ثم نوجد قيم  $s$  المقابلة لها كالتالي:

٣	٢	١	٠	-١	-٢	-٣	-٤	$s$
٦	٠	-٤	-٦	-٦	-٤	٠	٦	$s^2 - 6s + 9$

★ نعين هذه النقاط في المستوى الإحداثي المتعامد، ونصل بينهما بمنحنى كما في الشكل المجاور.  
ومن الرسم نجد الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات وهي  $s = -3, 0, 3$  وبذلك تكون مجموعة حل المعادلة  $s^2 - 6s + 9 = 0$  هي  $\{0, 3\}$ .

يمكنك استخدام الحل الجبرى لكي تطابقه مع الحل البيانى كالتالى:

$$\text{المعادلة: } s^2 - 6s + 9 = 0$$

$$\text{تحليل المقدار الثلاثي: } (s-3)(s-2) = 0$$

$$\text{إما } s-3 = 0 \quad \text{أو} \quad s-2 = 0$$

$$\text{أي } s=3 \quad \text{أو} \quad s=2 \quad \text{مجموعة الحل هي } \{0, 3\}$$

### التحقق من صحة الحل:

$$\text{عندما } s = -3: \text{الطرف الأيمن للمعادلة} = (-3)^2 - 6(-3) + 9 = 6 - 3 - 9 = 0 \quad (\text{الطرف الأيسر})$$

$s = -3$  تتحقق المعادلة.

$$\text{عندما } s = 2: \text{الطرف الأيمن للمعادلة} = (2)^2 - 6(2) + 9 = 4 - 12 + 9 = 0 \quad (\text{الطرف الأيسر})$$

$s = 2$  تتحقق المعادلة.

### للحظ أن:

١- في التمثيل البيانى للعلاقة السابقة  $s = s^2 - 6s + 9$

↳ العلاقة تمثل دالة؛ لأن الخط الرأسى يقطع المنحنى في نقطة واحدة.

↳ المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقة.

↳ المدى هو  $[-6, \infty)$ .

٢- للتعبير عن الدالة يستخدم الرمز  $d(s)$  بدلاً من  $s$ ، ويُقرأ دالة  $s$ .

**تفكير ناقد:** ١- هل كل دالة علاقة؟ فسر ذلك بأمثلة.

٢- هل يمكن تمثيل العلاقات والدوال بمعادلات؟ فسر ذلك.


### حاول أن تحل

- ١ مثل العلاقة  $s = s^2 - 4$  بيانياً، ثم أوجد من الرسم مجموعة حل المعادلة  $s^2 - 4 = 0$ . وإذا كانت  $s = d(s)$  فيبين أن دالة، وحدد مجالها ومداها [ناقش معلمك].

### مثال

- ٢ **الربط بالفيزياء:** أطلقت قذيفة رأسياً بسرعة (ع) تساوي ٢٤,٥ متر/ث. احسب الفترة الزمنية (ن) بالثانوية التي تستغرقها القذيفة حتى تصل إلى ارتفاع ف مترًا، حيث (ف) تساوى ١٩,٦ مترًا، علماً بأن العلاقة بين ف، ن كالتالي:  $F = Un - 4n^2$ .

### الحل

$$\begin{aligned} \text{بالتعويض عن: } F &= 19,6 \text{ متر, } U = 24,5 \text{ متر/ث في العلاقة } F = Un - 4n^2 \\ \therefore 19,6 &= 24,5n - 4n^2 \text{ وبقسمة الطرفين على } 4,9 \\ \therefore 4 &= 5n - n^2 \quad \text{بالتبسيط} \\ \therefore n^2 - 5n + 4 &= 0 \quad \text{بتحليل المقدار الثالثي} \\ \therefore (n-1)(n-4) &= 0 \quad \text{أي أن: } n = 1 \text{ ثانية أو } n = 4 \text{ ثانية.} \end{aligned}$$


**تفسير وجود جوابين:** القذيفة تصل إلى ارتفاع ١٩,٦ مترًا بعد ثانية واحدة، ثم تستمرة في الحركة لأعلى حتى تصل لأقصى ارتفاع، ثم تعود إلى نفس الارتفاع مرة أخرى بعد ٤ ثوانٍ من لحظة إطلاقها.

### حاول أن تحل

- ٢ **الربط بالألعاب الرياضية:** في إحدى الألعاب الأولمبية قفز متسابق من منصة ارتفاعها ٨,٨ أمتار عن سطح الماء عالياً مبتعداً عنها، فإذا كان ارتفاع المتسابق عن سطح الماء ف مترًا بعد زمن قدره ن ثانية يتحدد بالعلاقة:  $F = 9,4n^2 + 2,4n + 8,8$  ، فأوجد لأقرب رقمين عشريين متى يصل المتسابق لسطح الماء؟

### نشاط

قم بزيارة الموقع الآتي:



### تمارين (١ - ١)

#### أولاً: الاختيار من متعدد

- ١ المعادلة:  $(s-1)(s+2)=0$  من الدرجة:

٥ الرابعة

٣ الثالثة

٢ الثانية

١ الأولى

- ٢ مجموعة حل المعادلة  $s^2 = s$  في ح هي:

٥  $\{1, 0\}$

٣  $\{1, -1\}$

٢  $\{1\}$

١  $\{0\}$

٣ مجموعه حل المعادله  $s^2 + 3 = 0$  فى ح هي:

$\phi$  ٥

{٣٦} ج

{٣٦-} ب

{٣-} أ


٤ مجموعه حل المعادله  $s^2 - 2s - 1 = 0$  فى ح هي:

{١} د

{١، -١} ج

ب

{١-} أ



٥ يمثل الشكل المقابل المنحني البياني لدالة تربيعية د.

مجموعه حل المعادله  $d(s) = 0$  فى ح هي:

ب ٤

{٢-} أ

{٤، -٢} د

ج

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

٦ أوجد مجموعه حل كل من المعادلات الآتية في ح:

ج  $(s - 4)^2 = 0$

ب  $s^2 + 3s = 0$

أ  $s^2 - 1 = 0$

ه  $s(s + 1)(s - 1) = 0$


ه  $s^2 + 9 = 0$

د  $s^2 - 6s + 9 = 0$


٧ يبين كل شكل من الأشكال الآتية الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية.

أوجد مجموعه الحل للمعادله  $d(s) = 0$  في كل شكل.


ج



ب



أ



٨ أوجد مجموعه الحل لكل من المعادلات الآتية في ح وحقق الناتج بيانياً:

ب  $s^2 - 3s = 0$

أ  $s^3 + 40 = 0$

د  $(s - 3)^2 = 0$

ج  $6s^2 - 5s = 0$

ه  $\frac{1}{3}s^2 - \frac{3}{5}s = 1$

ه  $s^2 + 12s = 0$

٩ حل المعادلات الآتية في ح باستخدام القانون العام مقرباً الناتج لرقم عشرى واحد.

ب  $s^2 - 6s + 7 = 0$

أ  $s^3 - 65 = 0$

د  $s^2 + 3s - 4 = 0$

ج  $s^2 + 6s + 8 = 0$

ه  $s^3 - 6s^2 - 4 = 0$

ه  $5s^2 - 3s - 1 = 0$

**١٠ أعداد:** إذا كان مجموع الأعداد الصحيحة المتتالية  $(1 + 2 + 3 + \dots + n)$  يعطى بالعلاقة  $\text{ج} = \frac{n}{n+1}$  فكم عددًا صحيحًا متاليًا بدءًا من العدد ١ يكون مجموعها مساوًياً:




١٧١ ب

٤٦٥ د

٧٨ أ

٢٥٣ ح

**١١** يبين كل شكل من الأشكال الآتية الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية في متغير واحد. أوجد قاعدة كل دالة من هذه الدوال.



إجابة كريم

$$\begin{aligned} & \therefore (س - 3)^2 = (س - 3) \\ & \therefore (س - 3)^2 - (س - 3) = 0 \\ & \therefore (س - 3)([س - 3] - 1) = 0 \\ & \text{بالتبسيط: } س - 3 = 0 \text{ أو } س - 4 = 0 \\ & \text{مجموعه الحل = } \{3, 4\} \end{aligned}$$

إجابة زياد

$$\begin{aligned} & \because (س - 3)^2 = (س - 3) \\ & \text{بقسمة الطرفين على } (س - 3) \text{ حيث } س \neq 3 \\ & \therefore س - 3 = 1 \text{ وبالتبسيط} \\ & \therefore س = 4 \\ & \text{مجموعه الحل = } \{4\} \end{aligned}$$

أي الحلتين صحيح؟ لماذا؟

**١٢ تفكير ناقد:** قذفت كرة رأسياً إلى أعلى بسرعة (ع) تساوى ٢٩,٤ متر/ث. احسب الفترة الزمنية (ن) بالثانية التي تستغرقها الكرة حتى تصل إلى ارتفاع (ف) متراً، حيث ف تساوى ٣٩,٢ متراً علماً بأن العلاقة بين ف، ن تُعطى كالتالي  $F = u - \frac{1}{2}gN^2$ .

## مقدمة عن الأعداد المركبة

## Complex Numbers

-




- سبق أن درست نظماً مختلفة للأعداد، وهي نظام الأعداد الطبيعية "ط" ونظام الأعداد الصحيحة "ص" ونظام الأعداد النسبية " $\frac{m}{n}$ " وغير النسبية " $n^{\frac{1}{m}}$ " وأخيراً نظام الأعداد الحقيقة "ع" ورأينا أن أي نظام ينشأ كتوسيح للنظام الذي يسبقه لحل معادلات جديدة لم تكن قابلة للحل في النظام السابق، وإذا تأملنا المعادلة  $x^2 = 1$  نجد أنها غير قابلة للحل في  $\mathbb{Q}$ ، إذ لا يوجد عدد حقيقي مربعه يساوي  $(-1)$  يتحقق المعادلة؛ لذا نحتاج لدراسة مجموعة جديدة من الأعداد تسمى مجموعة الأعداد المركبة.

يبين الشكل المجاور: التمثيل البياني للدالة  $y = x^3$ . نلاحظ من الرسم أن منحنى الدالة لا يقطع محور السينات؛ وبذلك لا يكون للمعادلة  $x^3 = y$  حلول حقيقية.

لذا كان من الضروري التفكير في مجموعة جديدة للأعداد لحل هذا النوع من المعادلات.

المصطلحات الأساسية

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| Imaginary Number | عدد تخيلي |
| Complex Number   | عدد مركب  |



## Imaginary number

العدد التخيلي

يعرف العدد التخييلي  $t$  بأنه العدد الذي مربعه يساوى  $(-1)$

أي أن:  $t^2 = 1$  لـ كل  $t \in \mathbb{H}$   $\Rightarrow t = \pm 1$  وله الخاصية  $t^{-1} = -t$

وتشمل الأعداد التي على الصورة ٢٤، -٥٣٦٢ ت بالأعداد التخيلية

الأدوات والوسائل

آلہ حاسمة علماء

**ذلك نكت**

$\Delta \tilde{A} = 2$

..... ت وهكذا.....

**تفكير ناقد:** إذا كان  $a$ ,  $b$  عددين حقيقيين سالبين، فهل من الممكن أن يكون  $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ? فسر ذلك بمثال عددي.

**للحظة**

ت يرمز لها بالرمز  $i$

**قوى التصحيحة: Integer powers of  $i$** 

العدد يحقق قوانين الأسس التي سبق لك دراستها، ويمكن التعبير عن القوى المختلفة للعدد كالتالي:

$$t^3 = t \times t \times t = -t$$

$$t^2 = 1$$

$$t^0 = t \times t \times 1 = t$$

$$t^2 = 1 - t^2 = 1 - 1 = 0$$

**وبوجه عام فإن:**  $t^{4n} = 1$  ،  $t^{4n+1} = t$  ،  $t^{4n+2} = -t$  ،  $t^{4n+3} = -t$  حيث  $n \in \mathbb{Z}$

**مثال**

١ أوجد كلّاً مما يأتي في أبسط صورة:

$$b) t^3$$

$$d) t^{4n+5}$$

$$c) t^{-61}$$

**الحل**

$$1) t^3 = (t^4)^7 \times t^2 = 1 - t^2 = 1 - 1 = 0$$

$$d) t^{4n+5} = t^{4n} \times t^5 = 1 \times (t^4)^n \times t^5 = 1 \times t^5 = t^5$$

$$c) t^{-61} = (t^4)^{-16} \times t^3 = 1 \times t^3 = t^3$$

**حاول أن تدل**

١ أوجد كلّاً مما يأتي في أبسط صورة:

$$a) t^{24}$$

$$b) t^{-37}$$

$$c) t^{43}$$

$$d) t^{51}$$


$$e) t^{29}$$

$$f) t^{42}$$

**Complex number****العدد المركب**

**العدد المركب** هو العدد الذي يمكن كتابته على الصورة  $A + Bt$  حيث  $A, B$  عددين حقيقيان.

ويبيّن الشكل التالي مجموعات الأعداد التي تُشكّل جزءاً من نظام العدد المركب.



إذا كان  $a, b$  عددين حقيقيين فإن العدد حيث  $z = a + bi$  يسمى عدداً مركباً، وتسمى  $a$  بالجزء الحقيقي للعدد المركب  $z$ ،  $b$  بالجزء التخييلي للعدد المركب  $z$ .

وإذا كانت  $b = 0$  فإن العدد  $z = a$  يكون حقيقياً، وإذا كانت  $a = 0$  فإن العدد  $z = bi$  يكون تخيلياً حيث  $b \neq 0$ .

### مثال

٢ حل المعادلة  $s^9 + 125 = 61$

#### الحل

$$\text{المعادلة } s^9 + 125 = 61$$

بإضافة  $(-125)$  إلى طرف المعادلة

بقسمة طرف المعادلة على  $9$

$$s^9 = -64$$

$$s^9 = -\frac{64}{9}$$

بأخذ الجذر التربيعي

$$s = \pm \sqrt[9]{-\frac{64}{9}}$$

تعريف العدد المركب

$$s = \pm \frac{8}{3}i$$

### حاول أن تدل

٢ حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$75 = 100 + s^4$$

$$b = s^5 + 245$$

$$0 = s^3 + 27$$

### Equality of two complex numbers

### تساوي عددين مركبين

يتساوى العددان المركبان إذا وفقط إذا تساوى الجزءان الحقيقيان وتتساويا الجزءان التخيليان.

إذا كان:  $a + bi = c + di$  فإن:  $a = c$  ،  $b = d$  والعكس صحيح

### مثال

٣ أوجد قيمتي  $s, c$  اللتين تتحققان المعادلة:  $s^2 - c^2 + (s - 2c)i = 5 + ti$  حيث  $s, c \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{C}$

#### الحل

بمساواة الجزأين الحقيقيين أحدهما الآخر وكذلك الجزأين التخيليين أحدهما الآخر

$$s^2 - c^2 = 5$$

$$s = 3, c = 1$$

بحل المعادلتين ينتج أن

### حاول أن تدل

٤ أوجد قيمتي  $s, c$  اللتين تتحققان كل من المعادلات الآتية:

$$(s^2 + 1) + 4ci = 12 - 5ti$$

## العمليات على الأعداد المركبة

### Operations on complex numbers

يمكن استخدام خواص الإبدال والتجميع والتوزيع عند جمع أو ضرب الأعداد المركبة، كما توضح ذلك الأمثلة التالية:

#### مثال

٤) أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي:

(٢ + ٣١٢) - (٤١٢)

(٧ - ٤١٢) + (١ + ٢١٢)

#### الحل

١) المقدار = (٧ - ٤١٢) + (١ + ٢١٢)

= (٢ + ٧) + (١ + ٤١٢)

= ٣ - ٩١٢

٢) المقدار = (٣ + ٢١٢) - (٤١٢)

باستخدام خاصية التوزيع = ٢ - (٣ - ٤١٢) + (٣ + ٢١٢)

بفك الأقواس = ٦ - ٨١٢ + ٩١٢ - ١٢١٢

حيث  $1^2 = -1$  = ١٢ + ٩١٢ - ٨١٢

بالتبسيط = ١٨ + ٦١٢ = (١٢ + ٦) + (٩ + ٨١٢)

#### حاول أن تحل

٤) أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي:

(٥ - ٦١٢) - (٤ - ٣١٢)

١) (٤ - ٣١٢) - (٧ - ٦١٢)

## العدنان المترافقان

### Conjugate Numbers

العدنان المركبان  $A + Bi$  ،  $A - Bi$  يسميان بالعددين المترافقين **مثلاً**  $4 - 3i$  ،  $4 + 3i$  عدنان مترافقان، حيث:

$$(1) (4 - 3i)(4 + 3i) = (4^2 - (3i)^2)$$

$$(الناتج عدد حقيقي) = 25 - 9i^2 = 25 - 9(-1) = 25 + 9 = 34$$

$$(2) (4 - 3i) + (4 + 3i) = 8 = (الناتج عدد حقيقي)$$

#### تفكير نقدي

هل بالضرورة أن يكون مجموع العددين المترافقين هو دائمًا عددًا حقيقياً؟ فسر ذلك.

هل بالضرورة أن يكون حاصل ضرب العددين المترافقين هو دائمًا عددًا حقيقياً؟ فسر ذلك.

**مثال**

٥ أوجد قيمتي س، ص اللتين تحققان المعادلة:

$$\frac{(ت+٢)(٤-ت)}{٤+٣} = س + ت \text{ ص}$$

**الحل**

$$س + ت \text{ ص} = \frac{٤-ت}{٤+٣}$$

$$\text{بضرب البسط والمقام في مرفق المقام } (٣ - ٤ت) \times \frac{١+٤}{٤-٣} = س + ت \text{ ص}$$

$$= س + ت \text{ ص} = \frac{٥-٤ت}{٢٥}$$

$$\text{بتطبيق تساوى عددين مركبين} = س + ت \text{ ص} = \frac{٣}{٥} - \frac{٤}{٥}ت$$

$$\text{أى أن: } س = \frac{٣}{٥}, \quad ص = -\frac{٤}{٥}ت$$

**حاول أن تدل**

٦ أوجد في أبسط صورة قيمة كل مما يأتي:

$$\frac{٤+٣}{٤-٥} ت$$

٥

$$\frac{-٣-ت}{٢-ت}$$

٦

$$\frac{٢٦}{٢-٣} ت$$

ب

$$\frac{٤-٦}{٢} ت$$

١

**مثال**

٦ **كهرباء:** أوجد شدة التيار الكهربى الكلية المار فى مقاومتين متصلتين على التوازى فى دائرة كهربية مغلقة، إذا كانت شدة التيار فى المقاومة الأولى  $٥ - ٣t$  أمبير وفى المقاومة الثانية  $٢ + t$  أمبير (علمًا بأن شدة التيار الكلية تساوى مجموع شدتي التيار المار فى المقاومتين).

**الحل**

$\therefore$  شدة التيار الكهربى الكلية = مجموع شدتي التيار المار فى المقاومتين.

$$\therefore = (٥ - ٣t) + (٢ + t)$$

$$= (٣ - ٥) + (٢ + t)t$$

$$= ٧ - ٢t \text{ أمبير}$$

**حاول أن تدل**

٦ إذا كانت شدة التيار الكهربى الكلية المار فى مقاومتين متصلتين على التوازى فى دائرة كهربية مغلقة تساوى  $٦ + ٤t$  أمبير، وكانت شدة التيار المار فى إحداهما  $\frac{١٧}{٤-t}$ ، فأوجد شدة التيار المار فى المقاومة الأخرى.

## تحقق من فهمك

١ تفكير ناقد: أوجد في أبسط صورة (١ - ت)

### تمارين (١ - ٣)

١ ضع كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

٥ ت  $t^{4n-1}$

٦ ت  $t^{4n+2}$

٧ ب  $t^{-4n}$

٨ ت  $t^{6n}$

٢ بسط كلاً مما يأتي:

٩  $(t^2 - t^4)(t^6 - t^4)$

١٠  $t^3(t^2 - t^4)$

١١  $\frac{18-6}{12-6} \times \frac{18-6}{12-6}$

٣ أوجد ناتج كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

١٢  $(t^2 + 2t + 2)(t^2 - 4t + 4) - (t^2 - 2t + 2)(t^2 - 5t + 2)$

١٣  $t^2(t^2 - 4t + 4) - (t^2 - 2t + 2)(t^2 - 5t + 2)$

٤ ضع كلاً مما يأتي على صورة  $A + Bt$ :

١٤  $t(1 + 2t^3 + 2t^6 + 4t^9)$

١٥  $(1 - 2t^3 + 2t^6) - (1 - 2t^3 + 2t^6)$

٥ ضع كلاً مما يأتي على صورة  $A + Bt$ :

١٦  $\frac{(t-3)(t+2)}{4t-3}$

١٧  $\frac{2-t}{t+3}$

١٨  $\frac{2+t}{t+1}$

٦ حل كل من المعادلات الآتية:

١٩  $3s^2 = 12 + 4c^2$

٢٠  $4u^2 = 72 + 20c^2$

٢١  $2t^2 = 15 + 10t$

٧ كهرباء: أوجد شدة التيار الكهربائي الكلية المار في مقاومتين متصلتين على التوازي في دائرة كهربائية مغلقة

إذا كانت شدة التيار في المقاومة الأولى  $4 - 2t$  أمبير، وفي المقاومة الثانية  $\frac{6}{t+2} - 3t$  أمبير

٨ اكتشف الخطأ: أوجد أبسط صورة للمقدار:  $(2 + 3t)^2 - (2 - 3t)^2$

إجابة كريم

$$(2 - 3t)^2 - (2 + 3t)^2 = (4 + 9 - 12t) - (4 + 9 + 12t) =$$

$$5 - 2(9 - 4) = 5 - 2(5) =$$

$$15 + 10t =$$

إجابة أحمد

$$(2 + 3t)^2 - (2 - 3t)^2 =$$

$$(4 - 9t^2) - (4 - 9t^2) =$$

$$12 = (9 + 4)(2 + 3t) = 13(2 + 3t) =$$

$$39 + 26t =$$

أى الحلول صحيح؟ لماذا؟

## **تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية**

-

## Determining the Types of Roots of a Quadratic Equation



## • كيفية تحديد نوع جذر المعادلة التربيعية

سبق أن درست حل معادلة الدرجة الثانية (المعادلة التربيعية) في متغير واحد في ح؛ وعلمت من خلال حل المعادلة أن عدد حلولها الحقيقة إما أن يكون حلين أو حلاً وحيداً مكرراً، أو لا يوجد حل للمعادلة في ح، فهل يمكنك إيجاد عدد جذور (حلول) معادلة الدرجة الثانية في ح دون حلها؟

### Discriminant

المميز

المطالبات الأساسية

وكلا الجذرین يحتوى على المقدار بـ ٤-أج.

يسمى المقدار بـ **أج** مميز المعادلة التربيعية، ويستخدم لتحديد نوع جذري المعادلة.

Root

12

### Discriminant

1

مثال

١) حدد نوع جذري كل من المعادلات الآتية:

$$\begin{aligned} \bullet &= 1 + 2s - s^2 \quad \text{(ب)} \\ \bullet &= 7 - s + s^2 \quad \text{(أ)} \\ \bullet &= 30 - s^2 + s \quad \text{(ج)} \end{aligned}$$

14

### **لتحديد نوع الجذرین:**

١٥

المميز = ب - ٤ أح

$$|\varepsilon| = (\nabla -) \circ \times \varepsilon - \mathbf{v} =$$

### حددان حقيقة مختلfan.

1996-1997  
Year 1997

$i = 1, j = 1, b = 1$

المميز = ب - ج

$$\cdot = 1 \times 1 \times \varepsilon - \varepsilon =$$

∴ الممیز یساوی صفرًا، إذن الجذران حقيقیان ومتساویان.




المميز =  $b^2 - 4ac$

$$95 = 30 \times 1 \times 4 - 25 =$$

$\therefore$  المميز سالب، إذن يوجد جذران مركبان متراافقان (غير حقيقيين).

ج)  $1 = 1, b = 5, c = -30$

لاحظ أن

شكل تخطيطي للدالة المرتبطة بالمعادلة	نوع الجذرين	المميز
	جذران حقيقيان مختلفان	$(b^2 - 4ac) < 0$
	جذر حقيقي واحد مكرر (جذران متساويان)	$b^2 - 4ac = 0$
	جذران مركبان متراافقان (غير حقيقيين).	$b^2 - 4ac > 0$

### حاول أن تحل

١ عين نوع جذري كل معادلة من المعادلات التربيعية الآتية :

أ)  $s^2 - 15s + 12 = 0$

ب)  $s(s+5) = 2(s-7)$

ج)  $s^2 - 4s = 0$

### مثال

٢ أثبت أن جذري المعادلة  $s^2 - 3s + 2 = 0$  مركبان وغير حقيقيين، ثم استخدم القانون العام لإيجاد هذين الجذرين.

#### الحل

أ)  $s^2 - 3s + 2 = 0$

$\therefore$  المميز =  $b^2 - 4ac$

$\therefore$  المميز سالب

القانون العام:  $s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$

$$s = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$$

جذرا المعادلة هما:  $\frac{3 + \sqrt{7}}{2}, \frac{3 - \sqrt{7}}{2}$

**تفكيير ناقد:** هل بالضرورة أن يكون جذراً المعادلة التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة عددين مترافقين؟ ووضح بمثال من عندك.

### حاول أن تدل

أثبت أن جذري المعادلة  $s^2 - 11s + 5 = 0$  مركبان، ثم استخدم القانون العام لإيجاد هذين الجذرين.

### مثال

إذا كان جذراً المعادلة  $s^2 + 2(k - 1)s + 9 = 0$  متساوين، فأوجد قيم  $k$  الحقيقية، ثم تحقق من صحة الناتج:

### الحل

التحقيق: عندما  $k = 4$

تصبح المعادلة:  $s^2 + 6s + 9 = 0$

ويكون لها جذران متساويان هما:  $-3, -3$

التحقيق: عندما  $k = -2$

تصبح المعادلة:  $s^2 - 6s + 9 = 0$

ويكون لها جذران متساويان هما:  $3, 3$

$b^2 - 4ac = 0$

$4(k - 1) \times 1 \times 4 - 2 = 0$

$4k^2 - 8k - 32 = 0$

$k^2 - 2k - 8 = 0$

$(k - 4)(k + 2) = 0$

$k = 4$  أو  $k = -2$

### حاول أن تدل

إذا كان جذراً المعادلة  $s^2 - 2ks + 7s + 9 = 0$  متساوين، فأوجد قيم  $k$  الحقيقية، ثم أوجد الجذرين.

### تمارين (١ - ٣)

#### أولاً: اختيار من متعدد:

١ يكون جذراً المعادلة  $s^2 - 4s + k = 0$  متساوين إذا كانت:

$$5 \quad k = 16 \quad 6 \quad k = 8 \quad 7 \quad k = 4 \quad 8 \quad k = 1$$

٢ يكون جذراً المعادلة  $s^2 - 2s + m = 0$  حقيقين مختلفين إذا كانت:

$$5 \quad m = 4 \quad 6 \quad m > 1 \quad 7 \quad m < 1 \quad 8 \quad m = 1$$

٣ يكون جذراً المعادلة  $L^2 - 12L + 9 = 0$  مركبين غير حقيقين إذا كانت:

$$5 \quad L = 1 \quad 6 \quad L < 4 \quad 7 \quad L > 4 \quad 8 \quad L = 4$$

#### ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

٤ حدد عدد الجذور وأنواعها لكل معادلة من المعادلات التربيعية الآتية:

$$5 \quad s^2 - 5s + 4 = 0 \quad 6 \quad s^3 + 10s^2 - 4s = 0$$

$$5 \quad 6s^2 - 19s + 35 = 0 \quad 6 \quad s^2 - 10s + 25 = 0$$

$$7 \quad (s - 1)(s - 7) = 2 \quad 8 \quad (s - 3)(s - 4) = 0 \quad 9 \quad (s - 11) - s(s - 6) = 0$$

٥ أوجد حل كل من المعادلات الآتية في مجموعة الأعداد المركبة باستخدام القانون العام.

**أ**  $s^2 - 4s + 5 = 0$

**ب**  $s^2 + 6s + 5 = 0$

**ج**  $s^2 - 7s + 6 = 0$

**د**  $s^2 - s + 1 = 0$

٦ أوجد قيمة  $k$  في كل من الحالات الآتية:

**أ** إذا كان جذراً للمعادلة  $s^2 + 4s + k = 0$  حقيقيين مختلفين.

**ب** إذا كان جذراً للمعادلة  $s^2 - 3s + 2 + \frac{1}{k} = 0$  متساوين.

**ج** إذا كان جذراً للمعادلة  $k s^2 - 8s + 16 = 0$  مركبين غير حقيقيين.

٧ إذا كان  $l, m$  عددين نسبيين، فأثبت أن جذري المعادلة:  $ls^2 + (l-m)s - m = 0$  عدادان نسبيان.

٨ يقدر عدد سكان جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٣ بالعلاقة:

$U = N + 1,2 + 91$  حيث ( $U$ ) عدد السكان بالمليون، ( $N$ ) عدد السنوات

**أ** كم كان عدد السكان عام ٢٠١٣؟

**ب** قدر عدد السكان عام ٢٠٢٣

**ج** قدر عدد السنوات التي يبلغ عدد السكان فيها ٣٣٤ مليوناً.

**د** اكتب مقالاً توضح فيه أسباب الزيادة المطردة في عدد السكان وكيفية علاجها.

٩ اكتشف الخطأ: ما عدد حلول المعادلة  $s^2 - 6s + 5 = 0$  في ح

إجابة كريم

$$b^2 - 4P = (-6)^2 - 4(-5) = 36 - (-20) = 56$$

$$76 = 40 + 36$$

الممíز موجب، فيوجد حلان حقيقيان مختلفان

إجابة أحمد

$$b^2 - 4P = (-6)^2 - 4(5) = 36 - 20 = 16$$

$$40 - 36 = 4$$

الممíز سالب، فلا توجد حلول حقيقة

١٠ إذا كان جذراً للمعادلة  $s^2 + 2s + (k-1) = 0$  متساوين، فأوجد قيم  $k$  الحقيقة، ثم أوجد الجذرین.

١١ تفكير ناقد: حل المعادلة  $s^2 - 4s + 25 = 0$  في مجموعة الأعداد المركبة.

# ٤ - ١

## العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها

The Relation Between Two Roots of the Second Degree Equation and the Coefficients of its Terms

### سوف نتعلم

- ◆ كيفية إيجاد مجموع الجذرين لمعادلة تربيعية معطاة.
- ◆ كيفية إيجاد حاصل ضرب الجذرين
- ◆ إيجاد معادلة تربيعية بمعطى معلومة معادلة تربيعية أخرى.

### فكرة و نقاش

نعلم أن جذري المعادلة  $x^2 - 8x + 3 = 0$  هما  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{3}{2}$   
 مجموع الجذرين  $= \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$   
 حاصل ضرب الجذرين  $= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

هل توجد علاقة بين مجموع جذري المعادلة ومعاملات حدودها؟  
 هل توجد علاقة بين حاصل ضرب جذري المعادلة ومعاملات حدودها؟

### تعلم

#### مجموع الجذرين وحاصل ضربهما

Sum and multiply of two roots

### المصطلحات الأساسية

- ◆ مجموع جذرين
- ◆ حاصل ضرب جذرين

Product of Two Roots

جذرا المعادلة التربيعية  $ax^2 + bx + c = 0$  هما:

$$-\frac{b}{a}, -\frac{c}{a}$$

وباعتبار أن الجذر الأول = ل، الجذر الثاني = م فإن:

$$L + M = -\frac{b}{a} \quad (\text{أثبت ذلك})$$

تعبر شفهيا في المعادلة التربيعية  $ax^2 + bx + c = 0$

أوجدل  $L + M$  ،  $L M$  في الحالات الآتية:

إذا كان  $a = 1$       ب      إذا كانت  $b = 1$

### الأدوات والوسائل

- ◆ آلة حاسبة علمية

### مثال

١ دون حل المعادلة أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة:

$$x^2 + 5x - 12 = 0$$

### الدل

$$\begin{aligned} L + M &= -\frac{b}{a} = -\frac{5}{1} = -5 \\ L M &= \frac{c}{a} = \frac{-12}{1} = -12 \end{aligned}$$

### حاول أن تحل

- ١ دون حل المعادلة أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري كل من المعادلات الآتية :
- ب**  $س^3 - 23 = 0$       **ج**  $(س - 3)(س + 2) = 0$

### مثال

- ٢ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة  $2s^2 - 3s + k = 0$  يساوى ١ فأوجد قيمة  $k$ ، ثم حل المعادلة.

### الحل

$$\text{حاصل ضرب الجذرين} = \frac{k}{2} \quad \therefore \quad k = 1$$

$$1 = 2, b = -3, c = 2$$

$$s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{7}s + 3}{4} = \frac{\sqrt{7}s + 3}{4} = \frac{16 - \sqrt{7}s + 3}{4} =$$

$$\text{مجموعة حل المعادلة هي } \left\{ \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}t, \frac{3}{4} - \frac{\sqrt{7}}{4}t \right\}$$

### القانون العام:

### حاول أن تحل

- ٣ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة  $3s^2 + 10s - j = 0$  هو  $\frac{8}{3}$  فأوجد قيمة  $j$ ، ثم حل المعادلة.

- ٤ إذا كان مجموع جذري المعادلة  $2s^2 + bs - 5 = 0$  هو  $-\frac{3}{2}$  فأوجد قيمة  $b$ ، ثم حل المعادلة.

### مثال

- ٥ إذا كان  $(1+t)$  هو أحد جذور المعادلة  $s^2 - 2s + 1 = 0$  حيث  $t \in \mathbb{C}$  فأوجد:

**أ** قيمة  $t$       **ب** الجذر الآخر

### الحل

$$1 = 1, b = -2, j = ?$$

**أ**  $1+t$  هو أحد جذري المعادلة

لأن الجذرين متراافقان ومجموعهما = ٢

**ب** الجذر الآخر =  $1-t$

**ب** حاصل ضرب الجذرين = ١

$$\therefore (1+t)(1-t) = 1$$

$$\therefore t = 1 \quad \therefore 1 = 1+t$$

### حاول أن تحل

- ٦ إذا كان  $(2+t)$  هو أحد جذور المعادلة  $s^2 - 4s + b = 0$  حيث  $t \in \mathbb{C}$  فأوجد

**أ** قيمة  $b$       **ب** الجذر الآخر.

## تعلم

### تكوين المعادلة التربيعية من جذراها

Forming the quadratic equation whose roots are known

بفرض أن  $L, M$  هما جذراً المعادلة التربيعية:  $s^2 + bs + c = 0$

بقسمة طرف المعادلة على  $a$ :  $\therefore s^2 + \frac{b}{a}s + \frac{c}{a} = 0$

أي  $s^2 - \left(\frac{-b}{a}\right)s + \frac{c}{a} = 0$

$\therefore L, M$  جذراً المعادلة التربيعية،  $L + M = -\frac{b}{a}$ ,  $L M = \frac{c}{a}$

$\therefore$  المعادلة التربيعية التي جذراها  $L, M$  هي:  $s^2 - (L + M)s + LM = 0$

### مثال

٤ كون المعادلة التربيعية التي جذراها  $-3, 4$

#### الحل

ليكن جذراً المعادلة هما  $L, M$

$\therefore L + M = 4 - (-3) = 7, L M = 4(-3) = -12$ . صيغة المعادلة التربيعية هي:  $s^2 - (L + M)s + LM = 0$

$\therefore$  المعادلة هي:  $s^2 - 7s - 12 = 0$

### مثال

٥ كون المعادلة التربيعية التي جذراها:  $\frac{1}{t+1}, \frac{1}{t-2}$

#### الحل

ليكن جذراً المعادلة هما  $L, M$

$$L = \frac{1}{t+1} = \frac{1-t}{1+t}$$

$$M = \frac{1}{t-2} = \frac{t+2}{t-2}$$

$$L + M = t - 2 - t = -2$$

$$LM = t - 2 - t = -4$$

$\therefore$  المعادلة التربيعية التي جذراها  $L, M$  هي:  $s^2 - (L + M)s + LM = 0$


$$\therefore s^2 + 4 = 0$$

### حاول أولاً تحل

٦ كون المعادلة التربيعية في كل مما يأتي بمعلومية جذرها:

أ  $5, 3, -5$  ب  $9, -9, -5$

$$\frac{3}{t}, \frac{3+2}{1-t}$$



**تفكيير ناقد:** الشكل المجاور يمثل مجموعة من منحنيات بعض الدوال التربيعية التي يمر كل منها بال نقطتين  $(-2, 3)$  و  $(2, 3)$ .  
أوجد قاعدة كل دالة من هذه الدوال.

### تكوين معادلة تربيعية بمعلمة معادلة تربيعية أخرى

Forming a quadratic equation from the roots of another equation

#### مثال

٦ إذا كان  $ل, م$  جذري المعادلة  $s^2 - 3s - 1 = 0$  فكون المعادلة التربيعية التي جذراها  $ل, م$ .

#### الحل

$$\begin{aligned} \text{المعادلة المعلومة بالتعويض عن } l = 2, b = -3, c = -1: l + m = -\frac{b}{2} = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}, l m = \frac{c}{2} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2} \\ \text{المعادلة المطلوبة بالتعويض عن } l + m = \frac{3}{2}, l m = -\frac{1}{2} \text{ في الصيغة } l^2 + m^2 = (l + m)^2 - 2lm \\ \therefore l^2 + m^2 = (l + m)^2 - 2lm = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4} \end{aligned}$$

للحظ أن

$$\begin{aligned} l^2 + m^2 &= (l + m)^2 - 2lm \\ (l - m)^2 &= (l + m)^2 - 4lm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore l^2 m^2 &= (lm)^2 \\ \therefore l^2 m^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

بالتعويض في صيغة المعادلة التربيعية:  $s^2 - (مجموع الجذرين) s + حاصل ضربهما = 0$

بضرب طرف المعادلة في ٤

$\therefore$  المعادلة التربيعية المطلوبة هي:  $4s^2 - 13s + 4 = 0$

#### حاول أن تحل

٦ في المعادلة السابقة  $s^2 - 3s - 1 = 0$  كون المعادلات التربيعية التي جذرا كل منها كالتالي:

ج)  $l + m, lm$

ب)  $\frac{l}{m}, \frac{m}{l}$

أ)  $\frac{1}{l}, \frac{1}{m}$

#### تحقق من فهمك

١ في كل مما يأتي كون المعادلة التربيعية التي جذراها:

ب)  $\frac{3}{4}, \frac{3}{4}$

أ)  $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$

ج)  $\sqrt[3]{-3}, \sqrt[3]{-3}$

٢ إذا كان  $ل, م$  هما جذرا المعادلة  $s^2 + 3s - 5 = 0$  فكون المعادلة التربيعية التي جذراها  $ل, م$ .

## تمارين (١ - ٤)

**أولاً: أكمل ما يأتى:**

- ١ إذا كان  $s = 3$  أحد جذري المعادلة  $s^2 + ms - 27 = 0$  فإن  $m = \dots$  ، الجذر الآخر =  $\dots$   
 ٢ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة  $: 2s^2 + 3s + 7 = 0$  يساوى مجموع جذري المعادلة:  
 $s^2 - (k + 4)s = 0$  فإن  $k = \dots$

- ٣ المعادلة التربيعية التي كل من جذرها يزيد ١ عن كل من جذري المعادلة  $s^2 - 3s + 2 = 0$  هي  
 ٤ المعادلة التربيعية التي كل من جذرها ينقص ١ عن كل من جذري المعادلة  $s^2 - 5s + 6 = 0$  هي

**ثانياً: الاختيار من متعدد**

- ٥ إذا كان أحد جذري المعادلة  $s^2 - 3s + j = 0$  ضعف الآخر فإن جـ تساوى  
 ٤      ٥      ٢      ١      ٤-

- ٦ إذا كان أحد جذري المعادلة  $s^2 - 3s + 2 = 0$  معكوساً ضريباً للآخر، فإن أ تساوى  
 ٣      ٥      ٢      ١      ١/٢

- ٧ إذا كان أحد جذري المعادلة  $s^2 - (b - 3)s + 5 = 0$  معكوساً جمعياً للآخر، فإن ب تساوى  
 ٥      ٤      ٣      ٢      ١- ٥

**ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية**

- ٨ أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري كل معادلة فيما يأتي:  
 ب      ٤      س  $^2 + 4s - 35 = 0$       ١

**٩** أوجد قيمة أ ثم أوجد الجذر الآخر للمعادلة في كل مما يأتي:

- أ إذا كان:  $s = -1$       أحد جذري المعادلة  $s^2 - 2s + 1 = 0$   
 ب إذا كان:  $s = 2$       أحد جذري المعادلة  $s^2 - 5s + 1 = 0$

**١٠** أوجد قيمة أ، ب في كل من المعادلات الآتية إذا كان:

- أ  $5, 2$       جذرا المعادلة  $s^2 + As + B = 0$

- ب  $7, 3$       جذرا المعادلة  $As^2 - Bs - 21 = 0$

- ج  $3, 1$       جذرا المعادلة  $As^2 - Bs + B = 0$

- د  $36, -36$       جذرا المعادلة  $s^2 + As + B = 0$

ابحث نوع الجذرين للكل من المعادلات الآتية، ثم أوجد مجموعة حل كل منها:

١١ ب)  $s^2 + 7s + 10 = 0$

أ)  $s^2 - 35s + 32 = 0$

١٢ د)  $s^3 - 8s^2 + 16s = 0$

ح)  $s(s-4)(s+5) = 0$

١٣ أوجد قيمة ج التي تجعل جذري المعادلة  $s^2 - 12s + 9 = 0$  متساوين.

١٤ أوجد قيمة ج التي تجعل جذري المعادلة  $s^2 - 5s + ج = 0$  متساوين، ثم أوجد الجذرين.

١٥ أوجد قيمة ك التي تجعل أحد جذري المعادلة  $s^2 + (ك-1)s - 3 = 0$  هو الممدوح الجمعي للجذر الآخر.

١٦ أوجد قيمة ك التي تجعل أحد جذري المعادلة:  $4كs^2 + 4s + ك^2 + 7 = 0$  هو الممدوح الضربي للجذر الآخر.

١٧ كون معادلة الدرجة الثانية التي جذراها كالتالي:

ب)  $-5t + 5$

أ)  $4t - 2$

١٨ د)  $t^3 + 1 = 0$

١٩ أوجد المعادلة التربيعية التي جذراها ضعفاً جذري المعادلة  $s^2 - 8s + 9 = 0$ .

٢٠ أوجد المعادلة التربيعية التي كل من جذريها يزيد بمقدار 1 عن كل من جذري المعادلة:  $s^2 - 7s - 9 = 0$ .

٢١ إذا كان ل، م جذري المعادلة  $s^2 - 7s + 3 = 0$ . فأوجد معادلة الدرجة الثانية التي جذراها:

ب)  $\frac{2}{L} + M$

د)  $L + \frac{2}{M}$

**مساحات:** قطعة أرض على شكل مستطيل بعدها ٦، ٩ من الأمتار، يراد مضاعفة مساحة هذه القطعة وذلك بزيادة طول كل بعد من أبعادها بنفس المقدار. أوجد المقدار المضاف.

**تفكيير ناقد:** أوجد مجموعة قيم ج في المعادلة التربيعية  $s^2 + 14s + 14 = 0$  بحيث يكون للمعادلة:

- أ جذران حقيقيان مختلفان.
- ب جذران حقيقيان متساويان.
- ج جذران مركبان.

**اكتشف الخطأ:** إذا كان  $L + M + 1$  هما جذرا المعادلة  $s^2 + 5s + 3 = 0$  فأوجد المعادلة التربيعية التي جذراها  $L, M$ .

### حل أميرة

$$\begin{aligned} 3 &= L + M \\ \therefore (L+1)(M+1) &= L + M \\ 2 - &= 2 + 5 - \\ \therefore (L+1)(M+1) &= L + M + (L + M) \\ 1 &= 1 + 3 - 3 \\ \text{المعادلة هي: } s^2 + 3s + 1 &= 0 \end{aligned}$$

### حل يوسف

$$\begin{aligned} 0 &= (L+1)(M+1) \\ \therefore L + M &= 2 + 5 - \\ 3 &= 1 + (L+M) \\ \therefore L + M &= 1 + 7 - \\ 6 &= 6 \\ \text{المعادلة هي: } s^2 + 7s + 6 &= 0 \end{aligned}$$

**تفكيير ناقد:** إذا كان الفرق بين جذري المعادلة  $s^2 + ks + 2 = 0$  يساوى ضعف حاصل ضرب جذري المعادلة  $s^2 + 3s + k = 0$  فأوجد  $k$ .



## إشارة الدالة

### Sign of the Function

٥ - ١



سوف تتعلم

سبق أن درست التمثيل البياني لدالة الدرجة الأولى ودالة الدرجة الثانية، وتعرفت على الشكل العام لمنحنى كل دالة. فهل يمكنك بحث إشارة كل من هذه الدوال؟ المقصود ببحث إشارة الدالة هو تحديد قيم المتغير  $s$  (مجال  $s$ ) التي تكون عندها قيمة الدالة  $d$  على النحو الآتي:

- موجبة، أي  $d(s) > 0$ .
- سالبة، أي  $d(s) < 0$ .
- مساوية للصفر  $d(s) = 0$ .




المصطلحات الأساسية

Sign of a function	إشارة دالة
Constant Function	دالة ثابتة
Linear Function	دالة خطية (دالة الدرجة الأولى)
Quadratic Function	دالة تربيعية (دالة الدرجة الثانية)

#### أولاً: إشارة الدالة الثابتة

إشارة الدالة الثابتة  $d$  حيث  $d(s) = j$  ( $j \neq 0$ ) هي نفس إشارة  $j$  لكل  $s \in \mathbb{R}$ . والشكل التالي يوضح إشارة الدالة  $d$ .



مثال

١ عين إشارة كل من الدوال الآتية:

ب)  $d(s) = 7$

أ)  $d(s) = 0$

الحل

إشارة الدالة موجبة لكل  $s \in \mathbb{R}$

أ)  $\therefore d(s) > 0$

إشارة الدالة سالبة لكل  $s \in \mathbb{R}$

ب)  $\therefore d(s) < 0$

**حاول أن تحل**

١ عين إشارات كل من الدوال الآتية:

$$D(s) = \frac{5}{s} \quad \text{ب}$$


$$D(s) = \frac{2}{s-1} \quad \text{أ}$$

**Second: Sign of the Linear Function**

$$s = -\frac{b}{a} \quad \text{عندما } D(s) = 0$$

**ثانيًا: إشارات دالة الدرجة الأولى (الدالة الخطية)**قاعدة الدالة د هي  $D(s) = bs + c$  ،  $b \neq 0$  ،

والشكل البياني التالي يوضح إشارة الدالة د.

**مثال**٢ عين إشارات الدالة د حيث  $D(s) = s - 2$  مع توضيح ذلك بيانياً:**الحل**

قاعدة الدالة:

رسم الدالة:

عندما  $D(s) = 0$ 

$$D(s) = s - 2$$

عندما  $s = 0$ 

$$\text{فإن } s = 2$$

فإن  $D(s) = 0$ 

من الرسم نجد أن:


« الدالة موجبة عندما  $s < 2$  »« الدالة  $D(s) = 0$  عندما  $s = 2$  »« الدالة سالبة عندما  $s > 2$  »**حاول أن تحل**٢ عين إشارات الدالة  $D(s) = -2s - 4$  مع توضيح ذلك بيانياً.

### ثالثاً: إشارة الدالة التربيعية

لتعيين إشارة الدالة التربيعية  $d$ , حيث  $d(s) = As^2 + Bs + C$

نوجد مميز المعادلة  $As^2 + Bs + C = 0$  فإذا كان:

**أولاً:**  $B^2 - 4AC < 0$ . فإنه يوجد للمعادلة جذران حقيقيان  $L$ ,  $M$ , وبفرض أن  $L < M$  تكون إشارة الدالة كما في الأشكال الآتية:



#### مثال

٢ مثل بيانياً  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 - 2s - 3$  ثم عين إشارة الدالة  $d$ .

الحل

بتحليل المعادلة:  $s^2 - 2s - 3 = 0$

$$(s - 3)(s + 1) = 0$$

فيكون جذراً المعادلة:  $s_1 = 3, s_2 = -1$

من الرسم نجد أن:


$\leftarrow d(s) < 0$  عندما  $s \in [-1, 3]$

$\leftarrow d(s) > 0$  عندما  $s \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$


$\leftarrow d(s) = 0$  عندما  $s \in \{-1, 3\}$

#### حاول أن تحل


٣ مثل بيانياً  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 - 6s + 6$  ثم عين إشارة الدالة  $d$ .



**ثالثاً:** إذا كان:  $b^2 - 4ac < 0$ . فإنه لا توجد جذور حقيقية، وتكون إشارة الدالة د مثل إشارة معامل س<sup>2</sup>، والأشكال التالية توضح ذلك.



### مثال



٤ مثل بيانيًّا د حيث  $d(s) = s^2 - 4s + 5$  ثم عين إشارة الدالة د.

### الحل

$$\begin{aligned} \text{المميز } (b^2 - 4ac) &= (4)^2 - 4 \times 1 \times 5 \\ &= 16 - 20 = -4 < 0 \end{aligned}$$


لذلك فإن المعادلة  $s^2 - 4s + 5 = 0$  ليس لها جذور حقيقية  
إشارة الدالة موجبة لـ  $\forall s \in \mathbb{R}$  لأن معامل  $s^2 > 0$ .

### حاول أن تدل


٤ مثل بيانيًّا د، حيث  $d(s) = -s^2 - 2s - 4$  ثم عين إشارة الدالة د.

**ثالثاً:** إذا كان:  $b^2 - 4ac = 0$ . فإنه يوجد للمعادلة جذران متساويان، وليكن كل منهما يساوى ل، وتكون إشارة الدالة د كالتالي:  
 $\Rightarrow d(s) = 0$  عندما  $s = L$

والأشكال الآتية توضح ذلك.



### مثال



٥ مثل بيانياً د حيث  $d(s) = 4s^2 - 4s + 1$  ، ثم عين إشارة الدالة د.

### الحل

$$\text{المميز } (b^2 - 4ac) = (4)^2 - 4 \times 4 \times 1 = 16 - 16 = 0$$

لذلك فإن المعادلة  $4s^2 - 4s + 1 = 0$  لها جذران متساويان.

$$\text{بالتحليل: } (2s - 1)^2 = 0$$

$$\text{بوضع: } s^2 - 1 = 0 \text{ تكون } s = \frac{1}{2}$$

$$d(s) < 0 \text{ عندما } s \neq \frac{1}{2} , \quad d(s) = 0 \text{ عندما } s = \frac{1}{2}$$

### حاول أن تحل

٦ مثل بيانياً د، حيث  $d(s) = -4s^2 - 12s - 9$  ثم عين إشارة الدالة د.

### مثال

٦ اثبت أنه لجميع قيم  $s \in \mathbb{R}$  يكون جذراً للمعادلة  $2s^2 - ks - k - 3 = 0$  صفر حقيقين مختلفين

### الحل

$$\text{المميز } (b^2 - 4ac) = (-k)^2 - 4 \times 2 \times (k - 3) = k^2 - 8k + 24$$

يكون جذراً للمعادلة حقيقين مختلفين إذا كان المميز موجباً

$$\text{نبحث إشارة المقدار } s = k^2 - 8k + 24$$

فيكون مميز للمعادلة  $k^2 - 8k + 24 > 0$  هو:

$$(-8)^2 - 4 \times 1 \times 24 = 64 - 96 < 0$$

لذلك فإن المعادلة  $k^2 - 8k + 24 > 0$  إشارة المقدار

$$s = k^2 - 8k + 24$$

فيكون مميز للمعادلة  $2s^2 - ks - k - 3 = 0$  صفر

$$2s^2 - ks - k - 3 = 0$$

ليس لها جذور حقيقة

موجبة لـ  $\forall s \in \mathbb{R}$  (لماذا؟)

موجب لـ  $\forall s \in \mathbb{R}$

حقيقيان مختلفان لـ  $\forall s \in \mathbb{R}$

لذلك فإن المعادلة  $k^2 - 8k + 24 > 0$  إشارة المقدار

فيكون مميز للمعادلة  $2s^2 - ks - k - 3 = 0$  صفر

لذلك فإن المعادلة  $2s^2 - ks - k - 3 = 0$  جذراً للمعادلة

### تحقق من فهمك

١ عين إشارة كل دالة من الدوال الآتية:

ج)  $d(s) = s^2 - 4$

ب)  $d(s) = 4 - s$

١ د)  $d(s) = s^2 - 3$

٩ د)  $d(s) = s^3 - s^2 + s^4$


هـ)  $d(s) = 4s + s^4$

د)  $d(s) = 1 - s^2$

## تمارين (١ - ٥)


أولاً: أكمل ما ياتي:

- ١ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = -5$  إشاراتها في الفترة
- ٢ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 + 1$  إشاراتها في الفترة
- ٣ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 - 6s + 9$  موجبة في الفترة
- ٤ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 - 2$  موجبة في الفترة
- ٥ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = -s$  سالبة في الفترة
- ٦ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = -(s+1)(s-2)$  موجبة في الفترة
- ٧ الدالة  $d$ , حيث  $d(s) = s^2 + 4s - 5$  سالبة في الفترة



٨ الشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الأولى في س:

- أ  $d(s)$  موجبة في الفترة
- ب  $d(s)$  سالبة في الفترة



٩ الشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الثانية في س:

- أ  $d(s) = 0$  عندما  $s \in$
- ب  $d(s) < 0$  عندما  $s \in$
- ج  $d(s) > 0$  عندما  $s \in$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

١٠ في التمارين من أ إلى ن عين إشارة كل من الدوال الآتية:

- أ  $d(s) = 2s$
- ب  $d(s) = 2s^2$
- ج  $d(s) = -3s$
- د  $d(s) = s^2 + 4$
- ه  $d(s) = -3s^2 - 2$
- و  $d(s) = s^2$
- ز  $d(s) = 2s^2 - 4$
- ح  $d(s) = s^2 - 4$

$$\text{ط } d(s) = 1 - s$$

$$\text{ك } d(s) = 2s - 3$$

$$\text{م } d(s) = s^2 - 8s + 16$$

$$\text{ي } d(s) = (s - 2)(s + 3)$$

$$\text{ل } d(s) = s^2 - s - 2$$

$$\text{ن } d(s) = -4s^2 + 10s - 25$$

١١ ارسم منحني الدالة  $d(s) = s^2 - 9$  في الفترة  $[-3, 4]$ ، ومن الرسم عين إشارة  $d(s)$ .

١٢ ارسم منحني الدالة  $d(s) = -s^2 + 2s + 4$  في الفترة  $[-3, 5]$ ، ومن الرسم عين إشارة  $d(s)$ .

١٣ **اكتشف الخطأ:** إذا كانت  $d(s) = s + 1$ ،  $r(s) = 1 - s$  فعين الفترة التي تكون فيها الدالتان موجبتين معاً.

#### حل أميرة

$$s = -1 \quad \text{تجعل } d(s) = 0$$

$d(s)$  موجبة في الفترة  $[-1, \infty]$

$$s = 1 \pm \sqrt{r(s)} = 0$$

$r(s)$  موجبة في الفترة  $[-1, 1]$

لذلك فإن الدالتين تكونان موجبتين معاً في الفترة

$$[-1, 1] \cap [0, 1] = [-1, 1]$$

#### حل يوسف

$$s = -1 \quad \text{تجعل } d(s) = 0$$

$d(s)$  موجبة في الفترة  $[-1, \infty]$

$$s = 1 \pm \sqrt{r(s)} = 0$$

$r(s)$  موجبة في الفترة  $[-1, 1]$

لذلك فإن الدالتين تكونان موجبتين معاً في الفترة

$$[-1, 1] \cap [0, 1] = [-1, 1]$$

أى الإجابتين يكون صحيحاً؟ مثل كلاً من الدالتين بيانياً وتأكد من صحة الإجابة.

١٤ **مناجم الذهب:** في الفترة من عام ١٩٩٠ إلى ٢٠١٠ كان إنتاج أحد مناجم الذهب مقدراً بالآلاف أوقية يتحدد بالدالة  $d : D(n) = 12n^2 - 96n + 480$  حيث  $n$  عدد السنوات،  $D(n)$  إنتاج الذهب

**أولاً:** ابحث إشارة دالة الإنتاج  $d$ .

**ثانياً:** أوجد إنتاج منجم الذهب مقدراً بالآلاف أوقية في كل من العامين ١٩٩٠، ٢٠٠٥

**ثالثاً:** في أي عام كان إنتاج المنجم مساوياً ٢٠١٦ ألف أوقية؟

# متباينات الدرجة الثانية في مجهول واحد

## Quadratic Inequalities

٦ - ١

سوف نتعلم Quadratic Inequalities

- حل المتباينة التربيعية في متغير واحد.

المتباينات التربيعية:



سبق أن درست متباينة الدرجة الأولى في مجهول واحد، وعلمت أن حل المتباينة معناه إيجاد جميع قيم المجهول التي تحقق هذه المتباينة، وتكتب على صورة فتر، فهل يمكنك حل متباينة الدرجة الثانية في مجهول واحد؟

لاحظ أن:


$$x^2 - x - 2 < 0$$

هي متباينة تربيعية كما هو موضح بالشكل التالي

المصطلحات الأساسية

Inequality

متباينة



الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية

من الشكل المقابل نجد أن:

﴿ مجموعه حل المتباينة

$$x^2 - x - 2 < 0 \text{ فى } \cup$$

$$\text{هي } [-1, 2] \cup [2, \infty]$$

﴿ مجموعه حل المتباينة

$$x^2 - x - 2 > 0 \text{ فى } \cup$$

$$\text{هما } [-\infty, -1] \cup (2, \infty)$$

حل المتباينة التربيعية



مثال

١ حل المتباينة:  $x^2 - 5x - 6 < 0$

### الحل

لحل هذه المتباعدة نتبع الخطوات التالية:

**خطوة (١):** نكتب الدالة التربيعية المرتبطة بالمتباعدة وذلك كالتالي:

$$d(s) = s^2 - 5s - 6$$


**خطوة (٢):** ندرس إشارة الدالة  $d$  حيث  $d(s) = s^2 - 5s - 6$ ,

ونوضحها على خط الأعداد بوضع  $d(s) = 0$ :

$$s^2 - 5s - 6 = 0$$

$$\therefore (s - 6)(s + 1) = 0$$

$$\therefore s = 6 \text{ أو } s = -1$$



**خطوة (٣):** تحدد الفترات التي تتحقق المتباعدة  $s^2 - 5s - 6 < 0$ .



فيكون مجموعة حل المتباعدة هي:  $[-1, 6)$

### حاول أن تحل

**١** حل كلاً من المتباعدات الآتية:

**ب**  $s^2 + 12s + 36 < 0$

**أ**  $s^2 - 8s + 16 < 0$

### مثال

**٢** حل المتباعدة:  $(s + 3)^2 - 10 \geq (s + 3)(s + 10)$ .

### الحل

$$\therefore (s + 3)^2 - 10 \geq (s + 3)(s + 10)$$

$$\therefore s^2 + 6s + 9 - 10 \geq s^2 + 13s + 30$$

$$\therefore s^2 + 9s + 9 - 10 \geq s^2 + 13s + 30$$

$$\therefore s^2 + 9s - 10 \geq s^2 + 13s + 30$$

$$\therefore s^2 + 9s - 10 = 0$$

$$(s + 10)(s - 1) = 0$$


المعادلة المرتبطة بالمتباعدة هي:

بالتحليل إلى عوامل:

مجموعة حل المعادلة:  $\{-10, 1\}$



ويوضح خط الأعداد التالي إشارة الدالة  $d(s) = s^2 + 9s - 10$  ★



وعلى ذلك فإن: مجموعة حل المتباينة هي :  $[-8, -1]$

### حاول أن تحل

٢ حل المتباينات الآتية:

$$١ 4s^2 + 5s \leq 0$$

$$٢ (s+3)^2(s+10) \leq 0$$

### تحقق من فهمك

١ ما الفرق بين معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد ومتباينة الدرجة الثانية في متغير واحد؟

٢ ما علاقة بحث إشارة الدالة التربيعية بحل متباينات الدرجة الثانية في متغير واحد؟

٣ اكتشف الخطأ: أوجد مجموعة حل المتباينة  $(s+1)^2 > 4(s-1)^2$


#### حل نور

$$\begin{aligned} & \because (s+1)^2 > 4(s-1)^2 \\ & \therefore s^2 + 2s + 1 > 4s^2 - 16s + 4 \\ & \therefore 15s^2 - 18s - 1 < 0. \end{aligned}$$

المعادلة المرتبطة بالمتباينة هي :

$$0 = 15s^2 - 18s - 1$$

مجموعه الحل هي  $\left\{ \frac{1}{5}, -1 \right\}$



بحث إشارة الدالة  $d$  حيث

$$d(s) = 15s^2 - 18s - 1$$

نجد أن:

مجموعه حل المتباينة هي  $[-1, \frac{1}{5}]$


#### حل يوسف

$$\begin{aligned} & \because (s+1)^2 > 4(s-1)^2 \\ & \therefore s+1 > 2(s-1) \quad \text{وذلك بأخذ الجذر} \\ & \quad \text{التربيعي للطرفين} \\ & \therefore -4s + s + 1 > 0 \\ & \therefore 3s + 1 > 0. \end{aligned}$$

المعادلة المرتبطة بالمتباينة هي :

$$0 = 3s + 1$$

مجموعه الحل هي  $\{1\}$



بحث إشارة الدالة  $d$  حيث

$$d(s) = 3s + 1$$

مجموعه حل المتباينة هي  $[-\infty, 1]$

٤ تفكير ناقد: أوجد مجموعة حل المتباينة  $(s+3)^2 - 10 > (s+3)^2$

## تمارين (١ - ٦)

أوجد مجموعة الحل للمتباينات التربيعية الآتية:

$$9 \geq s^2 \quad (1)$$

$$s^2 - 1 \geq 0 \quad (2)$$

$$s^2 - s^3 > 0 \quad (3)$$

$$s^2 + 5 \geq s^3 \quad (4)$$

$$s^2 - 5(s - 2) > 0 \quad (5)$$

$$s(s - 2) - 3 \geq 0 \quad (6)$$

$$(s^2 - 2)(s - 5) \geq 0 \quad (7)$$


$$s^2 - 5s \geq s^3 \quad (8)$$

$$s^3 - 6s \leq s^2 \quad (9)$$

$$s^3 + 11s \geq 3s \quad (10)$$

$$s^3 - 4s + 4 \leq 0 \quad (11)$$

$$s^3 - 4s + 7 > 0 \quad (12)$$



## ملخص الوحدة

١ حل المعادلة:  $A^2 + B^2 - C^2 = 0$  حيث  $A, B, C \in \mathbb{R}$ .

الطريقة
تحليل إلى العوامل
إكمال المربع
استخدام القانون العام
التمثيل البياني

٢ بحث نوع جذري المعادلة التربيعية

يسمى المقدار  $(B^2 - 4AC)$  بمميز المعادلة التربيعية الذي يبين نوع جذور المعادلة وعدد حلولها كالتالي:

• يوجد جذران حقيقيان مختلفان.  $(B^2 - 4AC) > 0$  ★

• يوجد جذر حقيقي واحد مكرر (جذران متساويان).  $B^2 - 4AC = 0$  ★

• يوجد جذران مركبان غير حقيقيين.  $B^2 - 4AC < 0$  ★

٣ الأعداد المركبة:

العدد المركب هو الذي يمكن كتابته على الصورة  $A + Bi$ , حيث  $A, B$  عدادان حقيقيان,  $B$  هو الجزء التخييلي، والجدول التالي يبين قواعد للأسس الصحيحة الموجبة:

$t^n$	$t^{n+2}$	$t^{n+4}$	$t^{n+6}$
$t$	$-t$	$t$	$-t$

تساوي عددين مركبين: إذا كان  $A + Bi = C + Di$ , حيث  $B = D$  والعكس صحيح

خواص العمليات: يمكن استخدام خواص الإبدال والتجميع والتوزيع عند جمع أو ضرب الأعداد المركبة، وعند جمع أو طرح الأعداد المركبة تجمع الأجزاء الحقيقة معاً وتجمع الأجزاء التخيلية معاً.

العدنان المترافقان: يسمى العددان  $A + Bi$ ,  $C + Di$  بالعدنان المترافقين

حيث ناتج جمعهما عدد حقيقي، وحاصل ضربهما عدد حقيقي أيضاً.

## ملخص الوحدة

٤ مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة التربيعية:

$$\text{إذا كان جذراً المعادلة } As^2 + Bs + C = 0 \text{، فإن: } M = \frac{-B}{A}, L = \frac{-C}{A}$$

٥ تكوين المعادلة التربيعية متى علم جذراها:

إذا كانت  $L, M$  جذري المعادلة التربيعية، فإن المعادلة التربيعية تكون على الصورة الآتية:

$$*(S - L)(S - M) = 0$$


$$*\text{ إذا كان } L + M = -\frac{B}{A}, L M = \frac{C}{A} \text{ فإن المعادلة هي } S^2 - (L + M)S + LM = 0$$

٦ بحث إشارة الدالة:

\* إشارة الدالة الثابتة  $D$ ، حيث  $D(S) = C$ ، ( $C \neq 0$ ) هي نفس إشارة  $C$  لـ كل  $S \in \mathbb{R}$ .

\* قاعدة الدالة الخطية  $D$  هي  $D(S) = BS + C$  ،  $B \neq 0$

فتقون  $S = -\frac{C}{B}$  عندما  $D(S) = 0$  والشكل التالي يمثل إشارة الدالة  $D$ :



\* لتعيين إشارة الدالة  $D$ ، حيث  $D(S) = AS^2 + BS + C$ ،  $A \neq 0$ . فإننا نوجد المميز

\* إذا كان:  $B^2 - 4AC > 0$ . فإن إشارة الدالة  $D$  تتحدد حسب الشكل التالي:



\* إذا كان:  $B^2 - 4AC = 0$ . فإنه يوجد للمعادلة جذران متساويان، وليكن كل منهما يساوى  $L$ ، وتكون إشارة الدالة  $D$  كالتالي: مثل إشارة  $A$  عندما  $S \neq L$  ،  $D(S) = 0$  عندما  $S = L$

\* إذا كان:  $B^2 - 4AC < 0$ . فإنه لا توجد جذور حقيقية، وتكون إشارة الدالة  $D$  مثل إشارة معامل  $S^2$ .

## ملخص الوحدة

٧ حل متباعدةات الدرجة الثانية في مجهول واحد:

لحل المتباعدةة التربيعية تتبع الخطوات الآتية :

- ١- نكتب الدالة التربيعية المرتبطة بالمتباعدةة  $S = D(S)$  في الصورة العامة.
- ٢- ندرس اشارة الدالة  $D$  المرتبطة بالمتباعدةة ونوضحها على خط الأعداد.
- ٣- تحديد مجموعة حل المتباعدةة طبقاً للفترات التي تتحققها.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتي:





## الهندسة

الوحدة

# التشابه Similarity

### أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- يتدرب على ما سبق دراسته بالمرحلة الإعدادية على موضوع الشابه.
- يتعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (المضلعان المتشابهان يمكن أن ينقسموا إلى ...).
- يتعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين تساوى ...).
- يتعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (إذا تناست أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين فإنهم يتشابهان).
- يتعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (إذا طابت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناست أطوال الأضلاع التي تحويها هاتان الزاويتان، كان المثلثان متشابهين).
- يتعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (النسبة بين مساحتي سطхи مثلثين متشابهين تساوى ...).

### المصطلحات الأساسية

Tangent	مماض	Corresponding Sides	أضلاع متناظرة	نسبة
Diameter	قطر	Congruent Angles	زوايا متطابقة	تناسب
	مماض خارجي مشترك	Regular Polygon	مضلع منتظم	قياس زاوية
Common External Tangent		Quadrilateral	شكل رباعي	طول
	مماض داخلي مشترك	Pentagon	شكل خماسي	مساحة
Common Internal Tangent	دواير متحدة المركز	Postulate/Axiom	بدائية	ضرب تبادلى
		Perimeter	محيط	طرف
Concentric Circles		Area of polygon	مساحة مضلع	وسط
	نسبة التشابه (معامل التشابه)	Chord	وتر	مضلعات متشابهة
Similarity Ratio		Secant	قاطع	مثلثات متشابهة

## دروس الوحدة

- الدرس (٢ - ١): تشابه المضلعات.
- الدرس (٢ - ٢): تشابه المثلثات.
- الدرس (٢ - ٣): العلاقة بين مساحتى سطحى مضلعين متباينين.
- الدرس (٢ - ٤): تطبيقات التشابه في الدائرة.

## الأدوات المستخدمة


حاسب آلي - جهاز عرض بيانات - برامج رسومية - ورق مربعات - مرآة مستوية - أدوات قياس - آلة حاسبة.



## نبذة تاريخية

عند البناء على قطعة من الأرض تحتاج إلى عمل رسم تخطيطي للمبني، ومن البديهي أنه لا يمكن عمل هذا الرسم الهندسي على قطعة من الورق تطابق قطعة الأرض، وإنما نلجأ إلى عمل صورة مصغرة تشبه الصورة الطبيعية للمبني، وذلك باتخاذ مقاييس رسم مناسب للحصول على هذا التصغير، وقياسات زوايا على الرسم، بحيث تساوى قياسات نظائرها في الواقع.


إذا تأملت الشكل الموضح في بداية الصفحة تلاحظ أن الطبيعة مليئة بأشكال تحتوي على أنماط تكرر نفسها بمقاييس مختلفة، ومن أمثلة ذلك أوراق الشجر، ورأس زهرة القرنيط، وشعيرات ساحل البحر. ملاحظة هذه الأنماط المتكررة أدى إلى ظهور هندسة جديدة منذ قرابة 40 عاماً، والتي تهتم بدراسة الأشكال ذاتية التماثل والتي تكرر بغير انتظام، وقد أطلق عليها اسم هندسة الفتايف أو هندسة الكسوريات fractals والتي سوف تدرسها في مراحل تعليمية تالية.



# تشابه المضلعات

## Similarity of Polygons

١ - ٢



يوضح الشكل المقابل للمضلع  $A B C D$  وصورته  $A' B' C' D'$  بتحويل هندسي.

**١** قارن بين قياسات الزوايا المتناظرة:

$\angle A = \angle A'$ ,  $\angle B = \angle B'$ ,  $\angle C = \angle C'$ ,  $\angle D = \angle D'$

ماذا تستنتج؟

**b** أوجد النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = \frac{DA}{D'A'}$

ماذا تلاحظ؟

عندما يكون للمضلعات الشكل نفسه، وإن اختلفت في أطوال أضلاعها، فإنها تسمى مضلعات متشابهة.

Similar polygons

المضلعان المتشابهان

**تعريف**  
«يتشابهان مضلعين لهما نفس العدد من الأضلاع إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة وأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة».



اللحوظ أن:

**١** في الشكل الموضح **يُنْدِ فَكْر وَنَاقْش** نجد:

**١** **الزوايا المتناظرة متطابقة:**  $\angle A \equiv \angle A'$ ,  $\angle B \equiv \angle B'$ ,  $\angle C \equiv \angle C'$ ,  $\angle D \equiv \angle D'$

**ب** **الأضلاع المتناظرة متناسبة:**  $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = \frac{DA}{D'A'}$

ولذلك يمكننا القول أن الشكل  $A B C D / A' B' C' D'$  يتشابه الشكل  $A B C D$

**٢** نستخدم الرمز (~) للتعبير عن تشابه مضلعين، ويراعى ترتيب كتابة رؤوسهما المتناظرة حتى يسهل كتابة النسب بين الأضلاع المتناظرة.




- مفهوم التشابه.
- تشابه المضلعات.
- مقاييس الرسم.
- المستطيل الذهبي والنسبة الذهبية.



- مضلعين متشابهان
- Similar Polygons
- مثلثات متشابهة
- أضلاع متناظرة
- Corresponding Sides
- زوايا متطابقة
- مضلع منتظم
- شكل رباعي
- شكل خماسي
- نسبة التشابه (معامل التشابه)
- Similarity Ratio



- حاسب آلي
- جهاز عرض بيانات
- برامج رسومية
- ورق مربعات
- أدوات قياس
- آلة حاسبة



إذا كان المضلع  $A-B-C-D$  ~ المضلع  $S-J-U-L$  فإن:


**أ**  $\Delta A \equiv \Delta S$ ,  $\Delta B \equiv \Delta J$ ,  $\Delta C \equiv \Delta U$ ,  $\Delta D \equiv \Delta L$

**ب**  $\frac{AB}{SC} = \frac{BJ}{SU} = \frac{CD}{JU} = k$  (نسبة التشابه)،  $k \neq 0$

ويكون معامل تشابه المضلع  $A-B-C-D$  للمضلع  $S-J-U-L$  =  $k$ ,

ومعامل تشابه المضلع  $S-J-U-L$  للمضلع  $A-B-C-D$  =  $\frac{1}{k}$

### مثال



١ في الشكل المقابل: المضلع  $A-B-C-D$  ~ المضلع  $H-Z-W-O$ .

**أ** أوجد معامل تشابه المضلع  $A-B-C-D$

للمضلع  $H-Z-W-O$ .

**ب** أوجد قيم  $s$ ,  $j$ .

### الحل

$\therefore$  المضلع  $A-B-C-D$  ~ المضلع  $H-Z-W-O$

فيكون:  $\frac{AB}{HZ} = \frac{BC}{ZW} = \frac{CD}{WO} = \frac{DA}{OH} = k$  = معامل التشابه،


$$\frac{12}{8} = \frac{15}{s} = \frac{8}{6} = \frac{10}{j}$$

**أ** معامل التشابه =  $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

**ب**  $s = \frac{15}{\frac{3}{2}} = 10 \text{ سم}$ ,  $j = \frac{10}{\frac{3}{2}} = 7 \text{ سم}$

### حاول أن تحل

١ بين أيّاً من أزواج المضلعات التالية تكون متشابهة، واكتب المضلعات المتشابهة بترتيب الرؤوس المتناظرة وحدّد نسبة التشابه.



## فكرة

هل جميع المربعات متشابهة؟

هل جميع المستطيلات متشابهة؟

هل جميع المعينات متشابهة؟

هل جميع متوازيات الأضلاع متشابهة؟ فسر إجابتك.

## للحظة

- ١- لكي يتتشابهان مضلعين يجب أن يتتوفر الشرطان معًا، ولا يكفي توافر أحدهما دون الآخر.

- ٢- المضلعين المتطابقان يكونان متشابهين، وذلك لتتوفر شرطا التشابه ( $\text{المضلע } M \sim \text{المضلع } M'$ ), ويكون معامل التشابه لهما عندئذ مساوياً (واحد) ولكن ليس من الضروري أن يكون المضلعين المتشابهان متطابقين ( $\text{المضلع } M \not\equiv \text{المضلع } M'$ ) كما في الشكل المقابل.

- ٣- المضلعين المشابهان ثالث متشابهان  
إذا كان  $\text{المضلع } M \sim \text{المضلع } M'$ ،  
 $\text{المضلع } M' \sim \text{المضلع } M''$   
فإن:  $\text{المضلع } M \sim \text{المضلع } M''$

- ٤- كل المضلعين المنتظمات التي لها نفس العدد من الأضلاع تكون متشابهة. لماذا؟

## مثال

- ٢- في الشكل المقابل:  $\triangle ABC \sim \triangle DEH$  و  
 $DH = 8\text{ سم}$  ،  $EH = 9\text{ سم}$  ،  $ED = 10\text{ سم}$ .  
إذا كان محيط  $\triangle ABC = 81\text{ سم}$ .  
أوجد أطوال أضلاع  $\triangle ABC$ .

## الحل

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEH$$

$$\therefore \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EH} = \frac{AC}{DH} = \frac{\text{محيط } \triangle ABC}{\text{محيط } \triangle DEH}$$


$$\text{ويكون: } \frac{AB}{8} = \frac{BC}{9} = \frac{AC}{10} = \frac{81}{27}$$

$$\therefore AB = 8 \times \frac{81}{27} = 24\text{ سم} , BC = 9 \times \frac{81}{27} = 27\text{ سم} , AC = 10 \times \frac{81}{27} = 30\text{ سم}$$

(خواص التناوب)






**لاحظ أن:**

**إذا كان** المضلع  $M$ ,  $\sim$  المضلع  $M'$ , **فإن**  $\frac{\text{محيط المضلع } M}{\text{محيط المضلع } M'} = \text{نسبة التشابه}$  (معامل التشابه)

**حاول أن تدل****٢** في الشكل المقابل:المضلع  $A'B'C' \sim$  المضلع  $S'U'L'$ **أ** احسب  $U'L'$  ( $\angle S'U'L'$ ), طول  $A'$ **ب** إذا كان محيط المضلع  $A'B'C' = 19,5$  سمأوجد محيط المضلع  $S'U'L'$ .**Similarity ratio of two polygons****معامل التشابه لمضلعين:**ليكن  $k$  معامل تشابه المضلع  $M$ , للمضلع  $M'$ ,**إذا كان:**  $k > 1$  **فإن** المضلع  $M$ , هو تكبير للمضلع  $M'$ , $k < 1$  **فإن** المضلع  $M$ , هو تصغير للمضلع  $M'$ , $k = 1$  **فإن** المضلع  $M$ , يطابق المضلع  $M'$ .**وبصفة عامة** يمكن استخدام معامل التشابه في حساب أبعاد الأشكال المتشابهة.

## تمارين ٢ - ١

١) بين أيّاً من أزواج المضلعات التالية تكون متشابهة، واكتب المضلعات المتشابهة بترتيب الرؤوس المتناظرة، وحدد معامل التشابه (الأطوال مقدرة بالسنتيمترات).



٢) إذا كان المضلع  $أب جد \sim$  المضلع  $س ص ع ل$ ، أكمل:

$$\text{ب} \quad أب \times ع ل = س ص \times$$

$$\text{أ} \quad \frac{أب}{ب ج} = \frac{ص ع}{ص ع}$$

$$\text{د} \quad \frac{\text{محيط المضلع}}{\text{محيط المضلع}} = \frac{س ص}{أب}$$

$$\text{ج} \quad \frac{ب ج + ص ع}{ص ع} = \frac{ل س}{ل س}$$



٣) المضلع  $أب جد \sim$  المضلع  $س ص ع ل$ . فإذا كان:  $أب = 32$  سم،  $ب ج = 40$  سم،  $س ص = 3 - m$ ،  $ص ع = m + 1$ . أوجد قيمة  $m$  العددية.

٤) مستطيل بعدها ١٠ سم، ٦ سم. أوجد محيط ومساحة مستطيل آخر مشابه له إذا كان:




ب) معامل التشابه ٤.

أ) معامل التشابه ٣.

- ٥ في كل من الأشكال التالية المضلع  $M$ ،  $\sim M$ ، المضلع  $M$ ،  $\sim M$ ، المضلع  $M$ ،  $\sim M$ .  
أوجد معامل تشابه كل من المضلع  $M$ ، المضلع  $M$ ، للمضلع  $M$ .




- ٦ المضلعات الثلاثة التالية متشابهة. أوجد القيمة العددية للرمز المستخدم في القياس.



- ٧ مستطيلان متشابهان بُعدا الأول ٨ سم، ١٢ سم، ومحيط الثاني ٢٠٠ سم. أوجد طول المستطيل الثاني ومساحته.

### نشاط




- ٨ هندسة معمارية: يوضح الشكل المقابل مخططًا لإحدى الوحدات السكنية بمقاييس رسم ١٥٠ : ١ أوجد:

- أبعاد حجرة الاستقبال.
- أبعاد حجرة النوم.
- مساحة حجرة المعيشة.
- مساحة الوحدة السكنية.

تشابه المثلثات

## Similarity of Triangles


- ४ -



طلب أحد ملوك الفراعنة إلى  
الرياضي طاليس (ق.م. ٦٠٠)  
أن يوجد ارتفاع الهرم الأكبر،  
ولم تكن هناك أجهزة أو آلات  
أو طريقة لإيجاد ارتفاع  
الهرم مباشرة.  
ثبت طاليس عصا رأسياً

وبدأ يقيس ظل العصا ويقارنه بطول العصا نفسها إلى أن جاء وقت وجد فيه أن طول ظل العصا يساوي الطول الحقيقي للعصا نفسها. فقام بقياس طول ظل الهرم، وكان هو ارتفاع الهرم نفسه.

إذا طلب منك قياس ارتفاع سارية العلم باستخدام عصا وشريط مدرج فهل تنتظر حتى يصبح طول العصا مساوياً لطول العصا نفسها أو يمكنك قياس ارتفاع سارية العلم في أي وقت من يوم مشمس؟ فسر إجابتك.



عمل تعاونی

- ١- ارسم  $\triangle ABC$  الذي فيه:  
 $\angle A = 50^\circ$ ,  $\angle B = 70^\circ$ ,  $AB = 4$  سم



٢- ارسم  $\triangle EHD$  الذي فيه:  
 $\angle E = 50^\circ$ ,  $\angle H = 70^\circ$ ,  $EH = 5$  سم

٣- أوجد بالقياس لأقرب ملليمتر أطوال كل من:  $\overline{AJ}$ ,  $\overline{BJ}$ ,  $\overline{JO}$ ,  $\overline{HO}$

٤- استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد النسب  $\frac{AJ}{JG}$ ,  $\frac{BJ}{JG}$ ,  $\frac{AB}{HO}$   
ما إذا تستنتج عن هذين المثلثين؟  
هل النسب متساوية؟  
قارن نتائجك مع نتائج المجموعات الأخرى واكتب ملاحظاتك.

سوف تتعلم

- حالات تشابه المثلثات.
  - خصائص العمود المرسوم من رأس القائمة على الوتر في المثلث القائم الزاوية.

## المصطلحات الأساسية

#### **Postulate / Axiom**


٦٣

الأدوات والوسائل

- ◀ حاسب آلي
  - ◀ جهاز عرض بيانات
  - ◀ برامج رسومية
  - ◀ ورق مربعات
  - ◀ مرآة مستوية
  - ◀ أدوات قياس
  - ◀ آلة حاسبة

## مُسْلِمَةٌ

إذا طابقت زاويتان في مثلث نظائرهما في مثلث آخر كان المثلثان متشابهين.









في الشكل المقابل:

إذا كان  $\angle \omega \equiv \angle ج$  ،  $\angle ه \equiv \angle ج$   
فإن  $\triangle أب ج \sim \triangle وعه$

## حاول أن تحل

١) بين أيّاً من أزواج المثلثات التالية تكون متشابهة. اكتب المثلثات المتشابهة بترتيب الرؤوس المتناظرة.



## للحظة

١- المثلثان المتساويان الأضلاع متشابهان. (كما في ٥)

٢- يتتشابه المثلثان متساوي الساقين إذا ساوي قياس إحدى زاويتي القاعدة في أحدهما قياس إحدى زاويتي القاعدة في المثلث الآخر: (كما في ٩) أو إذا ساوي قياساً زاوياً في رأسيهما.

٣- يتتشابه المثلثان القائمان الزاوية إذا ساوي قياس إحدى الزاويتين الحاديتين في أحدهما قياس إحدى الزاويتين الحاديتين في المثلث الآخر (كما في ٦).


### مثال

١ في المثلث  $A B C$ ،  $C \in A B$ ،  $C \in A C$  حيث  $C H \parallel B C$ ،

$B = 4,2$  سم،  $A = 3$  سم،  $A C = 4$  سم،  $C H = 2$  سم.

أثبت أن  $\triangle A C H \sim \triangle A B C$

ب أوجد طول كل من:  $A C$ ،  $B C$



### الحل

أ:  $C H \parallel B C$ ،  $\angle A B C$  قاطع لهما.

$\therefore \triangle A C H \equiv \triangle A B C$ .

في المثلثين  $A C H$ ،  $A B C$

$\therefore \triangle A C H \equiv \triangle A B C$

$\angle A H C \equiv \angle A B C$

$\therefore \triangle A C H \sim \triangle A B C$

ب:  $\therefore \triangle A C H \sim \triangle A B C$

ويكون:  $\frac{A C}{A B} = \frac{C H}{B C}$

$$\frac{A C}{A B} = \frac{2}{3} = \frac{A C}{1,2 + A C}$$



$$A C = (1,2 + 1,2) \times 2 = 4$$

$$A C = 3,6$$

$$A C = 3,6 \text{ سم}$$

### حاول أن تحل




٢ في كل من الأشكال التالية، أثبت أن  $\triangle A B C \sim \triangle A C H$  ثم أوجد قيمة س.



### نتائج هامة


إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الأصلي.

### نتيجة



إذا كان  $\overleftrightarrow{DE} \parallel \overleftrightarrow{BC}$  ويقطع  $\overleftrightarrow{AB}$  ،  $\overleftrightarrow{AC}$  في  $E$  ،  $D$  على الترتيب كما في الأشكال الثلاثة السابقة:  
فإن:  $\triangle AED \sim \triangle ABC$

### مثال




- ٢ فـي الشـكـلـ الـمـقـابـلـ: أـبـ جـ مـثـلـثـ، دـ  $\in$  أـبـ ، رـسـمـ دـهـ  $\parallel$  بـجـ  
وـيـقـطـعـ أـجـ فـيـ هـ، دـ وـ  $\parallel$  أـجـ وـيـقـطـعـ بـجـ فـيـ وـ.  
برـهـنـ أـنـ: دـهـ  $\sim$  دـبـ وـ

### الحل

- (١)  $\therefore \triangle AED \sim \triangle ABC$   
(٢)  $\therefore \triangle DOW \sim \triangle ABC$   
من (١)، (٢) يـتـحـ أـنـ: دـهـ  $\sim$  دـبـ وـ

### حاول أن تحل



- ٣ فـيـ الشـكـلـ الـمـقـابـلـ: أـبـ جـ مـثـلـثـ، دـ  $\in$  أـبـ ، رـسـمـ دـهـ  $\parallel$  بـجـ وـيـقـطـعـ  
أـجـ فـيـ هـ، رـسـمـ دـسـ يـقـطـعـ دـهـ ، بـجـ فـيـ سـ، صـ عـلـىـ التـرـتـيبـ.  
أـ ذـكـرـ ثـلـاثـ أـزـوـاجـ مـنـ المـثـلـثـاتـ الـمـتـشـابـهـ.

- بـ أـثـبـتـ أـنـ:  $\frac{DC}{DS} = \frac{DC}{DB}$ .

إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوي عمود على الوتر انقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين، وكلاهما يشابه المثلث الأصلي.

في الشكل المقابل: أـبـ جـ مـثـلـثـ قـائـمـ زـاوـيـةـ فـيـ أـ، دـ  $\perp$  بـجـ  
دـبـ، دـبـ جـ فـيـهـما


وـ( $\angle ADB = 90^\circ$ ) = وـ( $\angle ACB = 90^\circ$ ) ، دـبـ مـشـتـرـكـةـ فـيـ المـثـلـثـينـ.

(١) دـبـ  $\sim$  دـبـ جـ (مـسـلـمـةـ التـشـابـهـ)

(٢) وبالـمـثـلـ دـبـ جـ  $\sim$  دـبـ جـ

ـ:ـ المـثـلـثـانـ الـمـشـابـهـانـ ثـلـاثـ مـتـشـابـهـانـ

ـ:ـ دـبـ جـ  $\sim$  دـبـ جـ



### مثال

٣ أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، أ د ب ج أثبت أن د ب وسط متناسب بين د ب، د ج.

### الحل

المعطيات: في  $\triangle ABD$ :  $D = 90^\circ$ ,  $AD \perp BD$ .


المطلوب: إثبات أن  $(DB)^2 = DJ \times DG$ .

البرهان: في  $\triangle ABD$ :

$$\because D = 90^\circ \Rightarrow AD \perp BD$$

$\therefore \triangle DBA \sim \triangle DAB$



$$\text{ويكون: } \frac{DB}{DJ} = \frac{DB}{DG} \Rightarrow DB^2 = DJ \times DG$$



(نتيجة)

### حاول أنا تحل

٤ في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س العددية:



١

### مثال

٤ في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، أ د ب ج أثبت أن:

أ  $(AB)^2 = BD \times BA$

ب  $(AJ)^2 = JB \times JA$

### الحل

في  $\triangle ABD$ :

$$\because D = 90^\circ \Rightarrow AD \perp BD$$


$\therefore \triangle DBA \sim \triangle DAB$  (نتيجة)

$$\therefore \frac{AB}{DB} = \frac{BD}{BA} \quad \text{ويمكن: } (AB)^2 = BD \times BA$$

(نتيجة)

$$\therefore \triangle AJB \sim \triangle BJA \quad \text{ويمكن: } (AJ)^2 = JB \times JA$$



$$\therefore \frac{AJ}{JB} = \frac{JB}{JA}$$



نجد الناتج التي تم إثباتها في مثالى ٣، ٤ برهاناً لنظرية أقليدس التي سبق لك دراستها في المرحلة الإعدادية.

## حاول أن تحل

٥ أوجد قيمة س، ص العددية في أبسط صورة (الأبعاد مقدرة بالستيمترات)




## Indirect measurement

في بعض الحالات يصعب قياس مسافة أو ارتفاع معين مباشرة، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام تشابه المثلثات لإيجاد هذا القياس بطريقة غير مباشرة.

إحدى الطرق تستخدم خاصية انعكاس الضوء في المرآة المستوية، كما في المثال التالي.

## مثال



٥ **فيزياء:** أراد يوسف أن يعرف ارتفاع إحدى الأشجار فوضع مرآة على مسافة ٦ أمتار من قاعدة الشجرة، ثم تحرك إلى الخلف حتى استطاع أن يرى قمة الشجرة في وسط المرأة - عند هذه النقطة كان يوسف قد تحرك بعيداً عن المرأة مسافة ١,٢ متر وكانت عيناه على ارتفاع ١,٥ متر فوق سطح الأرض. فإذا كانت قدماه والمرأة وقاعدة الشجرة على استقامة واحدة أوجد ارتفاع الشجرة. علمًا بأن قياس زاوية السقوط = قياس زاوية الانعكاس.

## الحل

بفرض أن ارتفاع الشجرة س متراً، قياس زاوية السقوط =  $\theta$

$$\therefore \text{قياس زاوية الانعكاس} = \theta$$

في المثلثين ABD و CBD

$$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ$$


$$\therefore \angle ABD = \angle CBD = (\theta - 90^\circ)$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CBD \quad \text{ويكون: } \frac{AB}{BC} = \frac{BD}{DC}$$

$$\therefore \frac{s}{6} = \frac{1.5}{1.2}$$





$$\therefore s = 7.5 \text{ متر}$$

أي أن ارتفاع الشجرة يساوي 7,5 متراً.



### حاول أن تحل

٦ أوجد المسافة س في كل من الحالات الآتية:



إذا تناست أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين فإنهم يتشابهان.

### نظريّة

المعطيات: المثلثان  $\triangle ABC$  و  $\triangle EFD$  و فيهما  $\frac{AB}{ED} = \frac{BC}{FD} = \frac{CA}{DE}$

المطلوب:  $\triangle ABC \sim \triangle EFD$

البرهان: عين  $\angle A \cong \angle E$  حيث  $AS \parallel ED$ ,

ارسم  $SC \parallel BF$  ويقطع  $FE$  في  $C$ .

$$\therefore SC \parallel BF$$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle EDC$

ويكون  $\frac{AB}{ED} = \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{EC}$

$$\therefore AC = EC$$

$$\therefore \frac{AB}{ED} = \frac{BC}{DC} = \frac{CA}{EA}$$

$$\therefore \frac{AB}{ED} = \frac{BC}{FD} = \frac{CA}{DE}$$

من (١)، (٢) ينتج أن:  $SC = FD$  و  $CA = DE$

ويكون  $\triangle EDC \equiv \triangle FDC$

$\therefore \angle E \cong \angle F$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle EFD$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle EFD$


(عمل)

(١)

(معطيات) (٢)

(برهانا)

(وهو المطلوب)



(نتيجة (١))

## مثال

٦ في الشكل المقابل:  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$  على استقامة واحدة. أثبت أن:

$$\triangle ABC \sim \triangle SBC$$

$\overline{BC}$  ينصف  $\angle ABC$

## الحل

١ في المثلثين  $\triangle ABC$ ,  $\triangle SBC$  نجد أن:

$$\frac{AB}{SB} = \frac{4}{3}, \quad \frac{BC}{SC} = \frac{6+18}{18} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{AC}{SC} = \frac{18}{13.5} = \frac{4}{3}$$

أي أن الأضلاع المتناظرة متناسبة


$$\frac{AB}{SB} = \frac{BC}{SC} = \frac{AC}{SC}$$

ويكون  $\triangle ABC \sim \triangle SBC$


$\therefore \triangle ABC \sim \triangle SBC$

ب  $\therefore \triangle ABC \sim \triangle SBC$

أي أن:  $\overline{BC}$  ينصف  $\angle ABC$



$$\therefore \text{و}(\triangle ABC) = \text{و}(\triangle SBC)$$



(من خواص التناوب) (١)

(من خواص التناوب) (٢)

$$\therefore \frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC}$$

$$\therefore \frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC}$$


$$\text{من (١)، (٢) ينتج أن: } \frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC}$$

أي أن  $\triangle AHD \sim \triangle BDC$

$$\therefore \text{و}(\triangle AHD) = \text{و}(\triangle BDC)$$

وهما في وضع تناوب بالنسبة للقاطع  $\overleftrightarrow{AD}$

$$\therefore \overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$$



## حاول أن تدل



٧  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$  شكل رباعي،  $h \in \overline{BC}$  حيث:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{BD}, \quad \frac{BC}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

أثبت أن:  $AD \parallel BC$

### نظريّة ٢

إذا طابقت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناسبت أطوال الأضلاع التي تحتويها هاتان الزاويتان، كان المثلثان متشابهين.



(نتيجة) (١)

المعطيات:  $\triangle \equiv \triangle$

$\frac{أب}{وه} = \frac{اج}{وو}$

المطلوب:  $\triangle ABG \sim \triangle WHO$

البرهان: خذ س  $\infty$   $\overline{AB}$  حيث  $AS = WH$

وارسم  $SC \parallel BG$

ويقطع  $AG$  في  $C$

$\therefore SC \parallel BG$

$$\text{ويكون } \frac{أب}{اس} = \frac{اج}{ص}$$

$\therefore \frac{أب}{وه} = \frac{اج}{وو}$  (معطى) ،  $AS = WH$  (عمل)

$\therefore \frac{أب}{وه} = \frac{اج}{وو}$  ويكون  $AC = CW$

$\therefore \triangle ACS \equiv \triangle WHO$  (ضلعان وزاوية محصورة)

(٢)

ويكون  $\triangle ACS \sim \triangle WHO$

من (١)، (٢) ينتج أن:  $\triangle ABG \sim \triangle WHO$  وهو المطلوب.


### مثال

٨)  $\triangle ABG$  مثلث،  $AB = 8$  سم،  $AG = 10$  سم،  $BG = 12$  سم،  $WH = 6$  سم،  $WO = 4$  سم،  $BC = 5$  سم، حيث  $BC = 4$  سم.

أ) برهن أن  $\triangle BWH \sim \triangle BAG$  واستنتج طول  $WH$ .

ب) برهن أن الشكل  $ABWH$  رباعي دائري.

### الحل



$\therefore AB = 8$  سم،  $AG = 10$  سم

أ) المثلثان  $BWH$ ،  $BAG$  فيهما:

$\triangle BWH \equiv \triangle BAG$

$$\frac{بـ}{بـ} = \frac{بـ}{بـ} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{بـ}{بـ} = \frac{بـ}{بـ}$$


من (١)، (٢)  $\therefore \triangle BWH \sim \triangle BAG$  (نظريّة)

$$\text{من التشابه } \frac{WH}{AG} = \frac{1}{2} \quad \therefore \quad \frac{WH}{10} = \frac{1}{2} \quad \therefore \quad WH = 5 \text{ سم}$$


**٦** من التشابه أيضاً  $\triangle BDE \sim \triangle BAC$  .  
 $\therefore \angle BDE = \angle BAC$ .  
 $\therefore \angle BDE$  خارجة عن الشكل الرباعي  $ABCD$  .  
الشكل  $ABCD$  رباعي دائري.

**حاول أن تحل**

**٧** في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس مفسراً إجابتك.

**مثال**

**٨**  $\triangle ABC$  مثلث،  $\angle B = \angle A$  حيث  $(\angle A) = \angle B \times \text{جب}$  أثبت أن:  $\triangle ABC \sim \triangle BCA$

**الحل**

(١)

المثلثان  $\triangle ABC$  و  $\triangle BCA$  فيهما زاوية مشتركة

$$\therefore (\angle A) = \angle B \times \text{جب}$$



$$\therefore \frac{\text{أجل}}{\text{جب}} = \frac{\text{جب}}{\text{أجل}}$$

(٢)  
(نظرية)من (١)، (٢) ينتج أن  $\triangle ABC \sim \triangle BCA$ **حاول أن تحل**

**٩**  $\triangle ABC$  و  $\triangle DHE$  مثلثان متباينان،  $S$  منتصف  $BC$ ،  $CH$  منتصف  $DE$  وأثبت أن:


$$\text{جب } S \times \text{جب } H = \text{جب } A \times \text{جب } C$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DHE$$


**تحقق من فهمك**في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة  $s$ .**١٠****١٠**

## تمارين ٢ - ٢

١ اذكر أي الحالات يكون فيها المثلثان متشابهين، وفي حالة التشابه اذكر سبب التشابه.




٢ أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس:



٣ في الشكل المقابل:  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

أولاً: أكمل:  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$



ثانياً: إذا كان  $s, c, u, l, m, n$  هى أطوال القطع المستقيمة بالستيمترات والمعينة بالشكل: فأكمل النسبات التالية:


$$\frac{c}{l} = \frac{s}{n} \quad \frac{c}{u} = \frac{l}{m} \quad \frac{c}{s} = \frac{l}{u} \quad \frac{s}{u} = \frac{m}{n} \quad \frac{s}{c} = \frac{m}{l}$$

٤  $\triangle ABC$  وتران في دائرة،  $\overline{AB} \sim \overline{PQ}$  حيث  $P$  خارج الدائرة،  $AB = 4$  سم،  $PQ = 6$  سم،  $BQ = 6$  سم. أثبت أن  $\triangle ABC \sim \triangle PQB$ ، ثم أوجد طول  $QH$ .

٥  $\triangle ABC$  و  $\triangle PQR$  متشابهان. رسم  $AS \perp BC$  ليقطعه في  $S$ ، ورسم  $PR \perp QC$  ليقطعه في  $R$ . أثبت أن  $BS \times CR = PS \times QR$ .

٦ في المثلث  $\triangle ABC$ ،  $\angle A > \angle B > \angle C$  حيث  $\angle A = 2\angle B = 3\angle C$ . أثبت أن  $(AB)^2 = AC \times BC$ .

- ٧ أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، رسم  $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{BJ}$  ليقطعه في ج. إذا كان  $\frac{B}{J} = \frac{1}{3}$ ، أ ب ج سم أوجد طول كل من ب ج، أ ب، أ ج.




- ٨ في الشكل المقابل: أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ،  $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{BJ}$ ،  $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{AB}$ ،  $\overrightarrow{HO} \perp \overrightarrow{AJ}$

أثبت أن:

أ  $\triangle AHO \sim \triangle JGO$

ب مساحة المستطيل أ ه ج و =  $A \times H \times B \times O \times G \times J$



- ٩ في الشكل المقابل: أ ب ج مثلث منفرج الزاوية في أ،

أ ب = أ ج. رسم  $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{AB}$  ويقطع  $\overrightarrow{BJ}$  في ج.

أثبت أن:  $(AB)^2 = B J \times B G$


- ١٠ تعبر المجموعتان أ، ب عن أطوال أضلاع مثلثات مختلفة بالستيمترات.

اكتب أمام كل مثلث من المجموعة أ رمز المثلث الذي يشابهه من المجموعة ب

مجموعة (أ) مجموعه (ب)

٥	٤	،	٢,٥	١
١٤	،	١٣,٥	،	٨
٥٥	،	٣٥	،	٢٥
١١	،	١١	،	١١
٦	،	٤	،	٣,٥
١٠	،	٦	،	٨
٤٢	،	٥٤	،	٣٢

٦	،	٦	،	٦	١
١١	،	٧	،	٥	٢
١٠	،	٨	،	٥	٣
١٢	،	٨	،	٧	٤
٢٨	،	٢٧	،	١٦	٥




- ١١ في الشكل المقابل: أ ب ج مثلث فيه أ ب = ٦ سم، ب ج = ٩ سم،

أ ج = ٧,٥ سم، ج نقطة خارجة عن المثلث أ ب ج

حيث ج ب = ٤ سم، ج أ = ٥ سم. أثبت أن:

أ  $\triangle AGB \sim \triangle DGB$

ب  $\overline{AB}$  ينصف  $\angle DGB$



- ١٢ من الشكل المقابل أكمل:


أ  $\triangle AGB \sim \triangle$

ب ومعامل الشابة =

١٢ في الشكل المقابل:  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ،  $M$  منتصف  $BC$ ،  $N$  منتصف  $PQ$ ،  $O$  منتصف  $QR$ . أثبت أن:

أ ١  $\triangle APM \sim \triangle QNO$

$$\frac{PM}{NO} = \frac{AM}{QN}$$




ب ٢  $\frac{PM}{NO} = \frac{AM}{QN}$

١٤  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  مثلثان متشابهان، حيث  $AB > AC$ ,  $PR < PQ$ .  
ـ  $M$  منتصف  $BC$ ,  $N$  على الترتيب، رسم  $AO \perp PB$ ,  $SM \perp PR$ .  
أثبت أن  $\triangle APM \sim \triangle QNO$ .

١٥  $\triangle ABC$  مثلث،  $\angle C = 90^\circ$  حيث  $(AC)^2 = AB \times BC$ ,  $AB \times AC = BC \times CA$ . أثبت أن:

أ ١  $\triangle ABC \sim \triangle CAB$

ب ٢  $\angle A + \angle B = 90^\circ$




١٦ يبين المخطط المقابل موقع محطة خدمة وتموين سيارات يراد إقامتها على الطريق السريع عند تقاطع طريق جانبى يؤدى إلى المدينة ج وعمودياً على الطريق السريع بين المدينتين أ، ب.

أ ١ كم ينبغي أن تبعد المحطة عن المدينة ج؟

ب ٢ ما البعد بين المدينتين ب، ج؟

### نشاط

استخدام برنامج خرائط (Google Earth) لحساب أقصر بعد بين عواصم محافظات جمهورية مصر العربية




## العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين

The Relation Between the Area of two Similar Polygons

### سوف نتعلم

- العلاقة بين مساحتى مضلعين متشابهين ومعامل (نسبة) التشابه.
- العلاقة بين مساحتى سطحى مضلعين متشابهين ومعامل (نسبة) التشابه.



على ورق مربعات رسم كل من المثلثين  $\triangle ABC$ ,  $\triangle DEF$ .

١- بين لماذا يكون:

$\triangle DEF \sim \triangle ABC$ ? أوجد معامل التشابه عندئذ.

٢- احسب النسبة بين مساحة المثلث  $DEF$  إلى مساحة المثلث الأصلي  $ABC$ .

٣- عين نقطة أخرى مثل  $D$  على  $\overline{AB}$ , ثم ارسم  $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$  ويقطع  $\overline{BC}$  في  $E$ .  
لتحصل على المثلث  $DEF$ , هل  $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ ؟

٤- أكمل الجدول التالي:

### المصطلحات الأساسية

- | المصطلحات الأساسية  | التعريف       |
|---------------------|---------------|
| Perimeter           | محيط          |
| Area                | مساحة         |
| Area of a Polygon   | مساحة مضلع    |
| Corresponding Sides | أضلاع متناظرة |

المثلثات	معامل التشابه	مساحة المثلث الأول	النسبة بين مساحة المثلث الأول إلى مساحة المثلث الثاني	مساحة المثلث الثاني
$\triangle DEF \sim \triangle ABC$	$\frac{1}{3}$	٤	$\frac{1}{9} = \frac{4}{36}$	٣٦
$\triangle DEF \sim \triangle ABC$				
$\triangle DEF \sim \triangle ABC$				

٥- ماذا تعنى النسب التي حصلت عليها مقارنة بمعامل التشابه (نسبة التشابه)؟



أولاً: النسبة بين مساحتى سطحى مثلثين متشابهين:



النسبة بين مساحتى سطحى مثلثين متشابهين تساوى مربع النسبة بين طولى أى أضلاع متناظرين فيما.

### الأدوات والوسائل

- حاسب آلي
- جهاز عرض بيانات
- برامج رسومية
- ورق مربعات
- آلة حاسبة



المعطيات:  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

$$\text{المطلوب: } \frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AB}{EH} = \frac{BC}{ED} = \frac{AC}{FD}$$

البرهان: ارسم  $\overleftarrow{AS} \perp \overline{BC}$  حيث  $\overleftarrow{AS} \cap \overline{BC} = \{S\}$ ،  
 $\overleftarrow{EC} \perp \overline{HD}$  حيث  $\overleftarrow{EC} \cap \overline{HD} = \{C\}$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle EHD$

$$(1) \quad \frac{AB}{EH} = \frac{BC}{ED} = \frac{AC}{FD}$$

في المثلثين  $ABC$ ,  $EHD$ :

$$M(\triangle S) = M(\triangle C) = 90^\circ, \quad M(\triangle B) = M(\triangle H)$$

( المسلمنة الشابه )

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle EHD$

$$(2) \quad \text{ويكون: } \frac{AB}{EH} = \frac{AS}{EC}$$



$$\frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{\frac{1}{2} AB \times AS}{\frac{1}{2} EH \times EC} = \frac{AB}{EH} \times \frac{AS}{EC}$$

بالتعمييض من (1), (2) ينتج أن:

$$\frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AB}{EH} = \frac{AB}{ED} = \frac{BC}{ED} = \frac{AC}{FD}$$

للحظ أنة:  $\frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AS}{EC}$

$$\text{فيكون: } \frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AS}{EC}$$



### تفكيير ناقد:

١- إذا كان  $\triangle ABC \sim \triangle EHD$ , هل منتصف  $\overline{BC}$ ,  $M$  منتصف  $\overline{HD}$ .

$$\text{هل } \frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AM}{EH}?$$

فسر إجابتك واكتبه استنتاجك.

٢- إذا كان  $\triangle ABC \sim \triangle EHD$ ,


$\overleftarrow{AN}$  ينصف  $\overleftarrow{BC}$  ويقطع  $\overline{HD}$  في  $N$ ,

$\overleftarrow{DU}$  ينصف  $\overleftarrow{ED}$  ويقطع  $\overline{HD}$  في  $U$ .

$$\text{هل } \frac{\text{م}(\triangle ABC)}{\text{م}(\triangle EHD)} = \frac{AN}{ED}?$$

فسر إجابتك واكتبه استنتاجك.

### مثال



١ في الشكل المقابل:  $\triangle ABC \sim \triangle AED$

حيث  $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$ ,  $ED \parallel BC$  ويقطع  $BC$  في  $E$ .

إذا كانت مساحة  $\triangle ABC = 784 \text{ سم}^2$ . أوجد:

أ مساحة  $\triangle AED$ .

ب مساحة شبه المنحرف  $EDCB$ .

### الحل

في  $\triangle AED$ :  $\because ED \parallel BC$

$\therefore \triangle AED \sim \triangle ABC$ .

(نتيجة)

$$\therefore \frac{\text{م. } \triangle AED}{\text{م. } \triangle ABC} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2$$

$$\text{ويكون } \frac{\text{م. } \triangle AED}{784} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad \text{م. } \triangle AED = \frac{9}{4} \times 784 = 144 \text{ سم}^2$$

$\therefore$  مساحة شبه المنحرف  $EDCB$  = مساحة  $\triangle ABC$  - مساحة  $\triangle AED$

$$\therefore \text{مساحة شبه المنحرف } EDCB = 784 - 144 = 640 \text{ سم}^2$$


### حاول أن تحل

٢ في الشكل المقابل:

$ED$  منصف  $\angle ABE$

$\text{م. } \triangle ABC = 48 \text{ سم}^2$

أوجد:  $\text{م. } \triangle EBD$



### مثال

٣ النسبة بين مساحتي مثلثين متباينين هي  $4:9$  فإذا كان محيط المثلث الأكبر  $90 \text{ سم}$

أوجد محيط المثلث الأصغر.

### الحل

بفرض أن  $\triangle ABC \sim \triangle EBD$

$$\therefore \frac{\text{م. } \triangle ABC}{\text{م. } \triangle EBD} = \left(\frac{AB}{EB}\right)^2 = \frac{9}{4} \quad \text{و يكون } \frac{AB}{EB} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{محيط } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \text{محيط } \triangle EBD$$


$$\therefore \text{محيط } \triangle ABC = \frac{90}{2} = 45 \text{ سم}$$

$$\text{و يكون } \frac{\text{محيط } \triangle ABC}{\text{محيط } \triangle EBD} = \frac{9}{4}$$

### حاول أن تحل

٢)  $\frac{م(ABج)}{م(\Delta هـ)} = \frac{3}{4}$

- أ) إذا كان محيط المثلث الأصغر  $3645$  سم. أوجد محيط المثلث الأكبر.  
 ب) إذا كان  $هـ = 28$  سم أوجد طول  $AB$ .



### مثال

- ٣) إذا كان كل ١ سم على الخريطة يمثل ١٠ كيلومترًا.  
 أوجد المساحة الحقيقة التي يمثلها المثلث  $ABC$  لأقرب  
 كيلو متر مربع إذا كان  $م(ABC) = 6,4$  سم

### الحل

$$\text{مقاييس الرسم} = \text{معامل التشابه} = \frac{1}{10 \times 10}$$

$$\frac{\text{مساحة } ABC}{\text{المساحة الحقيقة}} = \text{مربع معامل التشابه}$$

$$\frac{1}{(10 \times 10)} = \frac{6,4}{\text{المساحة الحقيقة}}$$

$$\text{المساحة الحقيقة} = 6,4 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \text{ سم}^2$$

$$\approx 640 \text{ كم}^2$$


### حاول أن تحل

- ٤) في الخريطة المبينة أعلاه احسب مساحة المثلث  $ABC$  وبالستيمترات المربعة واستخدامها في  
 تقدير المساحة الحقيقة التي يمثلها لأقرب كيلو مربع.  
 ب) باستخدام إحدى خرائط جمهورية مصر العربية احسب مساحة شبه جزيرة سيناء لأقرب مائة كيلو  
 متر مربع - قارن إجابتك مع زملائك.

The ratio between the area of two similar polygons

ثانية النسبة بين مساحتي سطхи مضلعين متشابهين


### عمل تعاونى



اعمل مع زميل لك لبحث إمكانية تقسيم المضلعين المتشابهين  
 إلى نفس العدد من المثلثات التي يشبه كل منها نظيره.

١- ارسم مضلعات متشابهة كما في شكل (١)، شكل (٢).

٢- في شكل (١) ارسم  $\overleftrightarrow{AC}$ . ماذا تلاحظ؟



٣- في شكل (٢) إرسم  $\overleftrightarrow{أـ ج}$ . ماذا تلاحظ؟ هل تجد تفسيراً لذلك؟

### للحظ أن

من تشابه المضلعين

(نتيجة)

في المثلثين  $أـ جـ دـ$ ،  $أـ جـ جـ$

$$\text{م}(\triangle أـ جـ دـ) = \text{م}(\triangle جـ جـ جـ)$$

فيكون  $\overline{بـ جـ} \parallel \overline{بـ جـ}$


$$\therefore \triangle أـ جـ \sim \triangle أـ جـ$$

$$\text{وبالمثل } \text{م}(\triangle هـ دـ جـ) = \text{م}(\triangle هـ هـ)$$

$\therefore \overline{هـ دـ} \parallel \overline{هـ دـ}$  ويكون  $\triangle هـ دـ \sim \triangle هـ دـ$  وهكذا.


**حقيقة:** المضلعان المتشابهان يمكن أن ينقسما إلى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منها نظيره.

**ملاحظة:** الحقيقة السابقة صحيحة مهما كان عدد الأضلاع في المضلعين المتشابهين، (المضلعان المتشابهان لهما نفس العدد من الأضلاع) فإذا كان عدد أضلاع المضلع =  $n$  ضلعاً فإن عدد المثلثات التي يمكن أن ينقسم إليها المضلع (عن طريق أقطاره المشتركة في نفس الرأس) =  $n - 2$  مثلثاً.



النسبة بين مساحتى سطحى مضلعين متشابهين تساوى مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متناظرين فيما بينهما.

### نظرية ٤



المعطيات: المضلع  $أـ بـ جـ دـ هـ$  ~ المضلع  $أـ بـ جـ دـ هـ$

$$\text{المطلوب: } \frac{\text{م}(\text{المضلع } أـ بـ جـ دـ هـ)}{\text{م}(\text{المضلع } أـ بـ جـ دـ هـ)} = \left( \frac{\text{أـ بـ}}{\text{أـ بـ}} \right)^2$$

البرهان: من  $أـ$ ،  $\text{أـ}/\text{نرسم } \overrightarrow{أـ جـ}$ ،  $\overrightarrow{أـ دـ}$ ،  $\overrightarrow{أـ هـ}$

$\therefore$  المضلع  $أـ بـ جـ دـ هـ$  ~ المضلع  $أـ بـ جـ دـ هـ$

$\therefore$  فهما ينقسمان إلى نفس العدد من المثلثات، كل يشابه نظيره (**حقيقة**). ويكون:

$$\frac{\text{م}(\triangle أـ بـ جـ)}{\text{م}(\triangle أـ بـ جـ)} = \left( \frac{\text{بـ جـ}}{\text{بـ جـ}} \right)^2, \quad \frac{\text{م}(\triangle أـ جـ دـ)}{\text{م}(\triangle أـ جـ دـ)} = \left( \frac{\text{جـ دـ}}{\text{جـ دـ}} \right)^2, \quad \frac{\text{م}(\triangle أـ دـ هـ)}{\text{م}(\triangle أـ دـ هـ)} = \left( \frac{\text{دـ هـ}}{\text{دـ هـ}} \right)^2$$

$$\therefore \frac{\text{بـ جـ}}{\text{بـ جـ}} = \frac{\text{جـ دـ}}{\text{جـ دـ}} = \frac{\text{أـ بـ}}{\text{أـ بـ}}$$

(من تشابه المضلعين)

$$\therefore \frac{\text{م}(ΔABG)}{\text{م}(ΔABC)} = \frac{\text{م}(ΔAGH)}{\text{م}(ΔAEG)} = \frac{AB}{AE}$$

ومن خواص التنااسب

$$\frac{\text{م}(ΔABG) + \text{م}(ΔAGH)}{\text{م}(ΔABC) + \text{م}(ΔAEG)} = \frac{AB}{AE}$$

$$\text{ويكون: } \frac{\text{م}(\text{المضلع } ABGKH)}{\text{م}(\text{المضلع } ABCGH)} = \frac{AB}{AE} \text{ وهو المطلوب}$$

### حاول أن تحل

٤ إذا كان المضلع  $ABGD \sim$  المضلع  $ABCJ$  ،  $\frac{AB}{AJ} = \frac{1}{3}$  فاكتب ما يساويه كل من:

$$\frac{\text{م}(\text{المضلع } ABGD)}{\text{م}(\text{المضلع } ABCJ)}, \quad \frac{\text{محيط المضلع } ABGD}{\text{محيط المضلع } ABCJ}$$

٥ إذا كان المضلعان  $ABGH$  ،  $ABCJ$  متشابهان والنسبة بين مساحتي سطحيهما  $= 4 : 25$ :

$$\text{فاكتب ما يساويه كل من: } \frac{AB}{AJ}, \quad \frac{\text{محيط المضلع } ABGH}{\text{محيط المضلع } ABCJ}$$

٦ إذا كانت النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين  $1 : 4$  ، مساحة المضلع الأول  $25 \text{ سم}^2$ . أوجد مساحة المضلع الثاني.

٧ إذا كان طولاً ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين هما  $12 \text{ سم}$  ،  $16 \text{ سم}$  ، وكانت مساحة المضلع الأصغر  $= 135 \text{ سم}^2$ . فإذاً مساحة المضلع الأكبر.

### مثال

٨ إذا كان  $ABGD$  ،  $ABCJ$  مضلعين متشابهان فيهما:  $\text{م}(ΔABC) = 40^\circ$  ،  $\text{م}(ΔABG) = 3/4 \text{ من } AB$  ،  $JG = 16 \text{ سم}$ . احسب: أولاً:  $\text{م}(ΔABC)$  ثانياً: طول  $CG$  ثالثاً:  $\text{م}(\text{المضلع } ABGD)$  :  $\text{م}(\text{المضلع } ABCJ)$

### الحل

$\therefore \text{المضلع } ABGD \sim \text{المضلع } ABCJ$

$\therefore \text{م}(ΔABC) = \text{م}(ΔABG) \text{ فيكون: } \text{م}(ΔABC) = 40^\circ \text{ (المطلوب أولاً)}$

$$\therefore \text{م}(ΔABG) = \frac{3}{4} \text{ من } AB \quad \therefore \frac{AB}{BC} = \frac{3}{4} \quad \therefore \text{م}(ΔABC) = \frac{3}{4} \text{ من } AB$$

من تشابه المضلعين نجد أيضاً  $\frac{AB}{BC} = \frac{CG}{GJ}$

$$\therefore \frac{16}{4} = \frac{CG}{4} \text{ فيكون: } CG = \frac{16 \times 3}{4} = 12 \text{ سم (المطلوب ثالثاً)}$$

$\text{م}(\text{المضلع } ABGD) : \text{م}(\text{المضلع } ABCJ) = (\text{م}(ΔABG) : \text{م}(ΔABC))$

$$= (3/4 : 1/4) = 9 : 16$$

(المطلوب ثالثاً)

للحظ أن

$$AB = 4k$$

$$BC = 3k$$

$$k \neq 0$$

### مثال

٥ النسبة بين محيطي مضلعين متباينين  $3 : 4$ . إذا كان مجموع مساحتى سطحيهما  $225 \text{ سم}^2$  فأوجد مساحة كل منهما.

### الحل

$\therefore$  النسبة بين محيطي مضلعين متباينين  $= 3 : 4$

$\therefore$  النسبة بين طولى ضلعين متناظرين فيما  $= 3 : 4$

بفرض أن مساحة المضلع الأول  $= 9 \text{ سم}^2$  ، مساحة المضلع الثاني  $= 16 \text{ سم}^2$

$\therefore 9 + 16 = 225$  ويكون  $S = \frac{225}{16+9}$

$\therefore$  مساحة المضلع الأول  $= 9 \times 9 = 81 \text{ سم}^2$

$\therefore$  مساحة المضلع الثاني  $= 9 \times 16 = 144 \text{ سم}^2$

### حاول أن تحل

٦ **الربط مع الزراعة:** مزرعتان على شكل مضلعين متباينين، النسبة بين طولى ضلعين متناظرين فيما  $3 : 5$  ، إذا كان الفرق بين مساحتيهما  $22$  فدانًا، فأوجد مساحة كل منهما.

### مثال

٦ أب جى، س ص ع ل مضلعين متباينان. تقاطع قطري الأول في م وتقاطع قطري الثاني في ن.

أثبت أن  $M(\text{المضلع أب جى}) : M(\text{المضلع س ص ع ل}) = (M\text{ ج}) : (N\text{ ع})$

### الحل

$\therefore$  المضلع أب جى ~ المضلع س ص ع ل

$\therefore \Delta \text{أب ج} \sim \Delta \text{س ص ع}$

$\therefore \Delta \text{جـ بـ جـ} \sim \Delta \text{ل ص ع}$

$\therefore \Delta \text{م بـ جـ} \sim \Delta \text{ن ص ع}$

ويكون  $\frac{B\text{ ج}}{S\text{ ج}} = \frac{M\text{ ج}}{N\text{ ع}}$


$\therefore$  المضلع أب جى ~ المضلع س ص ع ل

$\therefore M(\text{المضلع أب جى}) = \frac{(B\text{ ج})}{(S\text{ ج})}$

$M(\text{المضلع س ص ع ل}) = (N\text{ ع})$

من (١)، (٢) نستنتج أن:

$M(\text{المضلع أب جى}) : M(\text{المضلع س ص ع ل}) = (M\text{ ج}) : (N\text{ ع})$




حاول أن تدل

٦) أب جى، س ص ع ل مضلعلان متباينان فإذا كانت م منتصف ب ج، ن منتصف ص ع فأثبت أن:  
 $m(\text{المضلعلان } AB) = m(\text{المضلعلان } CD)$

مثال

٧) أب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فإذا كانت أب، بـ جـ، أصلـاع مـتناظـرة لـثلاثـة مـضـلـعـات مـتـشـابـهـة  
منـشـأـة عـلـى أـصـلـاعـ المـثلـث أـبـ جـ وـ هـى عـلـى التـرتـيب: المـضـلـع سـ، المـضـلـع صـ، المـضـلـع عـ.  
فـأـثـبـتـ أـنـ مـ(المـضـلـع سـ) + مـ(المـضـلـع صـ) = مـ(المـضـلـع عـ)



$\therefore \text{المصلع سـ} \sim \text{المصلع ع}$

$\therefore \text{المصلع ص} \sim \text{المصلع ع}$

$$\therefore \frac{م(\text{المصلح س})}{م(\text{المصلح ع})} + \frac{م(\text{المصلح ص})}{م(\text{المصلح ع})} = \frac{(أب)}{(أج)} + \frac{(بج)}{(اج)}$$

$$(1) \quad \frac{^r(\vec{A} \cdot \vec{B}) + ^r(\vec{B} \cdot \vec{A})}{^r(\vec{A} \cdot \vec{A})} =$$

$$(٢) \quad \therefore \text{و}(\text{ب}) \Delta = \text{ا}(\text{ج}) + \text{ب}(\text{ج})$$


من (١)، (٢) ينتج أن  $\frac{م(\text{المصلع س})}{م(\text{المصلع ع})} = \frac{م(\text{المصلع ص})}{م(\text{المصلع ع})}$

ويكون  $M(\text{المصلح س}) + M(\text{المصلح ص}) = M(\text{المصلح ع})$

حاول أن تدل

٧) أب ج مثلث قائم الزاوية في أ، فيه  $A = 5$  سم،  $B = 13$  سم، حيث  $A^2 + B^2 = C^2$ .  
 ثلاثة مصلعات متشابهة لـ م، نمنأة على أصلع المثلث أب ج من الخارج على الترتيب.  
 فإذا كانت مساحة سطح المضلعل تساوى ١٠٠ سم٢، أوجد مساحة سطح كل من المضلعين مـ.


تحقق من فهمك



فـى الشـكـل المـقـابـل: أـبـ جـدـ مـتـواـزـى أـضـلاـعـ،  
هـ ؟ أـبـ حـيـثـ هـ بـ = ٣ـ، دـ هـ جـ بـ = (وـ)

۱) أثبت أن  $\triangle EJO \sim \triangle HAO$

٢) أوجد م( $\triangle$ ) جو م( $\triangle$ ) هـأى





## تمارين ٢ - ٣

١ أكمل:

أ إذا كان  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ، وكان  $AB = 3$  سم فإن  $\frac{م(\triangle PQR)}{م(\triangle ABC)} =$

ب إذا كان  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ، وكان  $PQ = 9$  سم فإن  $M(\triangle ABC) = M(\triangle PQR)$  وكان  $AB =$  سم

ادرس كلاً من الأشكال التالية، حيث ثابت تناوب، ثم أكمل:



$$\text{م}(\angle B) = 90^\circ, \text{أي } \perp \text{ ب ج}$$

$$M(\triangle ABC) = 180 \text{ سم}^2 \text{ فإن:}$$

$$M(\triangle ABC) = \text{سم}^2 \text{ فإن: } M(\triangle PQR) =$$

$$AB \cap PQ = \{H\}$$

$$M(\angle H) = 900 \text{ سم}^2$$

$$\text{فإن: } M(\triangle PQR) = \text{سم}^2$$

٢ اب ج مثلث، و  $\exists \overline{AB}$  حيث  $A = 2B$ ،  $H \in \overline{AJ}$  حيث  $H \parallel \overline{BC}$

إذا كانت مساحة  $\triangle AH = 60$  سم<sup>2</sup>. أوجد مساحة شبه المنحرف  $BC$ .

٤ اب ج مثلث قائم الزاوية في ب، رسمت المثلثات المتساوية الأضلاع اب س، ب ج ص، ا ج ع

أثبت أن:  $M(\triangle ABS) + M(\triangle BJC) = M(\triangle AGU)$ .

٥ اب ج مثلث فيه  $\frac{AB}{BC} = \frac{1}{4}$ ، رسمت الدائرة المارة برؤوسه. من نقطة ب رسم المماس لهذه الدائرة فقطع

$$\overleftarrow{AJ} \text{ في } H. \text{ أثبت أن: } \frac{M(\triangle AJG)}{M(\triangle AHG)} = \frac{7}{16}$$

٦ اب ج ه متوازي أضلاع  $\exists \overleftarrow{AB}$ ،  $S \not\parallel \overleftarrow{AB}$  حيث  $B = 2A$ ،  $S \not\parallel \overleftarrow{BC}$ ،  $C \not\parallel \overleftarrow{AB}$

حيث  $B = 2C$ ، رسم متوازي الأضلاع ب س ع أثبت أن:  $\frac{M(\triangle ABC)}{M(\triangle BSC)} = \frac{1}{4}$

٧ أب ج مثلث قائم الزاوية في ب، بـ جـ يقطعة في د، رسم على آب، بـ جـ المربعان

أـ صـ بـ، بـ مـ جـ خارج المثلث أـ جـ

أثبت أن المضلع دـ أـ صـ بـ ~ المضلع دـ بـ مـ جـ

بـ إذا كان أـ بـ = ٦ سم، أـ جـ = ١٠ سم. أوجد النسبة بين مساحتى سطحى المضلعين.

٨ أـ بـ جـ مثلث، آبـ، بـ جـ، أـ جـ أضلاع متناظرة لثلاثة مضلعات متشابهة مرسومة خارج المثلث، وهى

المضلعات بين سـهـ، صـ، عـ على الترتيب.

إذا كانت مساحة المضلع سـهـ = ٤٠ سم، ومساحة المضلع صـ = ٨٥ سم، ومساحة المضلع عـ = ١٢٥ سم.

أثبت أن المثلث أـ بـ جـ قائم الزاوية.

٩ أـ بـ جـ مربع قسمت آبـ، بـ جـ، جـ دـ بالنقاط سـ، صـ، عـ، لـ على الترتيب بنسبة ٣:١

أثبت أن:

$$\frac{\text{مـ المربع سـ صـ عـ لـ}}{\text{مـ المربع أـ بـ جـ دـ}} = \frac{5}{8} \quad \text{بـ}$$

أـ الشكل سـ صـ عـ لـ مـ رـ بـ

١٠ صالة ألعاب مستطيلة الشكل أبعادها ٨ متر، ١٢ متر، تم تغطية أرضيتها بالخشب، فكلفت ٣٢٠٠ جنيه.

احسب (باستخدام التشابه) تكاليف تغطية أرضية صالة مستطيلة أكبر بنفس نوع الخشب وبنفس


الأسعار، إذا كان أبعادها ١٤، ٢١ من الأمتار.

## تطبيقات التشابه في الدائرة


### Applications of Similarity in the circle

#### سوف نتعلم


- العلاقة بين وترین متقاطعين في دائرة.
- العلاقة بين قاطعين لدائرة من نقطة خارجها.
- العلاقة بين طول ماس وطول جزأى قاطع لدائرة مرسومين من نقطة خارجها.
- نمذجة وحل مشكلات وتطبيقات حياتية باستخدام تشابه المثلثات في الدائرة.



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)

في شكل (١): هل توجد علاقة بين  $هـ \times هـ ب$  ،  $هـ ج \times هـ د$ ؟

في شكل (٢): هل توجد علاقة بين  $هـ أ \times هـ د$  ،  $أـ ج \times أـ ب$ ؟

في شكل (٣): هل توجد علاقة بين  $أـ د \times أـ ج$  ،  $(أـ ب)^٢$ ؟


#### المصطلحات الأساسية

Chord	وتر
Secant	قاطع
Tangent	ماس
Diameter	قطر
	ماس خارجي مشترك
Common External Tangent	ماس داخلي مشترك
Common Internal Tangent	دوائر متعددة المركز
Concentric Circles	


#### تمرين مشهور

إذا تقاطع المستقيمان الحاويان للوترين  $\overline{أـ ب}$  ،  $\overline{جـ د}$  لدائرة في نقطة  $هـ$  فإن:

$$هـ أـ ب = هـ ج \times هـ د$$



شكل (٢)



شكل (١)


لاستنتاج ذلك:

رسم  $\overline{أـ د}$  ،  $\overline{بـ ج}$

في كل من الشكلين أثبت أن المثلثين  $هـ أـ د$  ،  $هـ جـ د$  متشابهان فيكون:

$$\therefore \frac{هـ أ}{هـ ج} = \frac{هـ د}{هـ ب}$$

### مثال



١ في الشكل المقابل:  $\overline{AB} \cap \overline{CD} = \{K\}$

وإذا كان  $h_b = \frac{1}{3} h_d$ ,  $h_d = 9$  سم ،  $h_d = 4$  سم

أوجد طول  $h_b$

### الحل

$$\therefore h_b = \frac{1}{3} h_d \quad \therefore h_b = 4 \text{ كم} , \quad h_b = 3 \text{ كم}$$

(تمرين مشهور)

$$\therefore \overline{AB} \cap \overline{CD} = \{K\} \quad \therefore h_a \times h_b = h_c \times h_d$$

فيكون:  $4 \times 3 = 9 \times 4$




$$36 = 36$$

$$3 = 3$$


$$\therefore h_b = 3 \text{ سم} , \quad h_b = 3 \text{ سم}$$

### حاول أن تحل

١ أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



### مثال



٢ في الشكل المقابل:  $\overline{AB} \cap \overline{CD} = \{K\}$ ,  $AB = 5$  سم،

$h_d = 9$  سم ،  $h_d = 3$  سم. أوجد طول  $h_s$

### الحل

بفرض أن  $h_s = s$  سم.

$$\therefore \overline{AB} \cap \overline{CD} = \{K\} \quad \therefore h_a \times h_b = h_c \times h_d$$

فيكون:  $s(s + 5) = (s + 3)(9 + 3)$

$$s^2 + 5s - 36 = 0$$




$$(s - 4)(s + 9) = 0$$

$$\therefore s = 4 , \quad s = -9 \text{ مرفوض}$$

$$\therefore \text{طول } h_s = 4 \text{ سم.}$$

**حاول أن تحل**

(الأطوال مقدرة بالستيمترات)




٢ أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية


إذا كانت م نقطة خارج دائرة،  $\overleftarrow{MJ}$  يمس الدائرة في ج،  $\overleftarrow{MB}$  يقطعها في أ، ب فإن  $(MJ)^2 = MA \times MB$ .

**نتيجة**  
١

في الشكل المقابل:  $\overleftarrow{MJ}$  مماس للدائرة  
 $\overleftarrow{MB}$  يقطع الدائرة في أ، ب  
 $\therefore (MJ)^2 = MA \times MB$



**مثال**






٢ في الشكل المقابل:  $\overleftarrow{HA}$  مماس للدائرة،  
 $\overleftarrow{HG}$  يقطع الدائرة في د، ج على الترتيب.  
حيث  $HD = 4$  سم،  $JG = 5$  سم، أوجد طول  $\overleftarrow{HA}$

**الحل**

$$\begin{aligned} & \because \overleftarrow{HA} \text{ مماس، } \overleftarrow{HG} \text{ قاطع للدائرة} \\ & \therefore (HA)^2 = HD \times HG \quad (\text{نتيجة}) \\ & (HA)^2 = (4)(5) \\ & HA = \sqrt{20} \end{aligned}$$


**حاول أن تحل**

٢ في كل من الأشكال التالية  $\overleftarrow{HA}$  مماس للدائرة. أوجد قيمة س، ص، ع العددية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



### عكس تمرين مشهور

إذا تقاطع المستقيمان الحاويان للقطعتين  $\overline{ab}$ ,  $\overline{gc}$  في نقطة  $h$  (مختلفة عن  $a, b, g, c$ ) وكان  $ha \times hb = hc \times hg$  فإن: النقط  $a, b, g, c$  تقع على دائرة واحدة.



### للحظ أين:

$$ha \times hb = hc \times hg$$

$$\text{فيكون } \frac{ha}{hc} = \frac{hg}{hb}$$


↙ هل  $\triangle hac \sim \triangle hgb$ ? لماذا؟

↙ هل  $hc \cdot (ha) = hg \cdot (hb)$ ? لماذا؟

↙ هل النقط  $a, b, g, c$  تقع على دائرة واحدة؟ فسر إجابتك.

### مثال

- ٤)  $ab$  ج مثلث فيه  $ab = 15$  سم،  $ag = 12$  سم،  $ac = 5$  سم،  $hc = 4$  سم حيث  $ag = 5$  سم.  
أثبت أن الشكل  $habc$  بج ه رباعي دائري.



(عكس تمرين مشهور)

### الحل

$$\therefore ai \times ab = 15 \times 4 = 60$$

$$ah \times ag = 12 \times 5 = 60$$

$$\therefore ai \times ab = ah \times ag$$


$$\therefore bi \cap gh = \{a\}, ai \times ab = ah \times ag$$

↙ النقط  $i, b, g, h$  تقع على دائرة واحدة

ويفكون الشكل  $habc$  بج ه رباعي دائريًا

### حاول أن تحل

- ٤) في أيٌ من الأشكال التالية تقع النقط  $a, b, g, c$  على دائرة واحدة؟ فسر إجابتك.




إذا كان  $(ha)^2 = hb \times hg$

فإن  $\overline{ac}$  تمس الدائرة المارة بالنقط  $a, b, g, c$

**نتيجة**

### مثال

- ٥) اب ج مثلث فيه اب = ٨ سم،اج = ٤ سم،ج ب ج ك حيث ج ك = ١٢ سم.  
أثبت أن ب تمس الدائرة المارة بالنقطة ب، ج، ك




### الحل

$$\begin{aligned} \therefore \text{اج} \times \text{اك} &= 4(12+4) \\ \therefore (\text{اب})^2 &= 64 \\ \therefore (\text{اب})^2 &= \text{اج} \times \text{اك} \end{aligned}$$


$\therefore$  ب تمس الدائرة المارة بالنقطة ب، ج، ك عند النقطة ب.

### حاول أن تحل

- ٥) في أي من الأشكال الآتية يكون ب مماساً للدائرة المارة بالنقطة ب، ج، ك




### مثال



- ٦) تطبيقات حياتية: الربط مع الجيولوجيا: في إحدى المناطق الساحلية توجد طبقة أرضية على شكل قوس طبيعي. وجد الجيولوجيون أنه قوس دائرة كما في الشكل المقابل. أوجد طول نصف قطر دائرة القوس.

### الحل



بفرض أن طول نصف قطر دائرة القوس = هـ متراً

$\therefore$  بـ، جـ وتران متتقاطعان في هـ

$$\therefore \text{هـ} \times \text{بـ} = \text{هـ} \times \text{جـ}$$

$$9 \times 27 = 27 \times (2\text{هـ} - 9)$$


$$81 = 9 - 2\text{هـ}$$

$$45 = \text{هـ}$$


أي أن طول نصف قطر دائرة القوس يساوي 45 متراً.

## تمارين ٢ - ٤


**١** باستخدام الآلة الحاسبة أو الحساب العقلى، أوجد قيمة س العددية فى كل من الأشكال التالية.  
(الأطوال مقدرة بالستيمترات)



**٢** فى أيٌ من الأشكال التالية تقع النقط A، B، C، D على دائرة واحدة؟ فسر إجابتك.  
(الأطوال مقدرة بالستيمترات)




٣ في أي من الأشكال التالية  $\overline{AB}$  مماس للدائرة المارة بالنقطة  $B$ ,  $G$ ,  $I$ .




٤ دائرتان متقاطعتان في  $A$ ,  $B$ .  $G \in \overleftrightarrow{AB}$ ,  $G \not\equiv \overline{AB}$  من  $G$  القطعتان  $GS$ ,  $GC$  مماسان للدائرتين عند  $S$ ,  $C$ . أثبت أن  $GS = GC$ .

٥ في الشكل المقابل: الدائرتان  $M$ ,  $N$  متماستان عند  $H$ .  
 $\overrightarrow{AG}$  يمس الدائرة  $M$  عند  $B$ , ويمس الدائرة  $N$  عند  $G$ ,  
 $AH$  يقطع الدائرتين عند  $D$ ,  $E$  على الترتيب  
حيث  $AD = 4\text{سم}$ ,  $DH = 5\text{سم}$ ,  $HE = 7\text{سم}$ .  
أثبت أن  $B$  منتصف  $\overline{AG}$



٦ في الشكل المقابل:  $L \cong S \cong C$  حيث  $SL = 4\text{سم}$ ,  
 $SC = 8\text{سم}$ ,  $M \cong U$  حيث  $SM = 6\text{سم}$ ,  $UM = 2\text{سم}$   
أثبت أن:



أ  $\triangle SLM \sim \triangle SCU$

ب الشكل  $LSCU$  رباعي دائري.

٧  $\overline{AB} \cap \overline{GI} = \{H\}$ ,  $AH = \frac{9}{12}BH$ ,  $GH = \frac{3}{6}HG$ , إذا كان  $BH = 6\text{سم}$ ,  $GH = 5\text{سم}$ .  
أثبت أن النقطة  $A$ ,  $B$ ,  $G$ ,  $I$  تقع على دائرة واحدة.

٨  $AB$  ج مثلث،  $G \in \overline{BC}$  حيث  $GB = 5\text{سم}$ ,  $GC = 4\text{سم}$ . إذا كان  $AG = 6\text{سم}$ . أثبت أن:


أ  $\overline{AG}$  مماسة للدائرة التي تمر بالنقطة  $A$ ,  $B$ ,  $I$ .

ب  $\triangle AJG \sim \triangle BJA$


ج  $M(\triangle AJG) : M(\triangle ABG) = 9 : 5$

٩ دائرتان متحدة المركز  $M$ , طولا نصف قطريهما  $12\text{سم}$ ,  $7\text{سم}$ , رسم الوتر  $\overline{AC}$  في الدائرة الكبرى ليقطع الدائرة الصغرى في  $B$ ,  $G$  على الترتيب. أثبت أن:  $AB \times BG = 95$


- ١٠ أب جي مستطيل فيه أب = ٦ سم، ب ج = ٨ سم. رسم بـ هـ تـ آجـ فقطع آجـ في هـ، آجـ في وـ.  
 ب أوجد طول آوـ.




- ١١ **الربط مع الصناعة:** كسر أحد تروس آلة ولاستبداله مطلوب معرفة طول نصف قطر دائرة. يبين الشكل المقابل جزءاً من هذا الترس، والمطلوب تعين طول نصف قطر دائرة.



- ١٢ **الربط مع البيئة:** يبين الشكل المقابل مخططاً لحديقة على شكل دائرة بها طريقان يتقاطعان عند نافورة المياه. أوجد بعد نافورة المياه عند المدخل جـ.



- ١٣ **الربط مع المنزل:** تستخدم هـى شبكة لشـى اللحوم على شـكل دائرة من السـلك، طـول قـطرها ٥٠ سـم، يـدعـمـها من الوـسـط سـلـكـان متـوازـيان ومتـساـويـان فـي الطـول كـما فـي الشـكـل المـقـابـل، وـالـبـعـد بـينـهـما ١٠ سـم. اـحـسـب طـول كـل مـن سـلـكـي الدـاعـمة.



- ١٤ **الربط مع الاتصال:** تنقل الأقمار الصناعية البرامج التليفزيونية إلى كافة مناطق الأرض، وتستخدم أطباق خاصة لاستقبال إشارات البث التليفزيوني، وهي أطباق م-curved على شكل جزء من سطح كرة. يـبـينـ الشـكـلـ المـقـابـلـ مـقـطـعاـ فـيـ أحـدـ هـذـهـ الأـطـبـاقـ طـولـ قـطـرـهـ ١٨٠ سـمـ،ـ وـالـمـطلـوبـ حـاسـبـ طـولـ نـصـفـ قـطـرـ كـرـةـ تـقـرـعـهـ مـاـ.

# ملخص الوحدة

## Two Similar Polygons

## المضلعان المتشابهان

يتشابهان مضلعاً لهما نفس العدد من الأضلاع إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة وأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة

## Similarity Ratio

## نسبة التشابه (معامل التشابه)

إذا كان المضلع  $A/B/C/D$  المضلع  $A'/B'/C'/D'$  يكون ك معامل تشابه المضلع  $A/B/C/D$  للمضلع  $A'/B'/C'/D'$  حيث  $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'} = k$  ،  $k \neq 0$ .

النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين تساوى معامل تشابهما

**مسلمه:** قضية أو عبارة رياضية يسلم بصحتها دون برهان ويستنتج منها حقائق تتعلق بالنظام، مثل:  
«إذا طابقت زاويتان في مثلث نظائرها في مثلث آخر كان المثلثان متشابهين».

**نتيجة (١):** إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما فإن المثلث الناتج يشبه المثلث الأصلي.

**نتيجة (٢):** إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر انقسم المثلث إلى مثلتين، وكلاهما يشبه المثلث الأصلي.

**نظريه ١:** إذا تناست الأضلاع المتناظرة في مثلتين فأنهما يتشابهان.

**نظريه ٢:** إذا طابقت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناست أطوال الأضلاع التي تحتويها هاتان الزاويتان كان المثلثان متشابهين.

## The relation between the area of two similar polygons

## العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين

**نظريه ٣:** النسبة بين مساحتى سطحين متساوين متشابهين متساوی مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متناظرين فيما.

**حقيقة:** المضلعان المتشابهان يمكن أن ينقسموا إلى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منها نظيره.

**نظريه ٤:** النسبة بين مساحتى سطحي مضلعين متشابهين متساوی مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متناظرين فيما.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتى:



## الهندسة

### الوحدة



## نظريات التنااسب في المثلث

### The Triangle Proportionality Theorems

معبد حتشبسوت بالأقصر

#### أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة يكون الطالب قادرًا على أن:

- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة) وعكسها، ونتائج عليها.
- يُعرف ويبرهن نظرية تاليس العامة التي تنص على: (إذا قطع مستقيمان عدّة مستقيمات متوازية فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر). وحالات خاصة منها.
- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو الزاوية الخارجية للمثلث عند هذا الرأس،
- قسم المنصف قاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين نسبة بين طوليهما تساوى نسبة بين طولي الضلعين الآخرين) وحالات خاصة منها.
- يوجد قوّة نقطة بالنسبة لدائرة (القواعط والمماسات).
- يستنتج قياسات الزوايا الناتجة من تقاطع الأوتار والمماسات في دائرة.
- يحل تطبيقات تشمل إيجاد طول المنصف الداخلي والخارجي.

#### المصطلحات الأساسية

▪ منصف خارجي	▪ منصف	▪ نقطة تصييف	▪ نسبة
Exterior Bisector	Bisector	Median	Ratio
Perpendicular	▪ منصف داخلي	▪ متوسط	▪ تنااسب

▪ عمودي على	▪ قاطع	▪ متوازي
Interior Bisector	Transversal	Parallel

كوبرى السلام (قناة السويس)



### دروس الوحدة

الدرس (٣ - ١): المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة.

الدرس (٣ - ٢): منصفا الزاوية والأجزاء المتناسبة.

الدرس (٣ - ٣): تطبيقات التناسب في الدائرة.




### الأدوات المستخدمة

أدوات هندسية للرسم والقياس - حاسب آلي -  
برامج رسومية - جهاز عرض بيانات - ورق مربعات  
- خيوط - مقص




### مخطط تنظيمي للوحدة



### نبذة تاريخية

الرياضيات نشاط فكري ممتع يجعل الذهن متفتحاً، والعقل صحيحاً، وتسهم في حل كثير من المشكلات والتحديات العملية والعلمية والحياتية ، من خلال تمثيلها أو نمذجتها بعلاقات بلغة الرياضيات ورموزها؛ ليتم حلها، ثم إعادةها إلى أصولها المادية .

فطن قدماء المصريين لذلك فأقاموا المعابد والأهرامات وفق خطوط مستقيمة بعضها متوازي والأخر قاطع لها، كما حرثوا الأرضي الزراعية في خطوط مستقيمة متوازية، وقد أخذ الإغريق الهندسة عن المصريين القدماء فوضع إقليدس (٣٠٠ ق.م) نظاماً هندسياً متكاملاً عرّف بالهندسة الإقليدية وتقوم على مسلمات خمس، أهمها: مسلمة التوازي وهي: "من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم واحد فقط يمر بتلك النقطة ويوazi مستقيماً معلوماً". وتعني الهندسة الإقليدية بالأشكال المستوية (المثلثات - المضلعات - الدوائر) والأشكال ثلاثية الأبعاد، كما أن لها تطبيقات عملية في مجالات متعددة منها إنشاء الطرق والكباري وتخفيط المدن وإعداد خرائطها التي تعتمد على توازي المستقيمات و المستقيمات القاطعة لها وفق تناوب بين الطول الحقيقي والطول في الرسم (مقاييس الرسم).




# ١ - ٣

## المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

### Parallel Lines and Proportional Parts


#### سوف تتعلم

- خصائص المستقيم الموازي لأي ضلع من أضلاع مثلث.
- استخدام التناوب في حساب أطوال وبرهنة علاقات لقطع مستقيمة ناتجة عن قواطع مستقيمات متوازية.
- نمذجة وحل مشكلات حياتية تتضمن المستقيمات المتوازية وقواعدها.



- رسم المثلث  $\triangle ABC$ , عين نقطة  $D \in \overline{AB}$   
ثم ارسم  $\overleftrightarrow{h} // \overleftrightarrow{BC}$  ويقطع  $\overleftrightarrow{AC}$  في  $E$ .
- أوجد بالقياس طول كل من:  
 $AD, DB, AE, EC$
- احسب النسبتين  $\frac{AD}{DB}$ ,  $\frac{AE}{EC}$  وقارن بينهما. ماذا تلاحظ?  
إذا تغير موقع  $\overleftrightarrow{h}$  محافظاً على توازيه مع  $\overleftrightarrow{BC}$ .  
هل تغير العلاقة بين  $\frac{AD}{DB}$ ,  $\frac{AE}{EC}$ ? ماذا نستنتج؟

إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة.



المعطيات:  $\triangle ABC$  مثلث،  $\overleftrightarrow{h} // \overleftrightarrow{BC}$   
المطلوب:  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$   
البرهان:  $\therefore \overleftrightarrow{h} // \overleftrightarrow{BC}$   
 $\therefore \triangle ABD \sim \triangle AEC$  (سلمة الشابه)  
(١) ويكون:  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$   
 $\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

(٢)  $\therefore AD + DB = AE + EC$

من (١)، (٢) ينتج أن:

$$\frac{AD + DB}{DB} = \frac{AE + EC}{EC}$$

ويكون:  $\frac{AD}{DB} + 1 = \frac{AE}{EC} + 1$

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

ومن خواص التناوب نجد أن:  $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$  (وهو المطلوب)

#### المصطلحات الأساسية


Parallel	يوازي
Midpoint	متصف
Median	متوسط
Transversal	قاطع

#### الأدوات والوسائل

- أدوات هندسية للرسم والقياس.
- حاسب آلي.
- برامج رسومية.
- جهاز عرض بيانات.

$$\text{للحظ أن: } \therefore \frac{أي}{أي+ب} = \frac{أه+هج}{هج} \quad \therefore \frac{أي}{ب} = \frac{أه}{هج}$$

$$\text{أي أن: } \frac{أي}{ب} = \frac{أج}{هج}$$



١ في الشكل المقابل:  $\overline{SC} \parallel \overline{BG}$ ,  $AS = 16$  سم,  $BS = 12$  سم.

أ إذا كان  $AC = 24$  سم، أوجد  $CG$ .

ب إذا كان  $CG = 21$  سم، أوجد  $AG$ .

**الحل**

$$\text{أ } \therefore \frac{AS}{SB} = \frac{AC}{CG}$$




$$\text{ويكون: } \frac{16}{12} = \frac{24}{CG}$$

$$\text{ب } \therefore \frac{SC}{BG} = \frac{AJ}{CG}$$

$$\text{ويكون: } \frac{16}{12} = \frac{21+28}{12} \therefore AJ = \frac{12+16}{12} = 49 \text{ سم.}$$

**حاول أن تدل**

١ في كل من الأشكال التالية:  $\overline{HE} \parallel \overline{BG}$ . أوجد قيمة  $s$  العددية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)




إذا رسم مستقيم خارج مثلث  $ABC$  يوازي ضلعًا من أضلاع المثلث، وليكن  $\overline{BG}$ , ويقطع

$\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$  في  $E$ ,  $H$  على الترتيب فإن:  $\frac{AB}{BE} = \frac{AC}{CH}$  (كما في الشكل).


**نتيجة**

بتطبيق خواص النسبة نستنتج أن:

$$\frac{AE}{EB} = \frac{AH}{HG}, \quad \frac{AE}{EB} = \frac{AC}{CH}$$



### مثال



- ٢ في الشكل المقابل:  $\overline{GH} \cap \overline{BI} = \{I\}$ ,  $I \in \overline{GH}$   
 $I \in \overline{BC}$  حيث  $\overline{GH} \parallel \overline{BC}$ .  
إذا كان  $AB = 6$  سم،  $AG = 5$  سم،  $AI = 12$  سم،  $HC = 4$  سم.  
أوجد طول كل من  $AH$ ،  $IS$ .

### الحل

$$\because \overline{GH} \parallel \overline{BC}, \overline{GH} \cap \overline{BI} = \{I\}$$

$$\therefore \frac{AI}{AB} = \frac{AH}{AG}$$

$$\text{ويكون: } \frac{12}{6} = \frac{AH}{5}$$

$$\therefore AH = 10 \text{ سم}$$

في  $\triangle AHI$ :


$$\because \overline{IS} \parallel \overline{AH}$$

$$\therefore \frac{AH}{IS} = \frac{AI}{IS}$$

$$\text{ويكون: } \frac{12}{4} = \frac{10}{IS}$$

$$\therefore IS = 8 \text{ سم}$$


### حاول أن تحل



- ٢ في الشكل المقابل:  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ,  $AH \cap \overline{DE} = \{B\}$
- إذا كان:  $AB = 8$  سم،  $BG = 9$  سم،  $BC = 12$  سم.  
أوجد طول  $DE$ .
- إذا كان:  $AB = 6$  سم،  $BH = 9$  سم،  $GD = 18$  سم.  
أوجد طول  $BG$ .


إذا قطع مستقيم ضلعين من أضلاع مثلث، وقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة فإنه يوازي  
الضلعين الثالث.

عكس  
نظرية  
الثلث.



في الأشكال الثلاثة السابقة:  $AB \sim BC$  مثلث،  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$  في  $I$ ،  $\overline{AG} \parallel \overline{BC}$  في  $H$ . وكان  $\frac{AI}{IB} = \frac{AH}{HC}$   
فإن  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$

**تفكير منطقى:** هل  $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ? ولماذا؟ - هل  $\angle AHD \equiv \angle B$ ? فسر إجابتك.  
اكتب برهاناً لعكس النظرية.



### مثال

- ٣ في الشكل المقابل: أب جـ مثلث قائم الزاوية في أـ  
أـ ثبت أن: دـ هـ // بـ جـ.

### الحل

أـ : المثلث دـ هـ قائم الزاوية في أـ

(نظرية فيثاغورث)

$$\therefore \frac{أـ هـ}{أـ بـ} = \frac{هـ جـ}{بـ جـ}$$

$$\therefore \frac{أـ هـ}{أـ بـ} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore \frac{أـ هـ}{أـ بـ} = \frac{هـ جـ}{بـ جـ}$$




و يكون  $\frac{أـ هـ}{أـ بـ} = \frac{هـ جـ}{بـ جـ}$

بـ :  $\Delta دـ هـ \sim \Delta أـ بـ جـ$  (لماذا)

$$\therefore بـ جـ = \frac{هـ جـ}{أـ هـ} = 15 \text{ سم}$$

### حاول أن تحل


- ٤ في كل من الأشكال التالية حدد ما إذا كان دـ هـ // بـ جـ أم لا.



### مثال

- ٤ أـ بـ جـ دـ شـكـل ربـاعـيـ فيه سـ // أـ بـ، صـ // أـ جـ حيث سـ // بـ جـ، رـسـمـ صـعـ // جـ دـ ويقطع أـ دـ في عـ. ثـبـتـ أـنـ سـعـ // بـ دـ.

### الحل



(١)

$$\therefore \frac{أـ سـ}{أـ بـ} = \frac{صـ جـ}{بـ جـ}$$

(٢)

$$\therefore \frac{أـ عـ}{أـ دـ} = \frac{صـ جـ}{دـ جـ}$$

من (١)، (٢) نستنتج أن:  $\frac{أـ سـ}{أـ بـ} = \frac{أـ عـ}{أـ دـ}$

في  $\Delta أـ بـ دـ$ :

$$\therefore \frac{أـ سـ}{أـ بـ} = \frac{أـ عـ}{أـ دـ}$$

دار الكتب الجامعية

### حاول أن تحل

٤ أ ب ج د شكل رباعي تقاطع قطراته في م. رسم  $\overline{مـهـ} \parallel \overline{أـبـ}$  ويقطع  $\overline{أـبـ}$  في ه، رسم  $\overline{مـوـ} \parallel \overline{جـدـ}$  ويقطع  $\overline{جـدـ}$  في و. أثبت أن:  $\overline{هـوـ} \parallel \overline{أـجـ}$

**تفكير منطقي:** إذا كان  $\overline{هـوـ}$ ،  $\overline{وـسـ}$ ، ص منتصفات الأضلاع  $\overline{أـبـ}$ ،  $\overline{بـجـ}$ ،

$\overline{جـدـ}$ ،  $\overline{وـأـ}$  في الشكل الرباعي أ ب ج د.

هل الشكل  $\overline{هـوـ}$   $\overline{وـسـ}$  ص متوازي أضلاع؟

**فهم:** ما المطلوب؟ متى يكون الشكل متوازي أضلاع؟

**خطوة:** كون مثلثات برسم  $\overline{بـدـ}$  التي تقسم الشكل إلى مثلثين.



الشكل  $\overline{هـوـ}$   $\overline{وـسـ}$  ص متوازي أضلاع

**حل:** اكتب العبارات الرياضية المناسبة للبرهان ومبرراتها.

**تحقق:** ابحث هل  $\overline{هـوـ} \parallel \overline{سـصـ}$ ؟ فسر إجابتك.


### حاول أن تحل

٥ في الشكل المقابل: أ ب ج مثلث،  $\overline{هـجـ} \in \overline{أـجـ}$ ،

$\overline{وـهـ} \parallel \overline{أـبـ}$ ،  $\overline{وـوـ} \parallel \overline{أـهـ}$

ارسم مخططًا يوضح كيفية إثبات أن  $(جـهـ)^2 = جـوـ \times جـبـ$ .

### مثال



**تحديد المواقع:** لتحديد الموقع ج، قام المساحون بالقياس

وإعداد المخطط المقابل.

أوجد بعد الموقع ج عن الموقع أ


### الحل

$$\text{أـبـ} \perp \text{بـدـ} \quad \text{جـهـ} \perp \text{بـدـ} \quad \therefore \text{أـبـ} \parallel \text{جـهـ}$$

$$\therefore \text{أـجـ} \cap \text{بـدـ} = \{هـ\}, \quad \text{أـبـ} \parallel \text{جـهـ}$$

$$\therefore \frac{\text{هـ}}{\text{أـجـ}} = \frac{\text{هـبـ}}{\text{بـدـ}} \quad \text{ويكون } \frac{\text{هـ}}{\text{أـجـ}} = \frac{45}{105+45} = \frac{60}{150} = \frac{2}{5}.$$

$$\therefore \text{أـجـ} = \frac{105 \times 60}{45} = 200 \text{ متر.}$$



حاول أن تدل

- ٦ مكافحة التلوث:** قام فريق مكافحة التلوث بتحديد موقع بقعة زيت على أحد الشواطئ كما في الشكل المقابل. احسب طول بقعة الزيت.



لعلك لاحظت إمكانية استخدام توازى مستقيم لأحد أضلاع مثلث فى تطبيقات حياتية كثيرة.

يوضح الشكل المقابل بوابة أحد المشاتل الزراعية، وهى مكونة من قطع خشبية متوازية وأخرى قاطعة لها.


هل توجد علاقة بين أطوال أجزاء قواطع هذه القطع المتوازية؟



نمذجة

لبحث وجود علاقة أم لا. نمذج المشكلة (ضع نموذجاً رياضياً للمشكلة) كما يلي:

- ١- ارسم المستقيمات  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$  م/قاطعان لها  
في  $A, B, C, D$  ،  $A, B, C, D$  على الترتيب  
كما بالشكل المقابل.**




- ٢- قس أطوال القطع المستقيمة وقارن النسب التالية:  
 $\frac{أب}{أب} , \frac{بـجـ}{بـجـ} , \frac{جـهـ}{جـهـ} , \frac{ـجـ}{ـجـ}$   
ماذا نستنتج؟

## Talis' Theorem

نظريّة تاليس العامة

إذا قطع مستقيمان عدة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر.



المعطيات: ل، //ل، //ل، م، م/ قاطعان لها

**المطلوب:** أب : ب حـ : جـ = أب / ب / حـ / جـ

البرهان : ارسم  $\overleftarrow{M}$  ، ويقطع  $L$  في  $H$  ،  $L$  في  $O$  ،

**بـ ص // م،** ويقطع لـ فـي سـ، لـ فـي صـ.

۱۱ // هب /، اه // اب /

∴ أ. ب / أ متوازي أضلاع ويكون: أ. ه = أ. ب /

بالمثل:  $هـ = بـ / جـ$  ،  $بـ سـ = بـ / جـ$  ،  $سـ صـ = جـ / دـ$

في  $\triangle AGD$ :

$$\therefore \overline{BD} // \overline{HG} \quad \therefore \frac{AB}{BG} = \frac{AH}{HD}$$

$$\text{ويكون: } \frac{AB}{BG} = \frac{1}{B/G} , \quad \frac{AB}{BG} = \frac{B/HG}{B/GH}$$

بالمثل  $\triangle BGD$ :

$$\therefore \frac{BG}{GD} = \frac{B/HG}{B/GH} , \quad \frac{BG}{GD} = \frac{HG}{GD}$$

من (١)، (٢) ينتج أن:

$$\frac{AB}{BG} = \frac{BG}{GD} = \frac{HG}{GD}$$

$\therefore AB : BG : GD = 1 : B/G : HG/GD$  وهو المطلوب.

### حاول أن تحل

٧ اكتب ما تساويه كل من النسب التالية مستخدماً الشكل السابق:


$$5 \quad \frac{AB}{BG}$$

$$6 \quad \frac{1/D}{B/D}$$

$$7 \quad \frac{BG}{GD}$$

$$8 \quad \frac{AB}{GD}$$

### مثال



٦ في الشكل المقابل:  $AB // GD // HD // SC$  ،

$AG = 28$  سم،  $GD = 20$  سم،  $HD = 15$  سم، و  $SC = 33$  سم.

أوجد طول كل من:  $BG$  ،  $HD$  ،  $SC$

### الحل


$\therefore AB // GD // HD // SC$

$$\therefore \frac{AB}{BG} = \frac{GD}{HD} = \frac{HD}{SC}$$


$$\therefore BG = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} \text{ سم} , \quad HD = \frac{28}{33} = \frac{4}{3} \times 21 = 28 \text{ سم} .$$

### حاول أن تحل


٨ في كل من الأشكال التالية، المستقيمات الحمراء تقطع مستقيمات متوازية. احسب قيم  $s$  ،  $صـ$  العددية  
(الأطوال مقدرة بالستيometرات)



ج





ب



أ

### حالات خاصة



١- إذا تقاطع المستقيمان  $m, m'$  في النقطة  $A$

وكان:  $\overrightarrow{b} \parallel \overrightarrow{j} \parallel \overrightarrow{g}$ , فإن:  $\frac{AB}{AJ} = \frac{AB'}{A'J}$

وبالعكس: إذا كان:  $\frac{AB}{AJ} = \frac{AB'}{A'J}$

فإن:  $\overrightarrow{b} \parallel \overrightarrow{j} \parallel \overrightarrow{g}$

### نظرية تاليس الخاصة

٢- إذا كانت أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين متساوية فإن أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر تكون متساوية كذلك.  
في الشكل المقابل  $L \parallel L' \parallel L'' \parallel L'''$ , قطعها المستقيمان  $m, m'$   
وكان:  $AB = BB' = BG$  فإن:  $\frac{AB}{BG} = \frac{BB'}{GJ} = \frac{BG}{GJ}$

### مثال

٧ في الشكل المقابل أوجد القيمة العددية لكل من  $s, ch$ .


الحل

$$\therefore AB \parallel BG \parallel HE \text{ و } BB' = KK' \text{ و }$$

$$\therefore AG = GH$$



$$\text{ويكون: } 2s - 3 = s + 5 \quad \therefore s = 5$$

$$\therefore BB' = KK' \text{ و } s = 5$$



### حاول أن تحل

٩ في كل مما يأتي أوجد قيمة  $s, ch$  العددية. (الأطوال مقدرة بالسنتيمترات)




### فكرة

أراد يوسف تقسيم شريط من الورق إلى ٣ أجزاء متساوية في الطول، فقام بوضعها على صفحة كراسته كما بالشكل المقابل وحدد نقطتي التقسيم  $A, B$ .

هل تقسيم يوسف للشريط صحيحًا؟ فسر إجابتك.  
استخدم أدواتك الهندسية لتحقق من صحة إجابتك.

### مثال



**الربط بالصناعة:** تنقل عبوات الأسمدة من إنتاج أحد المصانع بانزلاقها عبر أنبوب مائل لتحملها السيارات إلى مراكز التوزيع كما في الشكل المقابل.  
إذا كانت  $\text{أ} = \text{ه}$ ، ومساقط النقط  $\text{أ} = \text{ب}$ ،  $\text{ج} = \text{ه}$  على الأفقي بنفس الترتيب،  $\text{أ} = 1\text{م}$ ،  $\text{ب} = 12\text{متر}$ ،  $\text{ه} = 80\text{سم}$ ،  $\text{ج} = 12\text{متر}$ .  
أوجد طول الأنابيب لأقرب متر.

### الحل

$$\therefore \text{أ} \parallel \text{ب} \parallel \text{ج} \quad \therefore \text{أ} = \text{ج}$$

$$\therefore \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \frac{\text{ج}}{\text{ه}}$$

$$\therefore \text{ج} \approx 19 \text{ متر}$$

$\therefore \text{أ} = \text{ج}$ ، ومساقط النقط  $\text{أ} = \text{ب}$ ،  $\text{ج} = \text{ه}$  على الأفقي

$\therefore \text{أ} \parallel \text{ب} \parallel \text{ج}$ ،  $\text{أ} \parallel \text{ج}$ ،  $\text{ب} \perp \text{ج}$  وقاطعان لها



$$\text{ويكون: } \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \frac{\text{ج}}{\text{ه}}$$

$$\therefore \text{ج} = \frac{12 \times 12}{8} = 19,2 \text{ متر}$$

### حاول أن تحل

#### (ب) تفكير ناقد

#### (أ) الربط بالإنشاءات:




إذا كان  $\text{أ} = 180\text{سم}$ ،  $\text{ه} = 2\text{متر}$

$$\text{أ} : \text{ب} : \text{ج} : \text{ه} = 3 : 4 : 5$$

أوجد طول كل من  $\text{ه}$ ،  $\text{ص}$ ،  $\text{ج}$


أوجد من الشكل  $\frac{\text{أ}}{\text{ب}}$  بعدة طرق مختلفة،  
كلاهما ممكن ذلك. هل حصلت على نفس الناتج؟



### تحقق من فهمك

**حل مشكلات:** أ سلم طوله  $1,4\text{ متر}$  يستند بطرفه العلوي على حائط رأسى وبطرفه الس资料ى على أرض أفقيه خشنة. إذا كان بعد الطرف السفلى عن الحائط  $90\text{ سم}$ . فاحسب المسافة التي يصعدها رجل على السلم ليصبح على ارتفاع  $4,2\text{ متر}$  من الأرض.


### تمارين ٣ - ١



١ في الشكل المقابل  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$  أكمل:

أ إذا كان  $\frac{h}{g} = \frac{1}{2}$  فإن:  $\frac{h}{j} = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{j}{h} = \frac{1}{2}$

ب إذا كان  $\frac{h}{g} = \frac{4}{7}$  فإن:  $\frac{h}{j} = \frac{4}{7}$ ,  $\frac{j}{h} = \frac{7}{4}$



٢ في الشكل المقابل  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$ . حدد العبارات الصحيحة من ما يلي:

أ  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$

ب  $\frac{h}{g} = \frac{h}{j}$








ج  $\frac{h}{g} = \frac{g}{j}$

د  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$

ه  $\frac{h}{g} = \frac{g}{h}$

أ  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$

٣ في كل من الأشكال التالية  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$ . أوجد قيمة س العددية (الأطوال بالستيمترات).




٤ في الشكل المقابل:  $\frac{h}{g} = \frac{j}{h}$ ,  $\frac{h}{g} \cap \frac{h}{j} = \{j\}$

أ  $j = 6$  سم، ب  $j = 4$  سم، ج  $j = 3$  سم

أوجد طول  $\frac{h}{g}$




- ٥  $\overline{SC} \cap \overline{UL} = \{M\}$ , حيث  $\overline{SU} \parallel \overline{LC}$ , فإذا كان  $SM = 9$  سم،  $CM = 15$  سم،  $UL = 36$  سم.  
أوجد طول  $UM$ .



لكل مما يأتي: استخدم الشكل المقابل والبيانات المعطاة لإيجاد قيمة س:

- أ  $AD = 4$  ،  $BG = 8$  ،  $JH = 6$  ،  $AH = S$ .  
ب  $AH = S$  ،  $HJ = 5$  ،  $AD = S - 2$  ،  $DG = 3$ .  
ج  $AB = 21$  ،  $BG = 8$  ،  $WG = 6$  ،  $AD = S$ .  
د  $AD = S$  ،  $BG = S + 5$  ،  $DG = 3$  و  $GB = 12$ .

- ٧ في كل من الأشكال التالية، حدد ما إذا كان  $\overline{SC} \parallel \overline{BG}$



- ٨  $\overline{SC}$  مثلث فيه  $SC = 14$  سم،  $SU = 21$  سم،  $UL = 5$  سم،  $UL \parallel SC$  حيث  $SL = 6$  سم،  
 $UL \parallel SC$  حيث  $SU = 8$  سم. أثبت أن  $LM \parallel SC$

- ٩ في المثلث  $ABC$ ،  $D \in AB$ ،  $H \in AG$ ،  $H = 4$  جـ.  
إذا كان  $AD = 10$  سم،  $DB = 8$  سم. حدد ما إذا كان  $DH \parallel BG$ . فسر إجابتك.

- ١٠  $ABGH$  شكل رباعي تقاطع قطراته في  $H$ . فإذا كان  $AH = 6$  سم،  $BH = 13$  سم،  $HG = 10$  سم،  
 $HD = 7$  سم. أثبت أن الشكل  $ABGH$  شبه منحرف.


- ١١ أثبت أن القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفى ضلعين فى مثلث يوازى ضلعه الثالث، وطولها يساوى  
نصف طول هذا الضلع.

- ١٢  $ABGH$  مثلث،  $D \in AB$  حيث  $AD = 2$  بـ،  $H \in AG$  حيث  $HG = 3$  جـ، رسم  $AS$  يقطع  $BG$   
فى  $S$ . إذا كان  $AO = 8$  سم،  $AS = 20$  سم، حيث  $W \in AS$ . أثبت أن النقطة  $W$ ،  $H$  على استقامة واحدة.

- ١٣  $ABGH$  مثلث،  $D \in BG$ ، بحيث  $\frac{BD}{DG} = \frac{3}{4}$  ،  $H \in AG$  ، بحيث  $\frac{AH}{HG} = \frac{3}{7}$  ، رسم  $GD$  فقط  $\leftarrow$   $\overrightarrow{AB}$  فى  $S$ ،  
رسم  $WD \parallel GS$  فقط  $\overleftarrow{AB}$  فى  $S$ . أثبت أن  $AS = BC$ .




- ١٤  $ABGH$  مستطيل تقاطع قطراته في  $M$ .  $H$  منتصف  $AM$  ،  $M$  منتصف  $BG$ . رسم  $GD$  يقطع  $AB$  فى  $S$ ،  
ورسم  $WD \parallel BG$  فى  $S$ . أثبت أن:  $SC \parallel AG$ .

١٥ اكتب ما تساويه كل من النسب التالية مستخدماً الشكل المقابل:



$$\begin{array}{ll} \text{أ} & \frac{AB}{BG} = \frac{1}{2} \\ \text{ب} & \frac{AJ}{JG} = \frac{1}{3} \\ \text{ج} & \frac{AM}{MB} = \frac{2}{3} \\ \text{د} & \frac{AH}{HB} = \frac{3}{4} \\ \text{هـ} & \frac{AG}{GD} = \frac{1}{2} \\ \text{وـ} & \frac{AF}{FB} = \frac{1}{2} \\ \text{صـ} & \frac{AC}{CG} = \frac{3}{4} \\ \text{مـ} & \frac{AB}{BC} = \frac{1}{2} \end{array}$$

١٦ في كل من الأشكال التالية، احسب قيم س، ص العددية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



١٧ في الشكل المقابل:

$$\begin{array}{l} \overline{AB} \cap \overline{GE} = \{M\}, \quad \overline{HE} \parallel \overline{AB} \\ \text{و } \overline{EM} \perp \overline{AE}, \quad \overline{AG} \parallel \overline{HE} \end{array}$$




أوجد:

$$\begin{array}{ll} \text{أ} & \text{طول } \overline{ME} \\ \text{بـ} & \frac{\text{طول } \overline{AM}}{\text{طول } \overline{AE}} \end{array}$$

١٨  $\overline{AB} \cap \overline{GE} = \{H\}$ ,  $S \in \overline{AB}$ ,  $S \in \overline{GE}$ , وكان  $\overline{SC} \parallel \overline{BD} \parallel \overline{AG}$

أثبت أن:  $AS \times HE = GC \times HB$

١٩ في كل من الأشكال التالية، احسب قيم س، ص العددية:



٢٠ اب جـ شكل رباعي فيه  $\overline{AB} \parallel \overline{GC}$ , تقاطع قطران في M، نصف  $\overline{BG}$  في Hـ،

ورسم  $\overline{HO} \parallel \overline{BA}$ ، ويقطع  $\overline{BD}$  في S،  $\overline{AG}$  في صـ،  $\overline{AO}$  في وـ.

أثبت أن:

$$\text{أ} \quad HE = \frac{1}{2} AB. \quad \text{بـ} \quad \frac{AS}{GM} = \frac{BS}{OM}$$

## منصف الزاوية والأجزاء المتناسبة


### Angle Bisectors and Proportional Parts

٢ - ٣



#### سوف تتعلم

- خصائص منصفات زوايا المثلث.
- استخدام التناوب في حساب أطوال القطع المستقيمة الناتجة عن تنصيف زاوية في مثلث.
- نمذجة وحل مشكلات حياتية تتضمن منصفات زوايا المثلث.



- ١- ارسم المثلث  $A B C$ ، وإرسم  $\overrightarrow{AD}$  ليقطع  $\overline{BC}$  في  $D$ .
- ٢- قس كلاً من  $\overline{BD}$ ،  $\overline{DC}$ ،  $\overline{AB}$ ،  $\overline{AC}$ .
- ٣- احسب كل من النسبتين  $\frac{BD}{DC}$ ،  $\frac{AB}{AC}$  وقارن بينهما.
- ٤- ماذا تستنتج؟  
كرر العمل السابق عدة مرات.  
هل يتحقق استنتاجك؟ عبر عن استنتاجك بلغتك.

#### Bisector of an Angle of a Triangle


#### منصف زاوية مثلث

#### المصطلحات الأساسية

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| Bisector          | منصف       |
| Interior Bisector | منصف داخل  |
| Exterior Bisector | منصف خارجي |
| Perpendicular     | عمودي      |

إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو زاوية الخارجة للمثلث عند هذا الرأس، وقسم المنصف قاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين فإن النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولى الضلعين الآخرين

**نظريّة**  
٣




المعطيات:  $A B C$  مثلث،  $\overrightarrow{AD}$  ينصف  $\angle B A C$   
(من الداخل في شكل أ ، من الخارج في شكل ب).

$$\text{المطلوب: } \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

البرهان : ارسم  $\overleftrightarrow{GH} // \overrightarrow{AD}$  ويقطع  $\overline{AC}$  في  $H$ . اتبع المخطط التالي وابدأ بالبرهان.

#### الأدوات والوسائل


- أدوات هندسية للرسم.
- حاسوب آلي وبرامج رسومية.
- جهاز عرض بيانات.



مثال

- ١ أـبـجـ مثلث فيه أـبـ = ٨ سم، أـجـ = ٦ سم، بـجـ = ٧ سم، رسم أـيـ ينـصـفـ ∠ـبـأـجـ ويـقـطـعـ بـجـ فيـيـ. أـوـجـدـ طـولـ كـلـ مـنـ بـيـ، جـيـ


الحل



$$\begin{aligned} & \because \text{أـيـ يـنـصـفـ } \angle \text{ـبـأـجـ} \quad \therefore \frac{بـي}{جـي} = \frac{أـي}{جـي} \quad (\text{نظـرـيـةـ}) \\ & \therefore \frac{بـي}{جـي} = \frac{أـب}{جـي} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \quad \therefore \frac{بـي}{جـي} = \frac{بـي}{جـي} + جـي = 7 \quad \therefore 7 - بـي = \frac{بـي}{3} \\ & \text{(ضرب تبادلي)} \quad \therefore 3(7 - بـي) = 4(بـي) \\ & \therefore 21 - 3بـي = 4بـي \quad \therefore 21 = 7بـي \quad \therefore بـي = 3 \quad \therefore جـي = 4 \end{aligned}$$

حاول أن تحل


- ١ في كل من الأشكال التالية أـوـجـدـ قـيـمـةـ سـ العـدـدـيـةـ (الأـطـوـالـ مـقـدـرـةـ بـالـسـنـتـيـمـترـاتـ)



مثال

- ٢ أـبـجـ مثلث. رـسـمـ بـيـ يـنـصـفـ ∠ـبـ، وـيـقـطـعـ أـجـ فـيـيـ، حـيـثـ أـيـ = ١٤ سم، جـيـ = ١٨ سم. إـذـاـ كانـ مـحـيـطـ Δـأـبـجـ = ٨٠ سم، فـأـوـجـدـ طـولـ كـلـ مـنـ بـجـ، جـيـ، أـبـ.

الحل



$$\begin{aligned} & \text{في } \triangle \text{ـأـبـجـ} \\ & \because \text{بـيـ يـنـصـفـ } \angle \text{ـبـ} \quad \therefore \frac{أـب}{جـي} = \frac{أـي}{جـي} \\ & \therefore \frac{أـب}{جـي} = \frac{أـب}{جـي} = \frac{14}{9} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9} \quad \therefore \frac{أـب}{جـي} = \frac{أـب}{جـي} + جـي = 32 \quad \therefore 32 - أـب = \frac{أـب}{9} \\ & \therefore 32 \cdot 9 - 9\cdot أـب = أـب \quad \therefore 288 - 9\cdot أـب = أـب \quad \therefore 288 = 10\cdot أـب \quad \therefore أـب = 28.8 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{أب}{ب ج} = \frac{٧}{٩} \quad (\text{خواص التناوب})$$

$$\therefore ب ج = \frac{٤٨}{٩} \quad \therefore ب ج = ٤٢ \text{ سم}$$

### حاول أن تحل

- ٢) أب ج مثلث قائم الزاوية في ب. رسم  $\overset{\leftarrow}{أك}$  ينصف  $\triangle أك$ ، ويقطع  $\overline{ب ج}$  في د.  
إذا كان طول  $\overline{ب د} = ٢٤$  سم،  $ب د : أ ج = ٣ : ٥$  فأوجد محيط  $\triangle أب ج$ .

### ملاحظة هامة

١- في المثلث  $\triangle أب ج$  حيث  $أب \neq أج$ :

إذا كان  $\overset{\leftarrow}{أك}$  ينصف  $\triangle ب أ ج$

$\overset{\leftarrow}{أه}$  ينصف الزاوية الخارجية للمثلث عند أ.

$$\text{فإن: } \frac{ب د}{د ج} = \frac{ب أ}{أ ج}, \quad \frac{ب ه}{ه ج} = \frac{ب أ}{أ ج}$$

$$\text{ويكون } \frac{ب د}{د ج} = \frac{ب ه}{ه ج}$$

أي أن  $\overline{ب ج}$  تنقسم من الداخل في د ومن الخارج في ه بنسبة واحدة  
ويكون المنصفين  $\overset{\leftarrow}{أك}$ ،  $\overset{\leftarrow}{أه}$  متعامدين . (لماذا؟)

٢- إذا كان  $أب > أج$ ، قطع منصف  $\triangle أ$  الضلع  $\overline{ب ج}$  في د حيث  $ب د > د ج$ ، أما منصف الزاوية الخارجية  
عند A فيقطع  $\overline{ب ج}$  في ه حيث  $ب ه > ه ج$ .

### تفكير ناقد

« كلما كبر أ ج ماذا يحدث للنقطة د؟ »


« إذا كان  $أ ج = أب$  أين تقع النقطة د؟ وما وضع  $\overset{\leftarrow}{أه}$  بالنسبة إلى  $\overline{ب ج}$  عندئذ؟ »

« عندما يصبح  $أ ج > أب$  ما العلاقة بين د ج، د ب، وأين تقع ه عندئذ؟ قارن إجابتك مع زملائك. »

### مثال

٣) أب ج مثلث فيه  $أب = ٦$  سم،  $أج = ٤$  سم،  $ب ج = ٥$  سم. رسم  $\overset{\leftarrow}{أك}$  ينصف  $\triangle أك$ ، ويقطع  $\overline{ب ج}$  في د.  
ورسم  $\overset{\leftarrow}{أه}$  ينصف  $\triangle أ$  الخارجية ويقطع  $\overline{ب ج}$  في ه. احسب طول د ه.

### الحل



$\therefore \overset{\leftarrow}{أك}$  ينصف  $\triangle أك$ ،  $\overset{\leftarrow}{أه}$  ينصف  $\triangle أ$  الخارجية

$\therefore د، ه$  تقسمان  $\overline{ب ج}$  من الداخل ومن الخارج بنفس النسبة.

$$\text{أي أن: } \frac{ب د}{د ج} = \frac{ب ه}{ه ج} = \frac{ب أ}{أ ج}$$


$$\therefore \frac{ب د}{د ج} = \frac{ب ه}{ه ج} = \frac{٣}{٢} = \frac{٦}{٤}$$

$$\therefore ب ج = ب د + د ج = ٥, \quad ب ه - ه ج = ب ج = ٥$$




### حاول أن تحل

٤ في كل من الأشكال التالية (الأبعاد مقدرة بالستيمترات) احسب قيمة س وطول  $\overline{AD}$




**للحظ أن:** في الشكل المقابل:  $\overline{AD}$  ينصف  $\angle B$  من الخارج

$$\text{ويقطع } \overline{BC} \text{ في } H. \text{ فإن: } AH = AB \cdot \frac{1}{2} \cdot HG - AB \cdot \frac{1}{2} \cdot BG$$




### حاول أن تحل

٥ في كل من الأشكال التالية (الأبعاد مقدرة بالستيمترات) احسب قيمة س، وطول  $\overline{AH}$



### مثال

في الشكل المقابل:  $\overline{AD}$  متوسط في  $\triangle ABC$ .  
 $\overline{AS}$  ينصف  $\angle A$ .  $\overline{AB}$  يقطع  $\overline{AS}$  في س.  
 $\overline{AC}$  ينصف  $\angle A$  و  $\overline{AC}$  يقطع  $\overline{AB}$  في ص.  
أثبت أن:  $SC/AB = AC/BC$ .



### الحل

في  $\triangle ABD$ :  $\because \overline{AS}$  ينصف  $\angle A$  ب

في  $\triangle ACD$ :  $\because \overline{AC}$  ينصف  $\angle A$  ب

في  $\triangle ABC$ :  $\because \overline{AD}$  متوسط

من (١)، (٢)، (٣)

$$(1) \quad \therefore \frac{AS}{SB} = \frac{AC}{CB}$$

$$(2) \quad \therefore \frac{AS}{SC} = \frac{AC}{CB}$$


$$(3) \quad \therefore SC = SB$$

ويكون  $SC/AB = AC/BC$ .


$$\frac{AS}{SC} = \frac{AC}{CB}$$

### حاول أن تحل

٦ في كل من الأشكال التالية أثبت أن:  $\overline{h} \parallel \overline{b}$



(ب)




### تفكير منطقى

في الشكل المقابل:  $w \in b$ .

كيف يمكن رسم  $\overline{h}$  يقطع  $\overline{b}$  في  $\overline{h}$  لحساب النسبة  $\frac{b}{h}$ ؟

إذا كان  $\frac{b}{h} = \frac{1}{2}$  ماذا نستنتج؟



### حالات خاصة

١- في  $\triangle A B C$ :

إذا كان  $w \in b$ , حيث  $\frac{b}{h} = \frac{1}{2}$   
فإن:  $\overleftrightarrow{AD}$  ينصف  $\overline{BC}$

وإذا كان  $h \in b$ ,  $h \neq b$ , حيث  $\frac{b}{h} = \frac{1}{2}$   
فإن:  $\overleftrightarrow{AH}$  ينصف  $\triangle ABC$  الخارجة عن المثلث  $ABC$



ويعرف هذا بعكس النظرية السابقة.

٢- في الشكل المقابل:

$\overline{b}, \overline{h}$  منصفاً زاويتا  $B, C$

يتقاطعاً في نقطة  $H \in \overleftrightarrow{AD}$ . ماذا تستنتج؟

حقيقة: منصفات زوايا المثلث تقاطع في نقطة واحدة.



### مثال

٦  $\triangle ABC$  مثلث فيه  $A B = 18$  سم،  $B C = 15$  سم،  $C A = 12$  سم،  $w \in b$ , حيث  $b = 9$  سم.  
رسم  $\overleftrightarrow{AD}$  فقط  $\overline{b}$  في  $\overline{h}$ . أثبت أن  $\overleftrightarrow{AD}$  ينصف  $\overline{BC}$  ثم أوجد طول  $\overline{h}$ .

### الحل


في  $\triangle ABC$ :  $\frac{AB}{AC} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

$$AC = BC - AB = 15 - 12 = 3 \text{ سم}$$

$$\therefore \frac{AC}{BC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{b}{h} = \frac{1}{2}$$

$\overleftrightarrow{AD}$  ينصف  $\overline{BC}$



$\therefore \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{AO}$  ويقطع  $\overrightarrow{BG}$  في  $H$ .

$$\text{ويكون } \frac{BH}{HG} = \frac{AB}{AG}$$

$$HG = 30 \text{ سم}$$

$\therefore \overrightarrow{AH}$  ينصف  $\triangle ABG$  الخارج عن  $\triangle ABG$

$$\therefore BH = BG + GH \quad \therefore \frac{18}{12} = \frac{10}{GH} + \frac{10}{GH}$$

### حاول أن تحل

- ٧ اب ج د شكل رباعي فيه  $AB = 18$  سم،  $BG = 12$  سم،  $HD = 3$  سم  $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BD}$  بحيث  $\angle AHD = 12^\circ$   
رسم  $\overrightarrow{HO} / / \overrightarrow{GD}$  فقطع  $\overrightarrow{GD}$  في O. أثبت أن  $\overrightarrow{BO}$  ينصف  $\triangle ABD$

### مثال


- ٨  $\overline{AB}$  قطر في دائرة،  $\overline{AJ}$  وتر فيها. رسم  $\overline{GD}$  مماس للدائرة عند ج فقطع  $\overline{AB}$  في D.

إذا كانت  $H \in \overline{AB}$  بحيث  $\frac{KB}{BH} = \frac{KG}{GH}$  أثبت أن:

$$B \frac{KA}{KB} = \frac{AH}{BH}$$

- ٩  $\overline{GD}$  ينصف الزاوية الخارجية للمثلث  $JDH$  عند ج.

### الحل



(١)

$$\therefore \frac{KB}{BH} = \frac{KG}{GH}$$

$\therefore \overline{GD}$  ينصف  $\angle JGD$

$\therefore \overline{AB}$  قطر في الدائرة

$$\therefore \angle AHD = 90^\circ \text{ و يكون } \overline{GD} \perp \overline{AB}$$

$\therefore \overline{GD}$  ينصف  $\angle JGD$

$\therefore \overline{GD}$  منصف للزاوية الخارجية عند ج

(منصفاً الزاوية متعمدان) (وهو المطلوب أولاً)

$$\text{ويكون } \frac{KA}{AH} = \frac{KG}{GH}$$

(وهو المطلوب ثانياً)

$$\text{يتبّع أن: } \frac{KA}{AH} = \frac{KB}{BH} \quad \therefore \frac{KA}{AH} = \frac{KB}{BH}$$


من (١)، (٢)

الحل

### حاول أن تحل

- ٩ دائرتان م، ن متتمستان من الخارج في A. رسم مستقيم يوازي  $\overline{MN}$  قطع الدائرة M في ب، ج، والدائرة N في د، ه على الترتيب. فإذا تقاطع  $\overline{BM}$ ،  $\overline{DN}$  في النقطة و. أثبت أن  $\overline{AO}$  ينصف  $\overline{MN}$  ون.

### تحقق من فهمك



**حل مشكلات:** يبين الشكل المقابل تقسيماً لقطعة أرض مستطيلة الشكل


إلى أربعة أقسام مختلفة بالمستقيمين بـ د، بـ ه،  $\overrightarrow{AH}$ ، حيث  $H \in \overline{BG}$ ،

$$D \cap \overrightarrow{AH} = \{S\}.$$

إذا كان  $AB = BD = 42$  متر،  $AH = 56$  متر.

احسب مساحة القطعة AB س بالأمتار المربعة و طول AS

## تمارين ٣ - ٢







١ في الشكل المقابل:  $\overleftarrow{أد}$  ينصف  $\triangle$ . أكمل:

$$\text{.....} = \frac{\text{أب}}{\text{ب}} \quad \text{.....} = \frac{\text{أج}}{\text{ج}}$$

$$\text{.....} = \frac{\text{بج}}{\text{ب}} \quad \text{.....} = \frac{\text{بج}}{\text{ج}}$$




٢ في كل من الأشكال التالية، أوجد قيمة س (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



٣ أ ب ج مثلث محيطه ٢٧ سم، رسم  $\overleftarrow{بـد}$  ينصف  $\triangle$  ب ويقطع  $\overline{اج}$  في د.



إذا كان  $أد = ٤$  سم،  $جـد = ٥$  سم، أوجد طول كل من  $\overline{أب}$ ،  $\overline{بـج}$ ،  $\overline{أـج}$

٤ في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س، ثم أوجد محيط  $\triangle$  أ ب ج.






٥ أ ب ج مثلث فيه  $أب = ٨$  سم،  $أـج = ٤$  سم،  $بـج = ٦$  سم، رسم  $\overleftarrow{أـد}$  ينصف  $\triangle$  و يقطع  $\overline{بـج}$  في د، ورسم  $\overleftarrow{أـه}$  ينصف  $\triangle$  الخارجية و يقطع  $\overline{بـج}$  في ه. أوجد طول كل من  $\overline{دـه}$ ،  $\overline{أـه}$ ،  $\overline{أـه}$ .

٦ في كل من الأشكال التالية: أثبت أن  $\overline{SC} \parallel \overline{B_1G}$



٧ في كل من الأشكال التالية، أثبت أن  $\overline{BH}$  ينصف  $\triangle ABC$ .




٨ في الشكل المقابل:  $\overline{HD} \parallel \overline{SC} \parallel \overline{BG}$ ,

$$AD \times BS = AG \times HS.$$

أثبت أن  $\overline{AC}$  ينصف  $\angle JAI$ .

٩  $\triangle ABC$  مثلث و  $\overline{B_1G} \parallel \overline{BG}$  حيث  $G_1 = A$ . رسم  $\overline{GH} \parallel \overline{AB}$  ويقطع  $\overline{AB}$  في  $H$ ، ورسم  $\overline{HO} \parallel \overline{BG}$  ويقطع  $\overline{AG}$  في  $O$  وأثبت أن  $\overline{BO}$  ينصف  $\triangle ABC$



١٠ في الشكل المقابل:  $\triangle ABC$  مثلث فيه  $AB = 6$  سم،  $AC = 9$  سم،

$$BC = 10$$
 سم.  $\overline{D_1G} \parallel \overline{BG}$  بحيث  $B_1 = D$  = 4 سم.

رسم  $\overline{BH} \perp \overline{AD}$  ويقطع  $\overline{AD}$ ،  $\overline{AB}$  في  $H$ ، وعلى الترتيب.

أثبت أن  $\overline{AO}$  ينصف  $\triangle ABC$ .

أوجد م( $\triangle ABO$ ) : م( $\triangle JBG$ )

## تطبيقات التناسب في الدائرة

### Applications of Proportionality in the Circle

٣ - ٣


#### سوف نتعلم

- إيجاد قوة نقطة بالنسبة لدائرة.
- تحديد موقع نقطة بالنسبة لدائرة.
- إيجاد قياسات الزوايا الناتجة من تقاطع الأوتار والمسامس في الدائرة.
- نمذجة وحل تطبيقات تشمل إيجاد طول المنصف الداخلي والخارجي لزاوية.



كيف يمكن إنشاء قطعة مستقيمة يكون طولها ل وسطاً متناسباً بين طولين س، ص لقطعتين معلومتين؟

في كل من الشكلين التاليين  $أب = س$  ،  $اج = ص$  ،  $أى = ل$



$$\therefore \triangle أب \sim \triangle جـ (لماذا) \quad \therefore \frac{أب}{أـ} = \frac{اج}{ـج}$$

ويكون  $\frac{س}{ـ} = \frac{ـ}{ـ} = س \times ص$  أي أن ل وسط متناسب بين س، ص

#### عمل تعاوني

أنشئ قطعاً مستقيمة أطوالها ٣٦، ١٥٦، ٢٤٦

قارن رسمك مع زملائك وتحقق من صحة إجابتك مستخدماً الآلة الحاسبة والقياس.

#### المصطلحات الأساسية


Power of a point	قوة نقطة
Circle	دائرة
Chord	وتر
Tangent	ماس
Secant	قاطع
Diameter	قطر
Concentric Circles	دواير متعددة المركز
Common External Tangent	ماس خارجي مشترك
Common Internal Tangent	ماس داخلي مشترك

#### Power of a point

**تعريف**  
قوة النقطة أ بالنسبة للدائرة م التي طول نصف قطرها بـ هو العدد الحقيقي  $و_م(A)$  حيث:  $و_م(A) = (A)^2 - بـ^2$

#### الأدوات والوسائل

- أدوات هندسية للرسم والقياس



#### ملاحظات هامة

##### ملاحظة ١

يمكن التنبؤ بموقع نقطة أ بالنسبة للدائرة م  
فإذا كان:  $و_م(A) < 0$  فإن أقع خارج الدائرة.  
 $و_م(A) = 0$  فإن أتقع على الدائرة.  
 $و_م(A) > 0$  فإن أتقع داخل الدائرة.

### مثال

- ١ حدد موقع كل من النقط أ، ب، ج بالنسبة للدائرة م التي طول نصف قطرها ٥ سم إذا كان:  $r_m = 11$  ،  $r_m(b) = \text{صفر}$  ،  $r_m(j) = 16$ ، ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة.

**الحل**


$$\begin{aligned} & \therefore r_m(A) = 11 > 5 \\ & \therefore \text{أ} \text{ تقع خارج الدائرة} \\ & \therefore r_m(A) = (5)^2 - 11^2 \\ & \therefore r_m(B) = \text{صفر} \\ & \therefore \text{ب تقع على الدائرة} \\ & \therefore r_m(B) = 5 \\ & \therefore r_m(C) = 16 < 5 \\ & \therefore \text{ج تقع داخل الدائرة} \\ & \therefore r_m(C) = (5)^2 - 16^2 \\ & \therefore r_m(C) = -116 \end{aligned}$$

### حاول أن تحل

- ١ حدد موقع كل من النقط أ، ب، ج بالنسبة للدائرة ن التي طول نصف قطرها ٣ سم، ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة في كل من الحالات الآتية:


أ  $r_n(A) = 15$       ب  $r_n(B) = \text{صفر}$       ج  $r_n(C) = -4$

### ملاحظة ١



$$\begin{aligned} & \text{إذا وقعت النقطة أ خارج الدائرة م فإن: } r_n(A) = (5)^2 - 18^2 \\ & = (5 - 18)(5 + 18) \\ & = 5 \times 18 = (5)^2 \\ & \therefore \text{طول المماس المرسوم من النقطة أ للدائرة م} = \sqrt{r_n(A)} \end{aligned}$$

### ملاحظة ٢



$$\begin{aligned} & \text{إذا وقعت النقطة أ داخل الدائرة م فإن: } r_n(A) = (5)^2 - 2^2 \\ & = (5 - 2)(5 + 2) \\ & = -(5 - 2)(5 + 2) \\ & = -3 \times 7 = -21 \\ & = -5 \times 5 = (-5)^2 \end{aligned}$$

### وبصفة عامة

**أ داخل الدائرة م**

$$r_m(A) = -1 \times 3 = -1 \times 3 / (-5)^2 = (-5)^2$$


**أ خارج الدائرة م**

$$r_m(A) = 15 \times 3 = 15 \times 3 / (5)^2 = (5)^2$$

## مثال

- الدائرة م طول نصف قطرها ٣١ سم. النقطة أ تبعد عن مركزها ٢٣ سم، رسم الوتر  $\overline{B\bar{C}}$  حيث  $A \in \overline{B\bar{C}}$ ،  
 أ ب = أ ج احسب:  
 ب بعد الوتر  $\overline{B\bar{C}}$  عن مركز الدائرة.

## الحل



$$\begin{aligned} \text{أ: } & \text{م}\text{ع} = 31 \text{ سم, } \text{م}\text{م} = 23 \text{ سم, } A \in \overline{B\bar{C}} \\ & \therefore \text{أقع داخل الدائرة ويكون} \\ & \text{فم}(A) = (\text{م}\text{م})^2 - \text{م}\text{ع}^2 = -\text{أب}^2 + \text{أج}^2 \\ & \therefore \text{أج} = \sqrt{(\text{م}\text{م})^2 - (\text{م}\text{ع})^2} = \sqrt{31^2 - 23^2} = \sqrt{120} \text{ سم} \\ & \therefore \text{طول الوتر } \overline{B\bar{C}} = 2\text{أج} = 2\sqrt{120} = 4\sqrt{30} = 4\sqrt{48} = 4\sqrt{12} = 4\sqrt{4} \times \sqrt{3} = 8\sqrt{3} \text{ سم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ب: } & \text{بفرض أن بعد الوتر عن مركز الدائرة } = M \text{ حيث } M \perp \overline{B\bar{C}} \\ & \therefore M \perp \overline{B\bar{C}} \text{ و يكون } B \in M \\ & \therefore M = \sqrt{385} \approx 19.6 \text{ سم} \\ & \therefore (M)^2 = (M)^2 - (B\bar{C})^2 = 385 - 120 = 265 \text{ سم} \end{aligned}$$


## حاول أن تحل

- الدائرة ن طول نصف قطرها ٨ سم. النقطة ب تبعد ١٢ سم عن مركز الدائرة، رسم مستقيم يمر بالنقطة ب ويفقط الدائرة في نقطتين ج، د، حيث ج ب = ج د، احسب طول الوتر ج د وبعده عن النقطة ن.

## مثال

- دائرتان م، ن متقاتعتان في أ، ب. ج د  $\not\parallel$  ب أ، رسم ج د  $\leftarrow$  فقطع الدائرة م في د، ه حيث ج د = ٩ سم، د ه = ٧ سم، ورسم ج د  $\leftarrow$  يمس الدائرة ن عند و. أثبت أن فم(ج) = فن(ج). ب إذا كان أب = ١٠ سم. أوجد طول كل من أ ج، ج د.

## الحل



$$\begin{aligned} \text{أ: } & \text{ج د تقع خارج الدائرة } M, \text{ ج د} \perp \text{قطاع } M \text{ للدائرة } M. \\ & \therefore \text{فم}(ج) = \text{ج د} \times \text{ج ه} = \text{ج د} \times \text{ج ب} \quad (1) \\ & \text{ب: } \text{ج د تقع خارج الدائرة } N, \text{ ج د} \perp \text{قطاع } N, \text{ ج د} \text{ مماس لها.} \\ & \therefore \text{فن}(ج) = \text{ج د} \times \text{ج ب} = (\text{ج د})^2 \quad (2) \\ & \text{من (1), (2)}: \text{فم}(ج) = \text{فن}(ج) = 9 \times 16 = 144 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ب: } & \text{أب} = 10 \text{ سم} \quad \therefore \text{فم}(ج) = \text{ج د} (\text{ج د} + 10) = (\text{ج د})^2 = 144 \\ & \therefore (\text{ج د})^2 + 10 \text{ ج د} - 144 = 0 \\ & \therefore \text{ج د} = 8 \text{ سم} \\ & \therefore \text{ج د} = 12 \text{ سم} \quad \therefore (\text{ج د})^2 = 144 \end{aligned}$$

## ملاحظة هامة

تسمى مجموعة النقاط التي لها نفس القوة بالنسبة لدائرتين مختلفتين بمحور الأساسي للدائرتين.

**إذا كان**  $f_m(A) = f_m(C)$  **فإن** أتقع على المحور الأساسي للدائرتين  $M, N$ .

في المثال السابق لاحظ أن:  $f_m(H) = f_m(G)$ ,  $f_m(A) = f_m(C)$  صفرًا،  $f_m(B) = f_m(D)$  صفرًا

$\therefore \overleftrightarrow{AB}$  محور أساسي للدائرتين  $M, N$ .

### حاول أن تدل

- ٣ الدائريتان  $M, N$  متماستان من الخارج في  $A$ ,  $\overleftrightarrow{AB}$  مماس مشترك للدائرتين  $M, N$ ,  $\overleftrightarrow{HG}$  يقطع الدائرة  $M$  في  $G, H$ ,  $\overleftrightarrow{HG}$  يقطع الدائرة  $N$  في  $H$ , وعلى الترتيب.
- أ ثبت أن:  $\overleftrightarrow{AB}$  محور أساسي للدائرتين  $M, N$
  - ب إذا كان  $f_m(B) = 36^\circ$ ,  $f_m(G) = 45^\circ$ ,  $f_m(H) = 9^\circ$ . أوجد طول كل من  $\overline{GH}$ ,  $\overline{AB}$ ,  $\overline{HG}$ .


## ثانياً: القاطع والمماس وقياسات الزوايا

سبق ودرست:

١- إذا تقاطع قاطعان داخل دائرة فإن قياس زاوية تقاطعهما يساوى نصف مجموع قياسي القوس المقابل لهذه الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.

في الشكل المقابل:  $\overleftrightarrow{AB} \cap \overleftrightarrow{HG} = \{H\}$

$$\text{فإن: } f_m(\angle AHB) = \frac{1}{2}[f_m(\widehat{AG}) + f_m(\widehat{GB})]$$




٢- إذا تقاطع قاطعان خارج دائرة فإن قياس زاوية تقاطعهما يساوى نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها.

في الشكل المقابل:  $\overleftrightarrow{AB} \cap \overleftrightarrow{HG} = \{H\}$

$$\text{فإن: } f_m(\angle AHB) = \frac{1}{2}[f_m(\widehat{AG}) - f_m(\widehat{GB})]$$

### حاول أن تدل

٤ في كل من الأشكال الآتية: أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.





استنتاج قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطع ومماس (أو مماسين) لدائرة.

القاطع والمماس (أو المماسان) لدائرة المتقطعان خارج الدائرة، يكون قياس زاوية تقاطعهما مساوياً نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها.

تمرين  
مشهور

### البرهان

الحالة الأولى: تقاطع القاطع والمماس لدائرة.



$$\therefore \angle \alpha \text{ جـب خارجـة عن } \triangle ABC \text{ جـ}$$

$$\therefore \omega(\angle \alpha) = \omega(\angle BGD) - \omega(\angle GDB)$$

$$= \frac{1}{2}\omega(BD) - \frac{1}{2}\omega(BG)$$

$$= \frac{1}{2}[\omega(BS) - \omega(BG)]$$

$$\therefore \angle \alpha \text{ جـب خارجـة عن } \triangle ABC \text{ جـ}$$




$$\therefore \omega(\angle \alpha) = \omega(\angle BGD) - \omega(\angle GDB)$$

$$= \frac{1}{2}\omega(BD) - \frac{1}{2}\omega(BG)$$

$$= \frac{1}{2}[\omega(BD) - \omega(BG)]$$

### حاول أن تحل

٥ مستعيناً بمعطيات الشكل، أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.




### مثال

٤ **الربط بالأقمار الصناعية:** يدور قمر صناعي في مدار، محافظاً في أثناء دورانه على ارتفاع ثابت فوق منطقة خط الاستواء، وتستطيع آلة التصوير به رصد قوس طوله ٦٠١١ كم على سطح الأرض. إذا كان قياس هذا القوس  $54^\circ$ . فأوجد:

**أ** قياس زاوية آلة التصوير الموضوعة على القمر الصناعي.

**ب** طول نصف قطر الأرض عند دائرة خط الاستواء.

### الحل



نمنجة المشكلة: باعتبار الدائرة م هي دائرة خط الاستواء يكون

$\angle(\widehat{B\text{---}C}) = 54^\circ$ ، وطول  $\widehat{B\text{---}C} = 6011$  كم.

أ : قياس الدائرة =  $360^\circ$

$$\therefore \angle(\widehat{B\text{---}C}) = 360^\circ - 54^\circ = 306^\circ$$

$$\text{ويكون } \angle(A) = \frac{1}{2} [\angle(\widehat{B\text{---}C}) - \angle(\widehat{B\text{---}C})]$$

$$= 126^\circ - (306^\circ - 54^\circ) = \frac{1}{2} = 126^\circ$$

ب في الدائرة يتناسب طول القوس مع قياسه

$$\therefore \text{مع} = \frac{6011}{\frac{54}{360} \times \pi \times 2}$$

∴ طول نصف قطر الأرض عند خط الاستواء  $\approx 6378$  كم.

### تذكرة

$$\frac{\text{طول القوس}}{\text{قطر الدائرة}} = \frac{\text{قياس الزاوية}}{\text{محيط الدائرة}}$$

### حاول أن تحل

٦ تدور بكرة عند محور م بواسطة سير يمر على بكرة صغيرة عند A.


إذا كان قياس الزاوية بين جزئي السير  $40^\circ$ . فأوجد طول  $\widehat{B\text{---}C}$  الأكبر، علماً بأن طول نصف قطر الكرة الكبيرة ٩ سم.

٧ في الشكل المقابل: دائرة M طول نصف قطرها ٩ سم،  $\overline{AB}$ ،  $\overline{AC}$


مماسان للدائرة عند B، C. يقطع الدائرة في D، E، F في س رسم  $\overline{BD}$  فقطع  $\overline{AC}$  في H. إذا كان  $\angle(H) = 144^\circ$  أوجد:

أ طول  $\overline{AB}$

ب طول  $\overline{AS}$ .




### تحقق من فهمك



حل مشكلات: بين الشكل المقابل مخططاً لحديقة على شكل دائرة. أنشئ ممررين للمشاة أحدهما خارج الحديقة يمسها في النقطة B والآخر يقطع الحديقة في نقطتي C، D ويتقاطع الممران عند A.

إذا كان  $\angle(M) = 100^\circ$ ،  $\angle(A) = 5^\circ$  أمتر.

أوجد طول كل من  $\overline{AB}$ ،  $\overline{CD}$ ، ثم أوجد  $\angle(BD)$ .



## تمارين ٣ - ٣

١ حدد موقع كل من النقطة التالية بالنسبة إلى الدائرة  $M$ ، والتي طول نصف قطرها  $10$  سم، ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة.

ج)  $Q_M =$  صفر

ب)  $Q_M(b) =$   $96$

أ)  $Q_M(A) =$   $-36$

٢ أوجد قوة النقطة المعطاة بالنسبة إلى الدائرة  $M$ ، والتي طول نصف قطرها  $10$  سم:

أ) النقطة  $A$  حيث  $A_M = 12$  سم ،  $Q_M = 9$  سم

ب) النقطة  $B$  حيث  $B_M = 8$  سم ،  $Q_M = 15$  سم

ج) النقطة  $C$  حيث  $C_M = 7$  سم ،  $Q_M = 7$  سم

د) النقطة  $D$  حيث  $D_M = 4$  سم ،  $Q_M = 17$  سم

٣ إذا كان بعد نقطة عن مركز دائرة يساوى  $25$  سم وقوة هذه النقطة بالنسبة إلى الدائرة يساوى  $400$ .  
أوجد طول نصف قطر هذه الدائرة.

٤ الدائرة  $M$  طول نصف قطرها  $20$  سم. نقطة تبعد عن مركز الدائرة مسافة  $16$  سم، رسم الوتر  $\overline{BQ}$ .  
حيث  $A \in \overline{BQ}$  ،  $AB = 12$  ج. إحسب طول الوتر  $\overline{BQ}$ .


٥ في الشكل المقابل: الدائرتان  $M$ ،  $N$  متتقاطعتان في  $A$ ،  $B$

حيث  $A \in \overleftrightarrow{BQ} \cap \overleftrightarrow{HO} = \{S\}$  ،  $SQ = 2$  ج ،  $HO = 10$  سم ،  
 $Q_N(S) = 144$ .


أ) أثبت أن  $\overleftrightarrow{AB}$  محور أساسى للدائرةتين  $M$ ،  $N$ .

ب) أوجد طول كل من  $\overline{SQ}$  ،  $\overline{SO}$  و


ج) أثبت أن الشكل  $QHO$  رباعي دائري.




٦ مستعيناً بمعطيات الشكل، أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.




ب




أ




د




ج




هـ




مـ




وـ



زـ



طـ




٧ في الشكل المقابل:  $\angle BAG = 33^\circ$ ،  $\angle BCG = 70^\circ$ ،  
 $\angle ABC = 94^\circ$ ،  $\angle JCH = 100^\circ$ . أوجد قياس كل من:


أ س ص

ب ا س

ج  $\angle BHD$



٨ **الربط مع الصناعة:** منشار دائري لقطع الخشب طول نصف قطر دائرته ١٠ سم. يدور داخل حافظة حماية، فإذا كان  $\angle BAE = 45^\circ$ ،  $\angle BDC = 155^\circ$ . أوجد طول قوس قرص المنشار خارج حافظة الحماية.



٩ **اتصالات:** ت sigue الإشارات التي تصدر عن برج الاتصالات في مسارها شعاعاً، نقطة بدايته على قمة البرج، ويكون مماساً لسطح الأرض، كما في الشكل المقابل. حدد قياس القوس المحصور بالمماسين بفرض أن البرج يقع على مستوى سطح البحر،  $\angle CAB = 80^\circ$ .


### معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتي:



## ملخص الوحدة

**نظريّة ١:** إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع متناسبة.



**نتيجة:** إذا رسم مستقيم خارج مثلث  $\triangle ABC$  يوازي ضلعًا من أضلاع المثلث ولتكن  $\overline{BC}$  ويفقع  $\overline{AB}$  ،  $\overline{AC}$  في  $\ell$ ،  $\ell$  على الترتيب (كما في الشكل)


$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

فإن:  $\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{EC}$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{EC}$$

**عكس نظريّة ١:** إذا قطع مستقيم ضلعين من أضلاع مثلث، وقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة فإنه يوازي الضلع الثالث.


**نظريّة تاليس العامة** Talis Theorem: إذا قطع مستقيمان عدّة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر.



**حالات خاصة**

١- إذا تقاطع المستقيمان  $m, m'$  في النقطة  $A$  وكان:  $\overline{BC} \parallel \overline{GJ}$ ، فإن:  $\frac{AB}{AG} = \frac{BC}{GJ}$


وبالعكس: إذا كان:  $\frac{AB}{AG} = \frac{BC}{GJ}$  فإن:  $\overline{BC} \parallel \overline{GJ}$



٢- إذا كان  $\overline{L_1} \parallel \overline{L_2} \parallel \overline{L_3} \parallel \overline{L_4}$ ،  
وقطعها المستقيمان  $m, m'$  وكان:  $AB = BC = GD$   
فإن:  $\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{CD} = \frac{GD}{DC}$

**نظريّة ٣ منصف زاوية مثلث** Triangle- Angle - Bisector: إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو الزاوية الخارجى للمثلث عند هذا الرأس، قسم المنصف قاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولى الضلعين الآخرين

**ملاحظة هامة:** في الشكل المقابل



١-  $\overline{BC}$  تنقسم من الداخل في  $D$  ومن الخارج في  $H$  بنسبة واحدة  
فيكون  $\frac{BD}{DC} = \frac{BH}{CH}$


٢- المنصف الداخلي والمنصف الخارجى لزاوية فى مثلث متعامدان؛ أي أن:  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

٣- إذا كان  $AB < AC$ ، قطع منصف  $\angle A$  الضلع  $\overline{BC}$  في  $D$ ، حيث  $B < D < C$ ، أما منصف الزاوية الخارجى عند  $A$  فيقطع  $\overline{BC}$  في  $H$ ، حيث  $B < H < C$ .

$$AD = \sqrt{AB \times AC - BC^2}$$

$$AH = \sqrt{AB \times AC - BC^2}$$

## ملخص الوحدة



حالات خاصة عكس نظرية (٣)

١- في  $\triangle ABC$ :

إذا كان  $\omega \in \overline{BC}$  حيث  $\omega_j = \frac{1}{2} \angle A$   
فإن:  $\omega$  ينصف  $\angle BAC$

وإذا كان  $\omega \in \overline{BC}$ ,  $\omega \not\parallel \overline{BC}$ , حيث  $\omega_j = \frac{1}{2} \angle A$   
فإن:  $\omega$  ينصف  $\angle BAC$  المثلث  $ABC$  الم الخارج عن المثلث  $ABC$

٢- حقيقة: من صفات زوايا المثلث تتقاطع في نقطة واحدة.

أولاً: قوة نقطة بالنسبة لدائرة Power of a point

قوة النقطة  $A$  بالنسبة للدائرة  $M$  التي طول نصف قطرها  $r$  هو العدد الحقيقي  $\omega_M$  حيث:

$$\omega_M = (AM)^2 - r^2$$

فإذا كان  $\omega_M < 0$

تقع خارج الدائرة  $M$

$$\omega_M = 0$$

تقع على الدائرة  $M$

$$\omega_M = 0$$

تقع داخل الدائرة  $M$



$$\omega_M > 0$$

ثانياً: القاطع والمماس وقياسات الزاوية.

١- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطعين داخل دائرة:


ب خارج الدائرة:

أ داخل الدائرة




$$\omega(\angle AHD) = \frac{1}{2} [\omega(\widehat{AJ}) - \omega(\widehat{B})]$$

$$\omega(\angle AHD) = \frac{1}{2} [\omega(\widehat{AJ}) + \omega(\widehat{B})]$$



٢- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطع ومماس للدائرة

$$\omega(\angle A) = \frac{1}{2} [\omega(\widehat{B}) - \omega(\widehat{CJ})]$$



٣- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع مماسين لدائرة.

$$\omega(\angle A) = \frac{1}{2} [\omega(\widehat{BSC}) - \omega(\widehat{BJ})]$$

## الوحدة

# حساب المثلثات

## Trigonometry

### أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يتعرف الزاوية الموجة.
- يتعرف الوضع القياسي للزاوية الموجة.
- يتعرف القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجة.
- يتعلم الحل العام للمعادلات المثلثية على الصورة:

  - جا اس = جتاب س
  - ظا اس = ظتاب س
  - قا اس = قتاب س

- يوجد قياس زاوية معلوم إحدى قيم النسب المثلثية لها.
- يتعلم التمثيل البياني لدوال الجيب وجيب التمام ويستنتج خواص كل منها.
- يستخدم الآلة الحاسبة العلمية في حساب النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.
- يندمج بعض الظواهر الفيزيائية والحياتية والتي تمثلها دوال مثلثية.
- يستخدم تكنولوجيا المعلومات في التعرف على التطبيقات المتعددة للمفاهيم الأساسية لحساب المثلثات.

### المصطلحات الأساسية

Secant	قاطع	$\cong$	دالة مثلثية	$\cong$	قياس موجب	$\cong$	قياس ستيني
Cotangent	ظل تمام	$\cong$	Trigonometric Function	$\cong$	Positive Measure	$\cong$	قياس دائري
Circular Function	دالة دائيرية	$\cong$	Sine	$\cong$	قياس سالب	$\cong$	زاوية موجة
Related Angles	الزوايا المتناسبة	$\cong$	Cosine	$\cong$	Negative Measure	$\cong$	زاوية نصف قطرية (راديان)
		$\cong$	Tangent	$\cong$	Equivalent Angle	$\cong$	Radian
		$\cong$	Cosecant	$\cong$	Quadrant Angle	$\cong$	وضع قياسي
					Zاوية رباعية	$\cong$	Standard Position

## دروس الوحدة

الدرس (٤ - ١): الزاوية الموجهة.

الدرس (٤ - ٢): القياس الستيني والقياس الدائري لزاوية.

الدرس (٤ - ٣): الدوال المثلثية.

الدرس (٤ - ٤): الزوايا المتنسبية.

الدرس (٤ - ٥): التمثيل البياني للدوال المثلثية.


الدرس (٤ - ٦): إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية.

## الأدوات المستخدمة

آلة حاسبة علمية - ورق مربعات - حاسب آلي -

برامج رسم بياني.

## مخطط تنظيمي للوحدة



## لذاته تاريخية

حساب المثلثات هو أحد فروع علم الرياضيات، فهو يختص بالحسابات الخاصة بين قياسات زوايا المثلث وأطوال أضلاعه. وقد نشأ هذا العلم ضمن الرياضيات القديمة خصوصا فيما يتعلق بحسابات علم الفلك التي اهتم بها الإنسان القديم لما يتأمله ويشاهده في الكون من حركة الشمس والقمر والنجوم والكواكب.

ويعتبر الرياضي العربي نصير الدين الطوسي هو أول من فصل حساب المثلثات عن الفلك.

وكان لحساب المثلثات نصيبه من اهتمامات العرب، ويذكر أن اصطلاح (الظل) قد وصفه العالم العربي أبو الوفا البوزجاني (٩٤٠ - ٩٩٨ م) في القرن العاشر الميلادي، وهذا الاصطلاح مأخوذ من ظلال الأجسام التي تكون نتيجة سير الضوء المنبعث من الشمس في خطوط مستقيمة.


كما أن للعرب إضافات عديدة في حساب المثلثات المستوى والكروي (نسبة إلى سطح الكرة) وعنهما أخذ الغربيون المعلومات المهمة، وأضافوا إليها أيضاً الكثير. حتى أصبح حساب المثلثات تتضمناً العديد من الأبحاث الرياضية، وأصبحت تطبيقاته في شتى المعارف العلمية والعملية، وساهم في دفع عجلة التقدم والازدهار.



## ٤ - ١

### سوف تتعلم

- مفهوم الزاوية الموجة.
- الوضع القياسي للزاوية الموجة.
- القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجة.
- موقع الزاوية الموجة في المستوى الإحداثي المتعامد.
- مفهوم الزوايا المكافئة.



سبق لك أن تعرفت على أن الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نقطة بداية واحدة. في الشكل المرسوم تسمى النقطة بـ «رأس الزاوية». والشعاعان  $\overrightarrow{ب}$ ،  $\overrightarrow{ج}$  **ضلعان الزاوية**. أي أن:  $\angle \overrightarrow{ب} \overrightarrow{أ} \overrightarrow{ج} = (\angle A B J)$  وتنكتب كذلك  $\widehat{A B J}$ .

### Degree Measure System

علمت أن القياس стениي يعتمد على تقسيم الدائرة إلى  $360^\circ$  قوساً متساوياً في الطول. وبالتالي فإن:

- ١- الزاوية المركزية التي ضلعاها يمران بنهائي أحدهذه الأقواس يكون قياسها درجة واحدة ( $1^\circ$ )
  - ٢- تنقسم الدرجة إلى  $60$  جزءاً، كل منها يسمى دقيقة، وترمز له بالرمز ( $'$ )
  - ٣- تنقسم الدقيقة إلى  $60$  جزءاً، كل منها يسمى ثانية، وترمز له بالرمز ( $''$ )
- أي أن:  $1^\circ = 60'$  ،  $1' = 60''$


### القياس الستيني للزاوية

### المصطلحات الأساسية

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| Degree Measure    | قياس ستيني   |
| Directed angle    | زاوية موجة   |
| Standard Position | وضع قياسي    |
| Positive measure  | قياس موجب    |
| Negative measure  | قياس سالب    |
| Equivalent Angle  | زاوية مكافئة |
| Quadrantal Angle  | زاوية رباعية |

### Directed Angle

### الزاوية الموجة



إذا رأينا ترتيب الشعاعين المكونين للزاوية فإنه يمكن كتابتها على شكل الزوج المترتب ( $\overrightarrow{أ} \overrightarrow{ج}$ ،  $\overrightarrow{ج} \overrightarrow{أ}$ ) حيث العنصر الأول  $\overrightarrow{أ}$  هو الضلع الابتدائي للزاوية، العنصر الثاني  $\overrightarrow{ج}$  هو الضلع النهائي للزاوية التي رأسها نقطة و كما بالشكل (١).



أما إذا كان الضلع الابتدائي  $\overrightarrow{ج}$ ، الضلع النهائي  $\overrightarrow{أ}$  فتنكتب ع逆 (ج، أ) كما في شكل (٢).

### الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية.

تعريف

الزاوية الموجة هي زوج مرتب من شعاعين هما ضلعاً الزاوية، لهما نقطة بداية واحدة هي رأس الزاوية.


تفكير ناقد:

﴿ هل  $(\omega^+, \theta^+)$  =  $(\omega^-, \theta^-)$ ? فسر إجابتك. ﴾

**Standard position of the directed angle**


تكون الزاوية في وضع قياسي إذا كان رأس هذه الزاوية هو نقطة الأصل في نظام إحداثي متعامد، وضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات.

هل  $\Delta$  أو  $\beta$  الموجهة في الوضع القياسي؟ فسر إجابتك.



**الوضع القياسي للزاوية الموجة**

أيٌّ من الأزواج المرتبة التالية يعبر عن زاوية موجة في وضعها القياسي؟ فسر إجابتك.



**تعبير شفهي**





أ)  $(\omega^+, \theta^+)$       ب)  $(\omega^-, \theta^-)$

ج)  $(\omega^-, \theta^+)$       د)  $(\omega^+, \theta^-)$

هـ)  $(\omega^+, \theta^+, \theta^-)$

**حاول أن تحل**

أ) أي الزوايا الموجة التالية في وضعها القياسي؟ فسر إجابتك.




## القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة:


### Positive and negative measures of a directed angle

في شكل (١) يكون قياس الزاوية الموجة موجباً إذا كان الاتجاه من الصلع الابتدائي  $\overrightarrow{OA}$  إلى الصلع النهائي  $\overrightarrow{OB}$  ، في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

في شكل (٢) يكون قياس الزاوية الموجة سالباً إذا كان الاتجاه من الصلع الابتدائي  $\overrightarrow{OA}$  إلى الصلع النهائي  $\overrightarrow{OB}$  ، هو نفس اتجاه حركة عقارب الساعة.




شكل (٢)



شكل (١)

مثال

١ أوجد قياس الزاوية الموجة  $\theta$  المشار إليها في كل شكل من الأشكال الآتية:



الحل


نعلم أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوى  $360^\circ$

$$327^\circ = 33^\circ - 360^\circ = \theta \quad 1 \quad 30.5^\circ = 360^\circ - 55^\circ = \theta \quad 2$$


$$226^\circ = (124^\circ - 56^\circ) - 360^\circ = \theta \quad 3 \quad 235^\circ = 125^\circ - 360^\circ = \theta \quad 4$$

حاول أن تحل

٢ أوجد قياس الزاوية الموجة (و) المشار إليها في كل شكل من الأشكال الآتية:




### موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد:



يقسم المستوى الإحداثي المتعامد إلى أربعة أرباع كما في الشكل المقابل.

﴿ إذا كانت  $\angle AOB$  الموجة في الوضع القياسي والتي قياسها الموجب هو  $(\theta)$  فإن صلتها النهائية  $\overrightarrow{OB}$  يمكن أن يقع في أحد الأرباع: ﴾



﴿ إذا وقع الصلع النهائي  $\overrightarrow{OB}$  على أحد محورى الإحداثيات تسمى الزاوية فى هذه الحالة **بالزاوية الرباعية** (Quadrantal angle)، فتكون الزوايا التي قياساتها  ${}^{\circ}0, {}^{\circ}90, {}^{\circ}180, {}^{\circ}270, {}^{\circ}360$  هي زوايا رباعية. ﴾

### مثال

٢ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي :

- أ  ${}^{\circ}48$       ب  ${}^{\circ}217$       ج  ${}^{\circ}135$       د  ${}^{\circ}295$       ه  ${}^{\circ}270$

### الحل

- فهي تقع في الربع الأول.
- فهي تقع في الربع الثالث.
- فهي تقع في الربع الثاني.
- فهي تقع في الربع الرابع.

- أ  ${}^{\circ}48 > {}^{\circ}90$
- ب  ${}^{\circ}217 > {}^{\circ}180$
- ج  ${}^{\circ}135 > {}^{\circ}90$
- د  ${}^{\circ}295 > {}^{\circ}270$
- ه  ${}^{\circ}270$  زاوية رباعية.

### حاول أن تحل


٣ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي :

- أ  ${}^{\circ}88$       ب  ${}^{\circ}152$       ج  ${}^{\circ}300$       د  ${}^{\circ}196$       ه  ${}^{\circ}180$

### ملاحظة:

﴿ إذا كان  $(\theta)$  هو القياس الموجب لزاوية موجبة فإن القياس السالب لها يساوي  $({}^{\circ}360 - \theta)$  ﴾

﴿ وإذا كان  $(-\theta)$  هو القياس السالب لزاوية موجبة فإن القياس الموجب لها يساوي  $({}^{\circ}360 + \theta)$  ﴾



### مثال

٣ عين القياس السالب لزاوية قياسها  $275^\circ$ .

### الحل

القياس السالب للزاوية  $(275^\circ) = 360^\circ - 275^\circ = 85^\circ$

التحقيق:  $|85^\circ| + |275^\circ| = 360^\circ$

### حاول أن تحل

٤ عين القياس السالب للزوايا التي قياساتها كالتالي:

٥  $315^\circ$

٦  $210^\circ$

٧  $270^\circ$

٨  $32^\circ$

### مثال

٤ عين القياس الموجب لزاوية  $-225^\circ$ .

### الحل

القياس الموجب للزاوية  $(-225^\circ) = 360^\circ - 225^\circ = 125^\circ$

التحقيق:  $|125^\circ| + |-225^\circ| = 360^\circ$

### حاول أن تحل

٥ عين القياس الموجب لكل زاوية من الزوايا الآتية:

٩  $320^\circ$

١٠  $90^\circ$

١١  $126^\circ$

١٢  $52^\circ$

٦ الرابط بالألعاب الرياضية: يدور أحد لاعبي القرص بزاوية قياسها  $150^\circ$ . ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسي.


### Equivalent angles

### الزوايا المكافئة


تأمل الأشكال الآتية وحدد الزاوية الموجبة ( $\theta$ ) في الوضع القياسي لكلاً شكل. ماذًا تلاحظ؟




شكل (٤)



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)

في الأشكال (٢)، (٣)، (٤) نلاحظ أن الزاوية ( $\theta$ ) والزاوية المرسومة معها لهما نفس الضلع النهائي  $\omega$ .

شكل (٢): الزاوية التي قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي.

شكل (١): الزاوية التي قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي.

شكل (٣): الزاويتان  $\theta$ ،  $\theta + 360^\circ$  متكافئتان.

شكل (٤): الزاويتان  $\theta$ ،  $360^\circ - \theta$  متكافئتان.

مما سبق نستنتج أن:

عند رسم زاوية موجبة قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي فإن جميع الزوايا التي قياساتها:  
 $1 \pm \theta$  أو  $2 \pm \theta$  أو  $3 \pm \theta$  أو ..... أو  $n \pm \theta$  حيث  $n \in \mathbb{N}$   
يكون لها نفس الصلع النهائي، وتسمى **زوايا مكافئة**.

### مثال

- ٥ أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في الصلع النهائي لكل من الزاويتين الآتتين:

أ ١٢٠° ب ٢٣٠°

### الحل

أ زاوية بقياس موجب:  $(+360^\circ + 120^\circ = 480^\circ)$

زاوية بقياس سالب:  $(-360^\circ - 120^\circ = -240^\circ)$

ب زاوية بقياس موجب:  $(+360^\circ - 230^\circ = 130^\circ)$

زاوية بقياس سالب:  $(-360^\circ - (-230^\circ) = -590^\circ)$

**فكّر:** هل توجد زوايا أخرى بقياس موجب، وأخرى بقياس سالب؟ اذكر بعض هذه الزوايا إن وجدت.

### حاول أن تحل

- ٦ أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في الصلع النهائي لكل من الزوايا الآتية:

أ ٤٠° ب ١٥٠° ج ١٢٥° ه ١٨٠°

- ٧ **اكتشف الخطأ:** جميع قياسات الزوايا التالية مكافئة للزاوية  $75^\circ$  في الوضع القياسي ما عدا الإجابة:

أ ٤٣° ب ٦٤٥° ج ٢٨٥° ه ٤٣٥°

### تحقق من فهمك

- ١ عين الربع الذي تقع فيه كل زاوية من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

أ ٥٦° ب ٣٢٥° ج ٥٧٠° ه ٣٩٠°

- ٢ عين أحد القياسات السالبة لكل زاوية من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

أ ٤٣° ب ١٢٤° ج ٩٠° ه ٣١٢°

- ٣ عين أصغر قياس موجب لكل زاوية من الزوايا الآتية:


أ ٥٦° ب ٢١٥° ج ٤٩٥° ه ٩٣٠°

## تمارين ٤ - ا


١ أكمل:

- أ** تكون الزاوية الموجة في وضع قياسي إذا كان .....  
..... يقال للزاوية الموجة في الوضع القياسي أنها متكافئة إذا كان .....  
..... تكون سالبة إذا كان دوران الزاوية .....  
..... إذا وقع الضلع النهائي للزاوية الموجة على أحد محاور الإحداثيات تسمى .....  
..... إذا كان  $\theta$  قياس زاوية موجة في الوضع القياسي، فإن  $n \times 360^\circ + \theta$  تسمى بالزوايا .....  
**هـ** أصغر قياس موجب للزاوية التي قياسها  $530^\circ$  هو .....  
**زـ** الزاوية التي قياسها  $930^\circ$  تقع في الربع .....  
**حـ** أصغر قياس موجب للزاوية التي قياسها  $-690^\circ$  هو .....

٢ أي من الزوايا الموجة الآتية في الوضع القياسي



٣ أوجد قياس الزاوية الموجة  $\theta$  المشار إليها في كل شكل من الأشكال التالية:



٤ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

- هـ**  $640^\circ$
- دـ**  $220^\circ$
- زـ**  $40^\circ$
- بـ**  $215^\circ$
- أـ**  $24^\circ$

٥ ضع كلاً من الزوايا الآتية في الوضع القياسي، موضحاً ذلك بالرسم:

٣١٥ - هـ

١١٠ - دـ

٨٠ - جـ

١٤٠ - بـ

٣٢ - أـ

٦ عين أحد القياسات السالبة لكل زاوية من الزوايا الآتية:

٩٠ - جـ

١٣٦ - بـ

٨٣ - أـ

١٠٧٠ - وـ

٩٦٤ - هـ

٢٦٤ - دـ


٧ عين أصغر قياس موجب لكل زاوية من الزوايا الآتية:

٥٧٠ - دـ

٣١٥ - جـ

٢١٧ - بـ

١٨٣ - أـ



٨ في الشكل المقابل: أيّاً من الأزواج المرتبة الآتية تعبّر عن زاوية موجّهة في وضعها القياسي؟ لماذا؟

أـ (أـ، وـ)      بـ (وـ، جـ)

جـ (أـ، بـ)      دـ (وـ، وـ)

هـ (وـ، وـ)      وـ (وـ، وـ)

٩ يدور أحد لاعبي الجمباز على جهاز الألعاب بزاوية قياسها  $200^\circ$ . ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسي.

١٠ اكتشف الخطأ: اكتب قياس أصغر زاوية بقياس موجب وزاوية أخرى بقياس سالب تشتّركان مع الصلم النهائي للزاوية  $(-135^\circ)$ .

إجابة زياد

أصغر زاوية بقياس موجب =  $135^\circ - 225^\circ = 360^\circ + 135^\circ = 45^\circ$

أصغر زاوية بقياس سالب =  $135^\circ - 360^\circ = -495^\circ$

إجابة كريم

أصغر زاوية بقياس موجب =  $135^\circ - 180^\circ + 180^\circ = 45^\circ$

أصغر زاوية بقياس سالب =  $135^\circ - 180^\circ = -45^\circ$


أي الإجابتين صحيح؟ فسر إجابتك.

## القياس الستيني والقياس الدائري لزاوية

## Degree Measure and Radian Measure of an Angle

سبق أن علمت أن القياس الستيني ينقسم إلى درجات و دقائق و ثوان، وأن الدرجة الواحدة = ٦٠ دقيقة، وأن الدقيقة الواحدة = ٦٠ ثانية.  
هل توجّد قياسات أخرى للزاوية؟

## Radian Measure



القياس الدائري



- مفهوم القياس الدائري للزاوية.
  - العلاقة بين القياس الثنائي والقياس الدائري.
  - كيفية إيجاد طول قوس في دائرة.

القياس الدائري




- ١ ارسم مجموعة من الدوائر المتحدة المركز كما في الشكل المقابل.

-٢ أوجد النسبة بين طول قوس أي زاوية مركزية وطول نصف قطر دائيرتها المناظرة - ماذا تلاحظ

**نلاحظ أن** النسبة بين طول قوس أي زاوية مركزية والمناظرة تساوي مقداراً ثابتاً.

أي أن:  $\frac{\text{طول } \overrightarrow{AB}}{\text{م } A} = \frac{\text{طول } \overrightarrow{AB}}{\text{م } B}$  = مقدار ثابت.

ويمثل لها بالرمز  $(\theta)$ ، وهذا المقدار ثابت هو القياس الدائري للزاوية.



إذا كان  $\theta$  هو قياس الزاوية المركزية  
لدائرة طول نصف قطرها مع تقابل قوساً  
من الدائرة طوله ل فإن:

من التعريف نستنتج أن:  $L = \theta \times \omega$  ،  $\omega = \frac{L}{\theta}$

سوف تتعلم

تتعلم توف

- مفهوم القياس الدائري للزاوية.
  - العلاقة بين القياس الثنائي والقياس الدائري.
  - كيفية إيجاد طول قوس في دائرة.

## المصطلحات الأساسية


- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| Degree Measure | قياس سنتيمي     |
| Radian Measure | قياس دائري      |
| Radian Angle   | زاوية نصف قطرية |

## الأدوات والوسائل



- آلية حاسبة علمية \*

ووحدة قياس الزاوية في القياس الدائري هي الزاوية النصف قطرية، ويرمز لها بالرمز ( $^{\circ}$ ) ويقرأ واحد دائري (راديان).



### الزاوية النصف قطرية Radian angle

هي الزاوية المركزية في الدائرة التي تحصر قوساً طوله يساوي طول نصف قطر هذه الدائرة.

تعريف

**تفكير ناقد:** هل القياس الدائري لزاوية مركزية يتناسب مع طول القوس المقابل لها؟ فسر إجابتك.

### مثال




١١ دائرة طول نصف قطرها ٨ سم. أوجد لأقرب رقمين عشرتين طول القوس إذا كان قياس الزاوية المركزية التي تقابلها يساوي  $\frac{\pi}{12}$

### الحل

$$\text{نستخدم صيغة طول القوس: } L = \theta \times r \text{ مع} \\ \text{بالتعويض عن } r = 8 \text{ سم، } \theta = \frac{\pi}{12} \text{ فيكون: } L = 8 \times \frac{\pi}{12} \approx 47.10 \text{ سم}$$

### حاول أن تحل

١ أوجد طول القوس الذي يحصز الزاوية المعلومة في كل من الدوائر الآتية مقرباً الناتج لأقرب جزء من عشرة.



### العلاقة بين القياس الستيني والقياس الدائري لزاوية:

Relation between degree measure and radian measure of an angle

تعلم أن: قياس الزاوية المركزية لدائرة يساوى قياس قوسها.

أى أن: الزاوية المركزية التي قياسها الستيني  $360^{\circ}$  يكون طول قوسها  $2\pi$  سم

وفي دائرة الوحدة

فإن:  $\pi$  (راديان) بالتقدير الدائري يكافئ  $360^{\circ}$  بالتقدير الستيني.

$$\text{أى أن: } \pi \text{ (راديان) يكافئ } 180^{\circ} \quad 1^{\circ} \text{ (راديان)} = \frac{180}{\pi} \approx 57.17^{\circ}$$

إذا كان لدينا زاوية قياسها الدائري  $\theta$  وقياسها الستيني سْ فإن:


$$\frac{\theta}{\pi} = \frac{s}{180}$$

أيقونات  
معلوماتك

توجد وحدة أخرى لقياس الزاوية وهي الجراد (Grad) وتساوي  $\frac{1}{200}$  من قياس الزاوية المستقيمة.

إذا كانت س،  $\theta$ ، ص هي قياسات ثلاثة زوايا على التوالي بوحدات الدرجة، والراديان، والجراد فلن:

$$\text{ص} = \frac{\theta}{\pi} = \frac{\theta}{200}$$



مثال

١٢ حول  $30^\circ$  إلى قياس دائري بدلاً من  $\pi$ .

الحل

$$\frac{\theta}{\pi} = \frac{30^\circ}{180^\circ}$$

$$\frac{\pi}{\pi} = \frac{\pi \times 30^\circ}{180^\circ} = \theta$$

للتتحويل إلى رadians نستخدم الصورة

حاول أن تحل

١٣ الشكل المقابل يمثل قياسات بعض الزوايا الخاصة أحدها كُتب بالراديان (خارج الدائرة) والآخر كتب بالدرجات (داخل الدائرة). اكتب قياسات زوايا الشكل المقابلة أمام كل قياس زاوية مناظرة لها.

مثال

١٤ حول قياس الزاوية  $1,2^\circ$  إلى قياس ستيني.

الحل

$$س = \frac{180 \times 1,2^\circ}{\pi}$$

$$س = 68,75493542^\circ = 68^\circ 45' 42''$$

وتحتاج الآلة الحاسبة على النحو التالي:

ابداً

1 . 2 × 1 8 0 ÷ π = °,,,

MATH  
68° 45' 42.77"

حاول أن تحل

١٥ حول قياسات الزوايا التالية إلى قياس ستيني مقرّباً الناتج لأقرب ثانية:

١٦,٠٥

٢٠,٥


٦,٦

٧,٠



مثال

١٦ **الربط بالفضاء:** قمر صناعي يدور حول الأرض في مسار دائري دورة كاملة كل ٣ ساعات، إذا كان طول نصف قطر الأرض يبلغ تقريرياً ٦٤٠٠ كم وبعد القمر عن سطح الأرض ٣٦٠٠ كم، فأوجد المسافة التي يقطعها القمر خلال ساعة واحدة مقرّباً الناتج لأقرب كيلومتر.



### الحل

يبين الشكل المقابل المسار الدائري لحركة القمر:

$$\therefore \text{طول نصف قطر دائرة مسار القمر } m = m \text{ جم} + \text{جا}$$

$$\therefore m = 3600 + 6400 = 10000 \text{ كم}$$

$\therefore$  القمر يقطع المسار الدائري (دورة كاملة) في ٣ ساعات، وهذا يقابل زاوية مركبة  $= \frac{\pi}{2}$


$\therefore$  القمر يقطع قوساً طوله  $\frac{1}{3}$  محيط الدائرة في الساعة الواحدة، وهذا يقابل زاوية مركبة  $= \frac{\pi}{3}$

$$l = \theta \times r$$

$$l = 10000 \times \frac{\pi}{3} = 10000 \text{ كم، } \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$l \approx 20944 \text{ كم}$$

- ١٥ **ألعاب رياضية:** يدور أحد لاعبي الجمباز على جهاز الألعاب بزاوية قياسها  $200^\circ$ . ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسي وأوجد قياسها بالتقدير الدائري.



### الحل

ارسم محورين لإنشاء مستوى إحداثي متعامد ومتقاطعين في النقطة O.

بفرض أن اللاعب يدور بزاوية موجهة أو ب حيث:

$$\angle (أو ب) = (\vec{OA}, \vec{OB}) \text{ فيكون } \angle (أو ب) = 200^\circ. \\ 180^\circ < 200^\circ < 270^\circ.$$

$\therefore$  الضلع النهائي للزاوية يقع في الربع الثالث.

$$200^\circ \approx \frac{\pi \times 200}{180} = 3,49$$

### حاول أن تدل

- ٤ **الربط بالألعاب الرياضية:** لاعب اسكواش تحرك في مسار على شكل قوس طول نصف قطر دائريته ٤١,٤ متر وزاوية دوران اللاعب  $80^\circ$  أوجد لأقرب جزء من عشرة طول هذا القوس.

### تحقق من فهمك

- ١ **الصناعة:** يدور قرص آلة بزاوية قياسها  $-315^\circ$  ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسي.

## تمارين ٤ - ٢

**أولاً: اختيار من متعدد:**

١) الزاوية التي قياسها  $60^\circ$  في الوضع القياسي تكافئ الزاوية التي قياسها:

- ٥)  $420^\circ$       ٦)  $300^\circ$       ٧)  $240^\circ$       ٨)  $120^\circ$

٩) الزاوية التي قياسها  $\frac{\pi}{3}$  تقع في الربع:

- ٩) الأول      ٦) الثاني      ٧) الثالث      ٨) الرابع

١٠) الزاوية التي قياسها  $\frac{\pi}{4}$  تقع في الربع:

- ٩) الأول      ٦) الثاني      ٧) الثالث      ٨) الرابع

١١) إذا كان مجموع قياسات زوايا أي مضلع منتظم تساوى  $180^\circ(n-2)$  حيث  $n$  عدد الأضلاع، فإن قياس زاوية المخمس المنتظم بالقياس الدائري تساوى:

- ٩)  $\frac{\pi}{3}$       ٦)  $\frac{\pi}{5}$       ٧)  $\frac{\pi}{7}$       ٨)  $\frac{\pi}{2}$

١٢) الزاوية التي قياسها  $\frac{\pi}{3}$  قياسها الستيني يساوى:

- ٩)  $105^\circ$       ٦)  $210^\circ$       ٧)  $420^\circ$       ٨)  $840^\circ$

١٣) إذا كان القياس الستيني لزاوية هو  $48^\circ$  فإن قياسها الدائري يساوى:

- ٩)  $18^\circ, 36^\circ$       ٦)  $36^\circ, 18^\circ$       ٧)  $18^\circ, 54^\circ$       ٨)  $36^\circ, 54^\circ$

١٤) طول القوس في دائرة طول قطرها ٢٤ سم و يقابل زاوية مرکزية قياسها  $30^\circ$  يساوى:

- ٩)  $\frac{1}{2}\pi$  سم      ٦)  $\frac{3}{4}\pi$  سم      ٧)  $\frac{1}{4}\pi$  سم      ٨)  $\frac{5}{12}\pi$  سم

١٥) القوس الذي طوله  $5\pi$  سم في دائرة طول نصف قطرها ١٥ سم يقابل زاوية مرکزية قياسها يساوى:

- ٩)  $30^\circ$       ٦)  $60^\circ$       ٧)  $90^\circ$       ٨)  $180^\circ$

١٦) إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث  $75^\circ$  وقياس زاوية أخرى فيه  $\frac{\pi}{4}$  فإن القياس الدائري للزاوية الثالثة يساوى:

- ٩)  $\frac{1}{4}\pi$       ٦)  $\frac{\pi}{3}$       ٧)  $\frac{5}{12}\pi$       ٨)  $\frac{1}{2}\pi$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

١٠ أوجد بدلالة  $\pi$  القياس الدائري للزوايا التي قياساتها كالتالي:

$$\text{أ} \quad 225^\circ \quad \text{ب} \quad 240^\circ \quad \text{ج} \quad 135^\circ$$

$$\text{د} \quad 300^\circ \quad \text{هـ} \quad 390^\circ$$

$$\text{وـ} \quad 780^\circ$$

١١ أوجد القياس الدائري للزوايا التي قياساتها كالتالي، مقرباً الناتج لثلاثة أرقام عشرية:

$$\text{أ} \quad 56.6^\circ \quad \text{ب} \quad 18^\circ 25 \quad \text{ج} \quad 48^\circ 50 \quad \text{هـ} \quad 160^\circ$$

١٢ أوجد القياس الستيني للزوايا التي قياساتها كالتالي، مقرباً الناتج لأقرب ثانية:

$$\text{أ} \quad 40,49^\circ \quad \text{ب} \quad 2,27^\circ \quad \text{ج} \quad 3\frac{1}{2}^\circ$$

١٣ إذا كان  $\theta$  قياس زاوية مركزية في دائرة طول نصف قطرها  $m$  وتحصّر قوساً طوله  $L$ :

(الأقرب جزء من عشرة)  $\text{أ} \quad \text{إذا كان } m = 20 \text{ سم، } \theta = 20^\circ 78^\circ \text{ أوجد } L.$

(الأقرب جزء من عشرة)  $\text{ب} \quad \text{إذا كان } L = 27.3 \text{ سم، } \theta = 24^\circ 78^\circ \text{ أوجد } m.$


١٤ زاوية مركزية قياسها  $150^\circ$  وتحصّر قوساً طوله  $11$  سم، احسب طول نصف قطر دائرتها (الأقرب جزء من عشرة)

١٥ أوجد القياس الدائري والقياس الستيني للزاوية المركزية التي تقابل قوساً طوله  $8.7$  سم في دائرة طول نصف قطرها  $4$  سم.

١٦ **الربط بالهندسة:** مثلث قياس إحدى زواياه  $60^\circ$  وقياس زاوية أخرى منه يساوي  $\frac{\pi}{4}$  أوجد القياس الدائري والقياس الستيني لزاویته الثالثة.

١٧ **الربط بالهندسة:** دائرة طول نصف قطرها  $4$  سم، رسمت  $\triangle ABC$  المحاطة التي قياسها  $30^\circ$  أوجد طول القوس الأصغر  $\widehat{AC}$


١٨ **الربط بالهندسة:** في الشكل المقابل إذا كان مساحة المثلث  $MAB$  القائم الزاوي في  $M = 32 \text{ سم}^2$  فأوجد محيط الشكل المظلل مقرباً الناتج لأقرب رقمين عشرين



**الربط بالهندسة:**  $\overline{AB}$  قطر في دائرة طوله ٢٤ سم ، رسم الوتر  $\overline{AC}$  بحيث كان  $\angle C = 50^\circ$ .  
أوجد طول القوس الأصغر  $\widehat{AC}$  مقرباً الناتج لأقرب رقمين عشرة.

**مسافات:** كم المسافة التي تقطعها نقطة على طرف عقرب الدقائق خلال ١٠ دقائق إذا كان طول هذا العقرب ٦ سم؟

**فلك:** قمر صناعي يدور حول الأرض في مسار دائري دورة كاملة كل ٦ ساعات، فإذا كان طول نصف قطر مساره عن مركز الأرض ٩٠٠٠ كم، فأوجد سرعته بالكيلومتر في الساعة.



**الربط بالهندسة:** في الشكل المقابل:

$\overline{AB}$  ،  $\overline{AC}$  مماسان للدائرة ، و  $\angle CAB = 60^\circ$  ،  $AB = 12$  سم.  
أوجد لأقرب عدد صحيح طول القوس الأكبر  $\widehat{BC}$ .



**الربط بالزمن:** تستخدم المزولة الشمسية لتحديد الوقت أثناء النهار من خلال طول الظل الذي يسقط على سطح مدرج لإظهار الساعة وأجزائها، فإذا كان الظل يدور على القرص بمعدل  $15^\circ$  لكل ساعة.  
أوجد قياس الزاوية بالراديان التي يدور الظل عنها بعد مرور ٤ ساعات.

**ب** بعد كم ساعة يدور الظل بزاوية قياسها  $\frac{\pi}{3}$  رadian؟

**ج** مزولة طول نصف قطرها ٢٤ سم، أوجد بدالة  $\pi$  طول القوس الذي يصنعه دوران الظل على حافة القرص بعد مرور ١٠ ساعات.


**تفكير ناقد:** مستقيم يصنع زاوية قياسها  $\frac{\pi}{3}$  في الوضع القياسي لدائرة الوحدة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. أوجد معادلة هذا المستقيم.

الدول المثلثية

## Trigonometric Functions

سوف تتعلم

- ٤ دايرة الوحدة.
  - ٥ الدول المثلثة الأساسية.
  - ٦ مقلوبات الدول المثلثة الأساسية.
  - ٧ إشارات الدول المثلثة.
  - ٨ الدول المثلثة بعض الزوايا الخاصة.



فکر و نقش

سبق أن درست النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة.  
وفي  $\triangle ABC$  القائم الزاوية في ب نجد:

$$\text{جـ جـ} = \frac{\text{أـ بـ}}{\text{أـ جـ}} = \frac{\text{الـ وـتـر}}{\text{الـ مـقـابـل}}$$

$$\text{جتا ج} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{ب}{ج}$$


$$\text{ظا ج} = \frac{\frac{1}{ب}}{\frac{المجاور}{المقابل}} = \frac{أ ب}{ب ج}$$

هل تساوى هذه النسب؟ فسر إجابتك.

ماذا تستنتاج؟ ★

لمطالعات الأساسية

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Trigonometric Function | دالة مثلثية |
| Sine                   | جيب         |
| Cosine                 | جيب تمام    |
| Tangent                | ظل          |
| Cosecant               | قاطع تمام   |
| Secant                 | قاطع        |
| Cotangent              | ظل تمام     |



المثلثات بـ أـجـ ، هـوـجـ ، وـبـ جـ مـتـشـابـهـ (لـمـاـذاـ)؟

ومن التشابه يكون:  $\frac{أ}{ج} = \frac{ب}{ج} = \frac{ه}{ج}$  لماذا؟

**أي أن:** النسبة المثلثية للزاوية الحادة نسبة ثابتة لا تتغير إلا إذا تغيرت الزاوية نفسها.

-٢- بيّن الشكل المقابل ربع دائرة طول نصف قطرها بع سم

حيث:  $\varphi(\Delta \cup J)$

$$\frac{جـ}{سـ} = \theta$$


وعندما يزداد  $\alpha$  (د و ج) إلى

**فإن جا**

**أي أن** النسبة المثلثية لزاوية تتغير بتغيير قياس زاويتها، وهذا ما يعرف بالدوال المثلثية.


الادوات والوسائل

- آلية حاسبة علمية ▶



## دائرة الوحدة

### The unit circle



في أي نظام إحداثي متعامد تسمى دائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوى وحدة الأطوال بدائرة الوحدة.

★ دائرة الوحدة تقطع محور السينات في النقاطين  $(1, 0)$ ,  $(-1, 0)$ , وتقع محور الصادات في النقاطين  $(0, 1)$ ,  $(0, -1)$ .

★ إذا كان  $(s, c)$  هما إحداثياً أي نقطة على دائرة الوحدة فإن:

$$s^2 + c^2 = 1$$

حيث  $s^2 + c^2 = 1$  نظرية فيثاغورث


### The basic trigonometric functions of an angle

### الدوال المثلثية الأساسية لزاوية

لأى زاوية موجهة في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة  $b(s, c)$  وقياسها  $\theta$  يمكن تعريف الدوال الآتية:

١- جيب تمام الزاوية  $\theta$  = الإحداثي السيني للنقطة  $b$

$$\text{جتا } \theta = s$$



٢- جيب الزاوية  $\theta$  = الإحداثي الصادي للنقطة  $b$

$$\text{جا } \theta = c$$

٣- ظل الزاوية  $\theta$  =  $\frac{\text{الإحداثي الصادي للنقطة } b}{\text{الإحداثي السيني للنقطة } b}$

$$\text{ظا } \theta = \frac{c}{s} \quad \text{حيث } s \neq 0$$

**لحظ أن:** يكتب الزوج المترتب  $(s, c)$  لأى نقطة على دائرة الوحدة بالصورة  $(\text{جتا } \theta, \text{جا } \theta)$


إذا كانت النقطة  $g\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$  هي نقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية موجهه قياسها  $\theta$  مع دائرة الوحدة

$$\text{فإن: جتا } \theta = \frac{3}{5}, \quad \text{جا } \theta = \frac{4}{5}, \quad \text{ظا } \theta = \frac{4}{3}$$

### The reciprocals of the basic trigonometric functions

### مقلوبات الدوال الأساسية

لأى زاوية موجهة في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة  $b(s, c)$  وقياسها  $\theta$  توجد الدوال الآتية:




١- قاطع الزاوية  $\theta$ :  $\text{قا } \theta = \frac{1}{s} = \frac{1}{\text{جتا } \theta}$  حيث  $s \neq 0$


٢- قاطع تمام الزاوية  $\theta$ :  $\text{قتا } \theta = \frac{1}{c} = \frac{1}{\text{جا } \theta}$  حيث  $c \neq 0$

٣- ظل تمام الزاوية  $\theta$ :  $\text{ظتا } \theta = \frac{s}{c} = \frac{1}{\text{ظا } \theta}$  حيث  $c \neq 0$


### The signs of The Trigonometric Functions



### إشارات الدوال المثلثية



ويمكن تلخيص إشارات الدوال المثلثية جميعها في الجدول الآتي:



إشارات الدوال المثلثية			الفترة التي يقع فيها قياس الزاوية	الربع الذي يقع فيه الصلع النهائي للزاوية
جا، قتا	جتا، قا	ظا، ظنا		
+	+	+	$[\frac{\pi}{2}, \pi]$	الأول
-	-	+	$[\pi, \frac{3\pi}{2}]$	الثاني
+	-	-	$[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$	الثالث
-	+	-	$[2\pi, \frac{\pi}{2}]$	الرابع

### مثال

١ عين إشارة كل من النسب المثلثية الآتية:

٥  $\text{قا}(-)$

٦  $\text{جتا } 650^\circ$

٧  $\text{ظا } 215^\circ$

### الحل

١ الزاوية التي قياسها  $130^\circ$  تقع في الربع الثاني  $\therefore \text{جا } 130^\circ$  موجبة

- ب) الزاوية التي قياسها  $315^\circ$  سالبة تقع في الربع الرابع
- ج) الزاوية التي قياسها  $60^\circ$  تكافئ زاوية قياسها  $360^\circ - 290^\circ = 70^\circ$
- ذ) الزاوية التي قياسها  $60^\circ$  تقع في الربع الرابع
- ذ) الزاوية التي قياسها  $30^\circ$  تكافئ زاوية قياسها  $360^\circ + 30^\circ = 390^\circ$
- ذ) الزاوية التي قياسها  $-30^\circ$  تقع في الربع الرابع
- ذ) جتا  $60^\circ$  موجبة.

### حاول أن تحل

١ عين إشارة كل من النسب المثلثية الآتية:

$$\begin{array}{ll} \text{د) جتا } 1230^\circ & \text{ج) ظا } -300^\circ \\ \text{أ) جتا } 210^\circ & \text{ب) جا } 740^\circ \end{array}$$

### مثال

- ٢ إذا كانت  $\Delta ABC$  في وضعها القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة  $B$  وقياسها  $\theta$ . أوجد النسب المثلثية الأساسية لزاوية  $A$  و  $B$  إذا كان إحداثياً النقطة  $B$  هي:
- ج)  $(\sin, \cos)$  ب)  $(\tan, \sec)$   
حيث  $\sin < 0$  ،  $\cos > 0$ .

### الحل

$$\begin{aligned} \text{أ) جتا } \theta &= 0^\circ, \quad \text{جا } \theta = 1^\circ, \quad \text{ظا } \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{غير معرف}) \\ \text{ب) } \sin^2 + \cos^2 &= 1 \quad (\text{دائرة الوحدة}), \quad \text{بالتعويض عن } \sin = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \cos^2 &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \text{فيكون} \\ \cos &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{،} \quad \therefore \cos = \frac{1}{\sqrt{2}} < 0 \quad (\text{مفترض}) \\ \text{ج) } (\sin^2 + \cos^2) &= 1 \quad \therefore \sin^2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{لأن } \sin < 0. \\ \sin &= -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{،} \quad \therefore \sin = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0. \\ \text{ويكون: جتا } \theta &= -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{جا } \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{ظا } \theta = -1. \end{aligned}$$

- ٣ إذا كانت  $270^\circ < \theta < 360^\circ$  وكان  $\text{جا } \theta = -\frac{5}{13}$  أوجد جميع النسب المثلثية الأساسية لزاوية التي قياسها  $\theta$


### الحل

نفرض أن  $\theta = \Delta ABC$  حيث  $\theta$  في الربع الرابع وأن إحداثياً النقطة  $B$  هما  $(\sin, \cos)$

$$\therefore \sin = \text{جا } \theta = -\frac{5}{13}, \quad \cos = \text{جتا } \theta \quad \text{حيث جتا } \theta < 0.$$

$$\therefore \sin^2 + \cos^2 = 1 \quad \therefore \text{جتا } \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}$$

$$\therefore \text{جتا } \theta = \frac{12}{13} \quad \text{أو} \quad \text{جتا } \theta = -\frac{12}{13}$$




$$\text{جتا } \theta = -\frac{12}{5} \quad (\text{لماذا})?$$

### حاول أن تحل

إذا كانت  $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ,  $\text{جا } \theta = \frac{4}{5}$  أوجد جتا  $\theta$ , ظا  $\theta$  حيث  $\theta$  زاوية في وضعها القياسي في دائرة الوحدة.

### مثال

- ٤ إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  و المرسومة في الوضع القياسي، و ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة ب  $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ . فأوجد جميع النسب المثلثية للزاوية  $\theta$ .



$$\text{جا } \theta = \frac{4}{5}, \quad \text{جتا } \theta = -\frac{3}{5}, \quad \text{ظا } \theta = \frac{4}{3}$$

$$\text{قتا } \theta = \frac{5}{3}, \quad \text{قطا } \theta = -\frac{3}{4}$$

### حاول أن تحل


- ٣ أوجد جميع النسب المثلثية للزاوية التي قياسها  $\theta$  المرسومة في الوضع القياسي، و ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة ب حيث:

ج) ب  $(-\frac{12}{13}, \frac{5}{13})$

ب) ب  $(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$

أ) ب  $(\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$

### الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة



في الشكل المقابل: قطعت دائرة الوحدة محور الإحداثيات في النقاط  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(0, -1)$ .

وكانت  $\theta$  قياس الزاوية الموجهة  $\alpha$  و  $\beta$  في وضعها القياسي، والذي يقطع ضلعها النهائي  $\overrightarrow{\text{وب}}$  دائرة الوحدة في ب.

**أولاً:** إذا كانت  $\theta = 0^\circ$  أو  $\theta = 360^\circ$  فإن: ب  $(1, 0)$

**ويكون:** جتا  $0^\circ$  = جتا  $360^\circ$  = 1, جا  $0^\circ$  = جتا  $360^\circ$  = صفر،

$$\text{ظا } 0^\circ = \text{ظا } 360^\circ = \text{صفر}$$

**ثانياً:** إذا كانت  $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$  فإن: ب  $(0, 1)$

جتا  $90^\circ$  = صفر, جا  $90^\circ$  = 1, ظا  $90^\circ$  =  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

**ثالثاً:** إذا كانت  $\theta = 180^\circ = \pi$  فإن: ب  $(-1, 0)$

جتا  $180^\circ$  = صفر, جا  $180^\circ$  = صفر, ظا  $180^\circ$  = صفر

رابعاً: إذا كانت  $\theta = 270^\circ$




جتا  $= 270^\circ$

فإن: بـ  $(0, -)$

ظا  $= \frac{1}{\sqrt{3}}$  ، جا  $= -\frac{1}{\sqrt{3}}$  (غير معروف)

### حاول أن تحل

٤ في الأشكال التالية حدد إحداثي النقطة ب لكل شكل واستنتج الدوال المثلثية لقياسات الزوايا  $45^\circ, 60^\circ, 30^\circ$ .



### مثال

٥ أثبت بدون استخدام الآلة الحاسبة أن: جا  $60^\circ$  - جتا  $60^\circ$  جا  $30^\circ$  = جا  $\frac{\pi}{4}$

### الحل

$$\text{تعلم أن جا } 30^\circ = \frac{1}{2}, \text{ جتا } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ جا } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ جتا } 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$(1) \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\therefore \text{الطرف الأيمن} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(2) \quad \text{الطرف الأيسر} = \text{جا } \frac{\pi}{4} = \text{جا } 45^\circ,$$

من (١)، (٢). ∴ الطرفان متساويان.

### حاول أن تحل

٥ أوجد قيمة: ٣ جا  $30^\circ$  جا  $60^\circ$  - جتا  $60^\circ$  قا  $60^\circ$  + جا  $270^\circ$  جتا  $45^\circ$

٦ **تفكيير ناقد:** إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  مرسومة في الوضع القياسي، وكان جتا  $\theta = \frac{1}{2}$ ، جا  $\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

هل من الممكن أن يكون  $\theta = 240^\circ$ ? وضح ذلك.

### تحقق من فهمك

أثبت صحة كلٌ من المتباينات التالية:

$$1 - 2 \text{جا } 90^\circ = \text{جتا } 180^\circ \quad (1)$$



## تمارين ٤ - ٣



**أولاً: الاختيار من متعدد:**

- ١ إذا كان  $\theta$  قياس زاوية في الوضع القياسي وصلبها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  فإن جا  $\theta$  تساوى:

د  $\frac{2}{\sqrt{3}}$

ج  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

أ  $\frac{1}{2}$

د  $90^\circ$

ج  $60^\circ$

ب  $45^\circ$

أ  $30^\circ$

د  $\pi/2$

ج  $\pi/3$

ب  $\pi$

أ  $\pi/2$

د  $60^\circ$

ج  $45^\circ$

ب  $30^\circ$

أ  $15^\circ$

د  $\pi/11$

ج  $\pi/5$

ب  $\pi/7$

أ  $\pi/3$

د  $60^\circ$

ج  $45^\circ$

ب  $30^\circ$

أ  $10^\circ$

د ١

ج  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب  $\frac{1}{2}$

أ صفرًا

د  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج  $\frac{1}{2}$

ب  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

أ  $\frac{1}{2}$

**ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:**

- ٩ أوجد جميع الدوال المثلثية لزاوية قياسها  $\theta$  المرسومة في الوضع القياسي، وصلبها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة

د  $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$

ج  $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$

ب  $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

أ  $(-\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{2}{3})$

١٠ إذا كان  $\theta$  هو قياس زاوية موجبة في الوضع القياسي، وصلبها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة المعطاة فأوجد جميع الدوال المثلثية لهذه الزاوية في الحالات الآتية:

أ) حيث  $\theta > 0$  (٤١-١)

ب) حيث  $\theta > \frac{\pi}{3}$  (٢٩-١)

١١ اكتب إشارات النسب المثلثية الآتية:

ج) قتا  $410^\circ$

ب) ظا  $365^\circ$

أ) جا  $240^\circ$

و) ظا  $\frac{\pi}{9}$


هـ) قا  $-\frac{\pi}{4}$

د) ظنا  $\frac{\pi}{4}$

١٢ أوجد قيمة ما يأتي:

أ) جتا  $\frac{\pi}{3} \times$  جتا  $0 +$  جا  $\frac{\pi}{3} \times$  جا  $\frac{\pi}{2}$

ب) ظا  $2 + 30^\circ +$  جا  $45^\circ +$  جتا  $90^\circ$



١٣ **الربط بالفيزياء:** عند سقوط أشعة الضوء على سطح شبه شفاف، فإنها تتعكس بنفس زاوية السقوط ولكن البعض منها ينكسر عند مروره خلال هذا السطح. كما في الشكل المجاور:  
إذا كان جا  $\theta = \text{لـ جا } \theta$ ، كانت لـ  $= \text{ جا } \theta$ ، وكانت لـ  $= \text{ جا } \theta$   
فأوجد قياس زاوية  $\theta$ .

١٤ **اكتشف الخطأ:** طلب المعلم من طلاب الفصل إيجاد ناتج  $2 \text{ جا } 45^\circ$ .

إجابة أحمد

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \times 2 = 45 \text{ جا } 2$$

إجابة كريم

$$2 \text{ جا } 45^\circ = 2 \text{ جا } 90^\circ =$$

أى الإجابتين صحيح؟ ولماذا؟

١٥ **تفكيير ناقد:** إذا كانت  $\theta$  قياس زاوية مرسومة في الوضع القياسي، حيث ظنا  $\theta = -1$ ، قتا  $\theta = \sqrt{-1}$ . هل من الممكن أن يكون  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ؟ فسر إجابتك.


## سوف نتعلم

- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوיתين  $\theta$  و  $180^\circ - \theta$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوיתين  $\theta$  و  $-360^\circ - \theta$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوיתين  $\theta$  و  $90^\circ - \theta$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوיתين  $\theta$  و  $270^\circ - \theta$
- الحل العام للمعادلات المثلثية التي على الصورة:

$$\text{جا } \alpha = \text{جتا } \beta$$

$$\text{قا } \alpha = \text{قتا } \beta$$

$$\text{طنا } \alpha = \text{ظنا } \beta$$



سبق أن درست الانعكاس وتعرفت على خواصه.

يبين الشكل المقابل الزاوية الموجهة أو ب في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة  $b(s, c)$ . قياسها  $\theta$  حيث  $90^\circ < \theta < 180^\circ$ .

عين النقطة  $b$ /صورة النقطة  $b$  بالانعكاس حول محور الصادات، واذكر إحداثياتها.  
ما قياس  $\angle a$  أو  $\angle b$ ؟ هل  $\angle a$  أو  $\angle b$  في الوضع القياسي؟

### ١ - الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما $\theta$ ، $(\theta - 180^\circ)$

من الشكل المقابل  $b(s, c)$  صورة النقطة  $b(s, c)$  بالانعكاس حول محور الصادات فيكون  $s' = -s$  ،  $c' = -c$

لذلك فإن:

$$\begin{aligned} \text{جا } (180^\circ - \theta) &= \text{جا } \theta , \text{ قتا } (180^\circ - \theta) = \text{قتا } \theta \\ \text{جتا } (180^\circ - \theta) &= -\text{جتا } \theta , \text{ قا } (180^\circ - \theta) = -\text{قا } \theta \\ \text{ظنا } (180^\circ - \theta) &= -\text{ظنا } \theta , \text{ ظنا } (180^\circ - \theta) = -\text{ظنا } \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{مثلاً: جتا } 120^\circ &= \text{جتا } (180^\circ - 60^\circ) = -\text{جتا } 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ \text{جا } 135^\circ &= \text{جا } (180^\circ - 45^\circ) = \text{جا } 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

### حاول أن تدل

$$1 \quad \text{أوجد ظنا } 135^\circ , \text{ جا } 120^\circ , \text{ جتا } 150^\circ$$

$$\text{للحظ أن: } (\theta + 180^\circ) = \theta$$


يقال إن الزاويتين  $\theta$  ،  $180^\circ - \theta$  زاويتان متنسبتان.

**الزوايا المتنسبة:** هما زاويتان الفرق بين قياسيهما أو مجموع

قياسيهما يساوى عدداً صحيحاً من القوائم.

تعريف

## ٢- الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما $\theta$ ، $(\theta + 180^\circ)$



في الشكل المقابل نجد:

$B(s, \sin \theta)$  صورة النقطة  $B(s, \sin \theta)$  بالانعكاس في

نقطة الأصل و فيكون  $s = -s$  ،  $\sin \theta = -\sin \theta$

لذلك فإن:

$$\cos(\theta + 180^\circ) = -\cos \theta$$

$$\sin(\theta + 180^\circ) = -\sin \theta$$

$$\tan(\theta + 180^\circ) = \tan \theta$$

فمثلاً:

$$\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$$


$$\sin 225^\circ = \sin(180^\circ + 45^\circ) = -\sin 45^\circ$$

$$\tan 240^\circ = \tan(180^\circ + 60^\circ) = \tan 60^\circ$$

### حاول أن تحل

٢ أوجد  $\cos 225^\circ$  ،  $\sin 210^\circ$  ،  $\tan 60^\circ$  ،  $\cot 225^\circ$

## ٣- الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما $\theta$ ، $(\theta - 360^\circ)$



في الشكل المقابل:

$B(s, \sin \theta)$  صورة النقطة  $B(s, \sin \theta)$  بالانعكاس حول محور السينات فيكون  $s = -s$  ،  $\sin \theta = -\sin \theta$

لذلك فإن:

$$\cos(\theta - 360^\circ) = \cos \theta$$

$$\sin(\theta - 360^\circ) = \sin \theta$$

$$\tan(\theta - 360^\circ) = \tan \theta$$

فمثلاً:

$$\cos 330^\circ = \cos(360^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ$$

$$\sin 315^\circ = \sin(360^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ$$

### حاول أن تحل

٣ أوجد:  $\cos 315^\circ$  ،  $\sin 330^\circ$  ،  $\tan 300^\circ$  ،  $\cot 315^\circ$

**تفكير ناقد:** كيف يمكنك إيجاد  $\cos(-45^\circ)$  ،  $\sin(-60^\circ)$  ،  $\tan(-60^\circ)$  ،  $\cot(-45^\circ)$ ؟

## مثال

١ بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة المقدار


$$\text{جا } 150^\circ - \text{جتا } (-30^\circ) + \text{ظتا } 930^\circ$$

## الحل

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} &= \text{جا } 180^\circ = \text{جا } (30^\circ - 180^\circ) \\
 \frac{1}{2} &= \text{جتا } (300^\circ) = \text{جتا } (360^\circ + 30^\circ) \\
 \frac{1}{2} &= \text{جتا } (210^\circ) = \text{جتا } (360^\circ \times 2 - 930^\circ) \\
 \frac{\sqrt{3}}{2} &= \text{جتا } (180^\circ) = \text{جتا } (30^\circ + 180^\circ) \\
 \frac{1}{\sqrt{3}} &= \text{ظتا } 60^\circ = \text{ظتا } (60^\circ + 180^\circ) \\
 \frac{1}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} &= \text{المقدار} \\
 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} &= 0
 \end{aligned}$$

## حاول أن تحل

٤ أثبت أن  $\text{جا } 600^\circ - \text{جتا } (-30^\circ) + \text{ظتا } 150^\circ = 1$

٤- الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما  $\theta$  ،  $(\theta - 90^\circ)$ 

يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة مركبها.  
الزاوية التي قياسها  $\theta$  مرسومة في الوضع القياسي لدائرة طول نصف قطرها  $س$ .

نجد أن:  $س/\text{ص} = \text{ص}/س$   
من تطابق المثلثين  $واب$  ،  $وج ب$ :

لذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا  $\theta$  ،  $(\theta - 90^\circ)$

$$\begin{aligned}
 \text{جا } (\theta - 90^\circ) &= \text{جتا } \theta , \quad \text{قتا } (\theta - 90^\circ) = \text{قا } \theta \\
 \text{جتا } (\theta - 90^\circ) &= \text{جا } \theta , \quad \text{قا } (\theta - 90^\circ) = \text{جتا } \theta \\
 \text{ظتا } (\theta - 90^\circ) &= \text{ظتا } \theta , \quad \text{ظتا } (\theta - 90^\circ) = \text{ظتا } \theta
 \end{aligned}$$

## مثال

١ إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي، و يمر ضلعها النهائي بالنقطة  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$   
فأوجد الدوال المثلثية:  $\text{جا } (\theta - 90^\circ)$  ،  $\text{ظتا } (\theta - 90^\circ)$


### الحل

$$\frac{3}{\theta} = (\theta - 90^\circ) \Rightarrow \text{جتا } \theta \\ \frac{4}{\theta} = (\theta - 90^\circ) \Rightarrow \text{ظتا } \theta$$

### حاول أن تحل

٥ في المثال السابق أوجد جتا  $(\theta - 90^\circ)$  ، قتا  $(\theta + 90^\circ)$

### ٥ - الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما $\theta$ ، $(\theta + 90^\circ)$



من تطابق المثلثين بـ جـا وـ جـب

نجد أن  $\sec' = \sec$  ،  $\sec = -\sec'$

ومن ذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا  $\theta$  ،  $(\theta + 90^\circ)$  كالتالي:

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta + 90^\circ) &= \text{جتا } \theta , \quad \text{قتا } (\theta + 90^\circ) = \text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{جا } \theta , \quad \text{قا } (\theta + 90^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{ظا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{ظتا } \theta , \quad \text{ظتا } (\theta + 90^\circ) = -\text{ظا } \theta \end{aligned}$$

### مثال

٢ إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي يمر ضلعها النهائي بالنقطة  $(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3})$  أوجد الدوال المثلثية ظا  $(\theta + 90^\circ)$  ، قتا  $(\theta + 90^\circ)$

### الحل

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}}{4} &= \frac{1}{3} \Rightarrow \text{ظا } (\theta + 90^\circ) = -\text{ظتا } \theta \\ 3 &= (\theta + 90^\circ) \Rightarrow \text{قتا } (\theta + 90^\circ) = \text{قا } \theta \end{aligned}$$


### حاول أن تحل

٦ في المثال السابق أوجد: جا  $(\theta + 90^\circ)$  ، قا  $(\theta + 90^\circ)$

**٦ - الدوال المثلثية لأي لزاوتيين قاسيهما  $\theta$  ،  $(\theta - ٩٠^\circ)$**

من تطابق المثلثين بـ جـ وـ جـ بـ

الذلـك يمـكن استـنتاج جـمـيع الدـوـال المـثـلـيـة لـلـزاـويـيـن كـالـاتـي:



$$\begin{aligned} \theta - 270^\circ &= \text{قطا}(\theta), & \theta - 90^\circ &= \text{جتا}(\theta), \\ \theta - 90^\circ &= \text{قطا}(\theta), & \theta - 270^\circ &= \text{جتا}(\theta), \\ \theta - 270^\circ &= \text{ظنا}(\theta), & \theta - 270^\circ &= \text{ظنا}(\theta) \end{aligned}$$

مثال

- ٣) إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  المرسومة في الوضع القياسي يمر ضلعها النهائي بالنقطة  $(\frac{3}{2}, \frac{1}{3})$  فأوجد الدوال المثلثية: جتا  $(-270^\circ - \theta)$  ، ظنا  $(-270^\circ - \theta)$

الحل

$$\therefore \text{جتا}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}} = (\theta - 270^\circ)$$

حاول أن تدل

- ٧ في المثال السابق أوجد ظا  $(270^\circ - \theta)$ ، قتا  $(270^\circ - \theta)$

**٧- الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما  $\theta$  .**

من تطابق المثلثين: بـجـ/ وـجـ بـ

لذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا  $\theta$  ،  $(\theta + 270^\circ)$  كالتالي:

$$\begin{aligned} \theta &= \text{جتا } (\theta + 270^\circ) = \text{قطا } (\theta + 270^\circ) \\ \theta &= \text{جتا } (\theta + 270^\circ) = \text{قطا } (\theta + 270^\circ) \\ \theta &= \text{ظطا } (\theta + 270^\circ) = \text{ظتنا } (\theta + 270^\circ) \end{aligned}$$

مثال

- ٤ إذا كانت الزاوية التي قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي يمْضيَّاً إليها بالنقطة  $(\frac{5}{3}, \frac{2}{3})$  فأوجد الدوال المثلثية:  
ج)  $(\sin \theta + \cos \theta)$  ، ق)  $(\tan \theta + \cot \theta)$

## الحل

$$\frac{5\pi}{3} = \text{جا}(\theta + 270^\circ)$$

$$\frac{\pi}{2} = \text{قا}(\theta + 270^\circ)$$

$$\therefore \text{جا}(\theta + 270^\circ) = -\text{جتا}\theta$$

$$\therefore \text{قا}(\theta + 270^\circ) = \text{قتا}\theta$$

## حاول أن تحل

٨ في المثال السابق أوجد ظتا  $(\theta + 270^\circ)$  ، قتا  $(\theta + 270^\circ)$ .

**الحل العام للمعادلات المثلثية التي على الصورة:** (جا  $= \text{جتا}\beta$  ، قتا  $= \alpha$  ، ظا  $= \text{قتا}\beta$ )

General solution of trigonometric equations as the form [tan( $\alpha$ ) = cot( $\beta$ ), sec( $\alpha$ ) = csc( $\beta$ ), sin( $\alpha$ ) = cos( $\beta$ )]



سبق أن درست أنه إذا كان  $\alpha, \beta$  هما قياساً زاويتين متناظمتين (أى مجموع قياسيهما  $90^\circ$ ) فإن جا  $\alpha = \text{جتا}\beta$ ، قتا  $\alpha = \text{قتا}\beta$  ومن ذلك فإن  $\alpha + \beta = 90^\circ$  حيث  $\alpha, \beta$  زاويتان حادتان فإذا كانت جا  $\alpha = \text{جتا}\beta$  فإنها هي قيمة زاوية  $\theta$  المتوقعة؟



١ - إذا كان جا  $\alpha = \text{جتا}\beta$  (حيث  $\alpha, \beta$  قياساً زاويتين متناظمتين) فإن:

$$\frac{\pi}{2} = \beta + \alpha \quad \text{أى} \quad \beta - \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \text{جا}(\beta - \frac{\pi}{2}) = \alpha$$

$$\frac{\pi}{2} = \beta - \alpha \quad \text{أى} \quad \beta + \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \text{جا}(\beta + \frac{\pi}{2}) = \alpha$$

وبإضافة  $\pi/2$  (حيث  $n \in \mathbb{Z}$ ) إلى الزاوية  $\frac{\pi}{2}$  فإن:

(حيث  $n \in \mathbb{Z}$ ، بالمثل)

$$\text{عندما جا} \alpha = \text{جتا}\beta \quad \text{فإن } \beta \pm \frac{\pi}{2} + n\pi$$

(حيث  $n \in \mathbb{Z}$ ،  $\frac{\pi}{2} \neq \beta \neq n\pi$ )

$$\text{عندما قتا} \alpha = \text{قتا}\beta \quad \text{فإن } \beta \pm \frac{\pi}{2} + n\pi$$

٢ - إذا كان ظا  $\alpha = \text{ظتا}\beta$  (حيث  $\alpha, \beta$  قياساً زاويتين متناظمتين) فإن:

$$\frac{\pi}{2} = \beta + \alpha \quad \text{أى} \quad \beta - \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \text{ظا}(\beta - \frac{\pi}{2}) = \alpha$$

$$\frac{\pi}{2} = \beta + \alpha \quad \text{أى} \quad \beta - \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \text{ظا}(\beta - \frac{\pi}{2}) = \alpha$$

وبإضافة  $\pi/2$  (حيث  $n \in \mathbb{Z}$ ) إلى الزاويتين  $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$  فإن:

(حيث  $n \in \mathbb{Z}$ ،  $\frac{\pi}{2} \neq \beta \neq n\pi$ )

$$\text{عندما ظا} \alpha = \text{ظتا}\beta \quad \text{فإن } \beta + \frac{\pi}{2} + n\pi$$

## مثال

٥ حل المعادلة:  $\sin \theta = \sin 2\theta$ 

الحل

المعادلة:  $\sin \theta = \sin 2\theta$ 

$$\text{من تعريف المعادلة} \quad (\text{ن} \in \mathbb{C}) \quad \sin \theta = \sin 2\theta + \frac{\pi}{3}$$

$$\text{أي أن: } \sin \theta = \sin 2\theta + \frac{\pi}{3} \quad (1) \text{ إما}$$

بقسمة الطرفين على ٣

$$\frac{1}{3} \sin \theta = \sin 2\theta + \frac{\pi}{3}$$

$$\text{أي أن: } \sin \theta = \sin 2\theta + \frac{\pi}{3} \quad (2) \text{ أو}$$

حل المعادلة هو:  $\theta = -\frac{\pi}{3} + n\pi$  أو  $\theta = \frac{\pi}{3} + n\pi$ 

## حاول أن تحل

٦ أوجد الحل العام لكل من المعادلات الآتية:

$$\sin \theta = \sin 2\theta \quad (1) \quad \sin \theta = \sin 4\theta \quad (2)$$

**اكتشف الخطأ:** في إحدى مسابقات الرياضيات طلب المعلم من كريم وزياد إيجاد قيمة  $\sin(\theta - \frac{\pi}{3})$ . فأيهما إجابت صحيحة؟ فسر ذلك.

إجابة زياد

$$\begin{aligned} \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) &= \sin(-\theta + \frac{\pi}{3}) \\ &= -\sin(\theta - \frac{\pi}{3}) \\ &= -\sin \theta \end{aligned}$$

إجابة كريم

$$\begin{aligned} \sin(\theta - \frac{\pi}{3}) &= \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) \\ &= \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) \\ &= \sin \theta \end{aligned}$$

## تحقق من فهمك

أوجد جميع قيم  $\theta$  حيث  $\sin \theta = \sin 2\theta$  والتي تتحقق كل من المعادلات الآتية:

$$\sin \theta = \sin 2\theta \quad (1) \quad \cos \theta = \cos 2\theta \quad (2)$$

## تمارين ٤ -

**أولاً: أكمل ما ياتى:**

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ..... = $(\theta - {}^{\circ} 180)$ ٢ | ..... = $(\theta + {}^{\circ} 180)$ ١ |
| ..... = $(\theta + {}^{\circ} 360)$ ٤ | ..... = $(\theta - {}^{\circ} 360)$ ٣ |
| ..... = $(\theta - {}^{\circ} 90)$ ٦  | ..... = $(\theta + {}^{\circ} 90)$ ٥  |
| ..... = $(\theta - {}^{\circ} 270)$ ٨ | ..... = $(\theta + {}^{\circ} 270)$ ٧ |

**ثانياً: أكمل كلاً مما ياتى بقياس زاوية حادة**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ..... جتا ${}^{\circ} 67$ = جا ٩  | ..... جتا ${}^{\circ} 25$ = جتا ١٠ |
| ..... قتا ${}^{\circ} 13$ = قا ١٢   | ..... ظتا ${}^{\circ} 42$ = ظتا ١١ |
| ..... إذا كان ظتا $\theta_2$ = طا $\theta$ حيث ${}^{\circ} 90 < \theta < {}^{\circ} 180$ فإن و $\theta = (\theta - {}^{\circ} 90)$ ١٣         |                                    |
| ..... إذا كان جا $\theta_5$ = جتا $\theta_4$ حيث $\theta_4$ زاوية حادة موجبة فإن $\theta = \theta_5$ ١٤                                       |                                    |
| ..... إذا كان قا $\theta = \text{قا}({}^{\circ} 90 - \theta)$ فإن ظتا $\theta =$ ١٥   |                                    |
| ..... إذا كان ظا $\theta_2$ = ظتا $\theta_3$ حيث $\exists \theta_3 \in [{}^{\circ} 0, \frac{\pi}{2}]$ فإن و $\theta = \theta_2 - \theta_3$ ١٦ |                                    |
| ..... إذا كان جتا $\theta_2$ = جا $\theta_2$ حيث $\theta_2$ زاوية حادة موجبة فإن جا $\theta_2 = \theta_2$ ١٧                                  |                                    |

**ثالثاً: الاختيار من متعدد:**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ..... إذا كانت ظا $(\theta + {}^{\circ} 180) = 1$ حيث $\theta$ قياس أصغر زاوية موجبة فإن قياس $\theta$ يساوى ١٨                    |                                      |
| ..... ${}^{\circ} 135$ ٥   | ..... ${}^{\circ} 60$ ج ٦            |
| ..... ${}^{\circ} 30$ ب ٧  | ..... ${}^{\circ} 45$ أ ٨            |
| ..... إذا كان جتا $\theta_2 = \text{جا} \theta$ حيث $\exists \theta \in [{}^{\circ} 0, \frac{\pi}{2}]$ فإن جتا $\theta_2$ تساوى ١٩ |                                      |
| ..... ١ ج ٩  | ..... $\frac{1}{2}$ ب ١٠             |
| ..... $\frac{1}{2}$ ج ١١   | ..... $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ أ ١٢     |
| ..... إذا كان جا $\alpha = \text{جتا} \beta$ , حيث $\alpha, \beta$ زاويتان حادتان فإن ظا( $\alpha + \beta$ ) تساوى ٢٠              |                                      |
| ..... ٥ غير معروف  | ..... $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ أ ١٣     |
| ..... إذا كان جا $\theta_2 = \text{جتا} \theta_4$ حيث $\theta_4$ زاوية حادة موجبة فإن ظا( $\theta_3 - {}^{\circ} 90$ ) تساوى ٢١    |                                      |
| ..... ٥  | ..... $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ ب ١٤     |
| ..... ١ ج ١٥   | ..... $1 - \frac{1}{3\sqrt{3}}$ أ ١٦ |
| ..... إذا كان جتا( ${}^{\circ} 90 + \theta$ ) = $\frac{1}{3}$ حيث $\theta$ قياس أصغر زاوية موجبة فإن قياس $\theta$ يساوى ٢٢        |                                      |
| ..... ${}^{\circ} 330$ ٥   | ..... ${}^{\circ} 240$ ب ١٧          |
| ..... ${}^{\circ} 210$ ج ١٨  | ..... ${}^{\circ} 150$ أ ١٩          |

## رابعاً، أجب عن الأسئلة الآتية

٢٣ أوجد إحدى قيم  $\theta$  حيث  $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$  التي تتحقق كلاً من الآتي:

أ جا  $(\theta + 15^\circ) = \text{جتا}(50^\circ - \theta)$

ب قا  $(\theta + 25^\circ) = \text{قتا}(15^\circ - \theta)$

ج ظا  $(\theta + 20^\circ) = \text{ظتا}(30^\circ - \theta)$

د جا  $\frac{\theta + 20^\circ}{2} = \text{جتا}\frac{40^\circ + \theta}{2}$

٤٤ أوجد قيمة كل مما يأتي:

د ظا  $780^\circ$

ج قا  $300^\circ$

ب قتا  $225^\circ$

أ جا  $150^\circ$

ح جتا  $\frac{\pi}{4}$

ز ظتا  $\frac{\pi}{3}$

و جا  $\frac{\pi}{4}$

ه قتا  $\frac{\pi}{6}$

٤٥ إذا كان الضلع النهائي لزاوية قياسها  $\theta$  والمرسومة في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة

في النقطة ب  $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  فأوجد:

ب جتا  $(\theta - \frac{\pi}{2})$

أ جا  $(\theta + 180^\circ)$

د قتا  $(\theta - \frac{\pi}{2})$

ج ظا  $(\theta - 360^\circ)$

**اكتشف الخطأ:** جميع الإجابات التالية صحيحة ماعدا إجابة واحدة فقط خطأ، فما هي:

-١ جتا  $\theta$  تساوى

أ جا  $(\theta - 360^\circ)$       ب جا  $(\theta - 270^\circ)$       ج جتا  $(\theta - 270^\circ)$       د جتا  $(\theta - 360^\circ)$


-٢ جا  $\theta$  تساوى

أ جتا  $(\theta - \frac{\pi}{2})$       ب جا  $(\theta - \pi)$       ج جتا  $(\theta + \frac{\pi}{2})$       د جا  $(\theta + \frac{\pi}{2})$

-٣ ظا  $\theta$  تساوى

أ ظتا  $(\theta - 90^\circ)$       ب ظتا  $(\theta - 270^\circ)$       ج ظا  $(\theta + 180^\circ)$       د ظا  $(\theta - 270^\circ)$


**الربط بالเทคโนโลยيا:** عند استخدام كريم حاسوبه المحمول كانت زاوية ميله مع الأفقى  $132^\circ$  كما هو موضح بالشكل المقابل.



أ ارسم الشكل السابق في المستوى الإحداثي، بحيث تكون الزاوية  $132^\circ$  في الوضع القياسي ثم أوجد زاويتها المتنسبة.

ب اكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها في إيجاد قيم أ، ثم أوجد قيمة أ الأقرب سنتيمتر.

**ألعاب:** تنتشر لعبة العجلة الدوارة في مدينة الملاهي، وهي عبارة عن عدد من الصناديق تدور في قوس دائري يبلغ نصف قطره ١٢ متراً، فإذا كان قياس الزاوية المشتركة مع الضلع النهائي في الوضع القياسي  $\frac{\pi}{4}$ .



أ ارسم الزاوية التي قياسها  $\frac{\pi}{4}$  في الوضع القياسي.

ب اكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها في إيجاد قيمة أ، ثم أوجد قيمة أ بالметр لأقرب رقمين عشربيين.

**تفكير ناقد:**

أ إذا كان  $\theta$  قياس زاوية مرسومة في الوضع القياسي، حيث  $\text{ظتا } \theta = -\frac{1}{2}$ . فهل يمكن أن يكون  $\cot(\theta) = \frac{\pi}{3}$ ? فسر إجابتك؟

ب إذا كان  $\text{جتا } (\theta - \frac{\pi}{2}) = \frac{3}{2}$ ،  $\text{جا } (\theta + \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$  فأوجد أصغر قياس موجب للزاوية  $\theta$ .


## ٤ - ٥

### التمثيل البياني للدوال المثلثية

### Graphing Trigonometric Functions

#### سوف تتعلم

- رسمل دالة الجيب واستنتاج خواصها.
- رسمل دالة جيب التمام واستنتاج خواصها.



تعتمد الموجات فوق الصوتية على ترددات عالية تختلف في طول الموجة. كما تستخدم في التصوير الطبي، وتستخدمها الغواصات كجهاز رادار يعمل في أعماق المحيطات. وعند تمثيل هذه الموجات بمخططات بيانية لتعرف خواص دالة الجيب وجيب التمام قم أنت وزملاؤك بالأعمال التعاونية التالية:

#### المصطلحات الأساسية

#### Represent sine function graphically

#### التمثيل البياني لدالة الجيب

#### عمل تعاونى

١ أكمل الجدول التالي بالاشتراك مع زملائك:


$\pi/2$	$\pi/11$	$\pi/9$	$\pi/7$	$\pi$	$\pi/5$	$\pi/3$	$\pi/6$	.	$\theta$
								$0,5$	$\theta$

٢ ارسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.

٣ أنشئ جدولًا آخر مستخدماً قيم المعكوس الجمعي للقيم الموجودة في الجدول السابق.

٤ عين جميع النقاط التي حصلت عليها على شبكة الإحداثيات.

٥ أكمل رسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.



٦ هل لاحظت وجود قيمٌ عظمى أو قيمٌ صغرى لهذا المنحنى. فسر إجابتك؟

## تعلم

### خواص دالة الجيب

#### Properties of the sine function

- في الدالة  $d$  حيث  $d(\theta) = \sin \theta$  فإن:
- ★ مجال دالة الجيب هو  $[-\infty, \infty]$ ، ومداها  $[-1, 1]$ .
  - ★ دالة الجيب دالة دورية ذات دورة  $\pi/2$  أي أنه يمكن إزاحة المنحنى في الفترة  $[\pi/2, \pi]$  إلى اليمين أو اليسار.
  - ★ القيمة العظمى لدالة الجيب تساوى 1 وتحدث عند النقطة  $\theta = \pi/2 + 2n\pi$   $n \in \mathbb{Z}$ .
  - ★ القيمة الصغرى لدالة الجيب تساوى -1 وتحدث عند النقطة  $\theta = -\pi/2 + 2n\pi$   $n \in \mathbb{Z}$ .

#### Represent cosine function graphically

#### التمثيل البياني لدالة جيب التمام

## عمل تعاونى

١ أكمل الجدول التالي بالاشتراك مع زملائك:


$\pi/2$	$\pi/11$	$\pi/9$	$\pi/7$	$\pi$	$\pi/5$	$\pi/3$	$\pi/4$	.	$\theta$
								٠,٨	١

٢ ارسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.

٣ أنشئ جدولًا آخر مستخدماً قيم الممكوس الجمعي للقيم الموجودة في الجدول السابق.

٤ عين جميع النقاط التي حصلت عليها على شبكة الإحداثيات.

٥ أكمل رسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.



## تعلم

### خواص دالة جيب التمام

#### Properties of cosine function

- في الدالة  $d$  حيث  $d(\theta) = \cos \theta$  فإن:
- ★ مجال دالة جيب التمام هو  $[-\infty, \infty]$ ، ومداها  $[-1, 1]$ .
  - ★ دالة جيب التمام دورية ذات دورة  $\pi/2$ ، أي أنه يمكن إزاحة المنحنى في الفترة  $[\pi/2, \pi]$  إلى اليمين أو اليسار.
  - ★ القيمة العظمى لدالة جيب التمام تساوى 1 وتحدث عند النقطة  $\theta = 2n\pi$ .
  - ★ القيمة الصغرى لدالة جيب التمام تساوى -1 وتحدث عند النقطة  $\theta = (2n+1)\pi$ .



- ★ القيمة العظمى لدالة جيب تمام تساوى ١ وتحدد عند النقاط  $\theta = \pi/2 \pm n\pi$  ن  $\in \mathbb{C}$
- ★ القيمة الصغرى لدالة جيب تمام تساوى - ١ وتحدد عند النقاط  $\theta = -\pi/2 \pm n\pi$  ن  $\in \mathbb{C}$

### مثال

**١** **الربط بالفيزياء:** يمكن لإحدى السفن الدخول إلى الميناء إذا كان مستوى المياه مرتفعاً نتيجة حركة المد والجزر، بحيث لا يقل عمق المياه عن ١٠ أمتار، وكانت حركة المد والجزر في ذلك اليوم تخضع للعلاقة  $f = 6 \sin(15n) + 10$  حيث  $n$  هو الزمن الذي ينقضى بعد منتصف الليل بالساعات تبعاً لنظام حساب الوقت بـ ٢٤ ساعة. أوجد عدد المرات التي يبلغ فيها عمق المياه في الميناء ١٠ أمتار تماماً.

رسم مخطط بيانيًّاً يبين كيف يتغير عمق المياه مع تغير حركة المد والجزر أثناء اليوم.

### الحل

العلاقة بين الزمن ( $n$ ) بالساعات وعمق المياه ( $f$ ) بالأمتار هي

$$\text{من العلاقة: } f = 6 \sin(15n) + 10$$


$$\text{عندما } n = 0 \quad f = 6 \sin(15 \times 0) + 10 = 6 \sin 0 + 10 = 10$$

$$\text{عندما } n = 6 \quad f = 6 \sin(15 \times 6) + 10 = 6 \sin 90^\circ + 10 = 6 \sin 90^\circ + 10 = 16$$

$$\text{عندما } n = 12 \quad f = 6 \sin(15 \times 12) + 10 = 6 \sin 180^\circ + 10 = 6 \sin 180^\circ + 10 = 10$$

$$\text{عندما } n = 18 \quad f = 6 \sin(15 \times 18) + 10 = 6 \sin 270^\circ + 10 = 6 \sin 270^\circ + 10 = 4$$

$$\text{عندما } n = 24 \quad f = 6 \sin(15 \times 24) + 10 = 6 \sin 360^\circ + 10 = 6 \sin 360^\circ + 10 = 10$$



ن الساعات	٢٤	١٨	١٢	٦	٠
f بالأمتار	١٠	٤	١٠	١٦	١٠

من الجدول نجد أن: عمق المياه تبلغ ١٠ أمتار

عندما  $n = 0, 12, 18, 24$  ساعة

### حاول أن تحل

**١** في المثال السابق أوجد عدد الساعات خلال اليوم التي تستطيع فيها السفينة الدخول إلى الميناء؟

### تحقق من فهمك


- ١ ارسم منحني الدالة  $f(x) = 3 \sin(2x)$  حيث  $x \in [0, \pi/2]$
- ٢ ارسم منحني الدالة  $f(x) = 2 \sin(3x)$  حيث  $x \in [0, \pi/2]$

## تمارين ٤ - ٥


**أولاً: أكمل ما ياتى:**

- ١ مدى الدالة د حيث  $d(\theta) = \sin \theta$  هو
- ٢ مدى الدالة د حيث  $d(\theta) = 2 \sin \theta$  هو
- ٣ القيمة العظمى للدالة ع حيث  $u(\theta) = 4 \sin \theta$  هي
- ٤ القيمة الصغرى للدالة ه حيث  $h(\theta) = 3 \sin \theta$  هي

**ثانياً: اكتب قاعدة كل دالة مثلثية بجوار الشكل المناظر لها.**



شكل (٢) القاعدة هي:



شكل (١) القاعدة هي:

**ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية:**

- ٥ أوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى، ثم احسب المدى لكل دالة من الدوال الآتية :

$$\text{أ } \text{ص} = \sin \theta$$

$$\text{ب } \text{ص} = 3 \sin \theta$$

$$\text{ج } \text{ص} = \frac{3}{2} \sin \theta$$

- ٦ مثل كل من الدوال  $\text{ص} = 4 \sin \theta$  ،  $\text{ص} = 3 \sin \theta$  باستخدام الآلة الحاسبة الرسمومية أو بأحد برامج الحاسوب الرسمومية ومن الرسم أوجد :

**أ** مدى الدالة.

**ب** القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة.

٦ - ٤

## إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية

Finding the Measure of an Angle Given the value  
of one of its Trigonometric Ratios

سوف تتعلم

إيجاد قياس زاوية بمعلومية دالة مثلثية.

علمت أنه إذا كانت ص = جا  $\theta$  فإنه يمكن إيجاد قيمة ص بمعلومية الزاوية  $\theta$ .  
وعندما تعطى قيمة ص فهل يمكنك إيجاد قيمة  $\theta$ ؟



تعلم

إذا كانت ص = جا  $\theta$

فإنه يمكن إيجاد قيم  $\theta$  إذا علمت قيمة ص.

مثال

المصطلحات الأساسية

دالة مثلثية.

Trigonometric Function

١ أوجد  $\theta$  حيث  $0 < \theta < 360^\circ$  والتي تتحقق كلاً مما يأتي:

ب) ظلتا  $\theta = -1620^\circ$ .

الحل

أ) ∵ جيب الزاوية  $< 0$

∴ الزاوية تقع في الربع الأول أو الثاني.

وباستخدام الآلة الحاسبة:

ابداً → SHIFT sin⁻¹ 0 . 6 3 2 5 = °,,,

الربع الأول:  $\theta = 6^\circ 14^\circ 39^\circ$

الربع الثاني:  $\theta = 180^\circ - 6^\circ 14^\circ 39^\circ = 140^\circ 45^\circ 54^\circ$

ب) ∵ ظل تمام الزاوية  $> 0$

∴ الزاوية تقع في الربع الثاني أو الرابع.

وباستخدام الآلة الحاسبة:

ابداً → SHIFT tan⁻¹ 1 . 6 2 0 4 = °,,,

الربع الثاني:  $\theta = 180^\circ - 19^\circ 40^\circ 48^\circ = 148^\circ 19^\circ 12^\circ$

الربع الرابع:  $\theta = 360^\circ - 19^\circ 40^\circ 48^\circ = 328^\circ 19^\circ 12^\circ$

هل يمكنك التحقق من صحة الحل باستخدام الآلة الحاسبة؟

### حاول أن تحل


١ أوجد  $\theta$  حيث  $0 < \theta < 360^\circ$  والتي تحقق كلاً مما يأتي:

ج)  $\cot \theta = -2,1036$


ب)  $\tan \theta = -3,6150$

ج)  $\theta = 620^\circ$

### تحقق من فهمك



١ **الربط بالألعاب الرياضية:** توجد لعبة التزلق في مدينة الألعاب، فإذا كان ارتفاع إحدى العبارات ١٠ أمتار وطولها ١٦ متراً كما في الشكل المجاور. فاكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها لإيجاد قيمة الزاوية  $\theta$  ثم أوجد قيمة هذه الزاوية بالدرجات. لأقرب جزء من ألف.



٢ **سيارات:** يهبط كريم بسيارته أسفل منحدر طولها ٦٥ متر وارتفاعه ٨ أمتار، فإذا كان المنحدر يصنع مع الأفقي زاوية قياسها  $\theta$ . أوجد  $\theta$  بالتقدير السنتيني.



٣ **اكتشف الخطأ:** بسبب الرياح انكسرت نخلة طولها ٢٠ متراً، بحيث تأخذ الشكل المجاور، فإذا كان طول الجزء الرأسى منها ٧ أمتار، والجزء المائل ١٣ متراً وكانت  $\theta$  هي الزاوية التي يصنعها الجزء المائل مع الأفقي. فأوجد  $\theta$  بالتقدير السنتيني.

إجابة عمر


$$\therefore \cot \theta = \frac{13}{7}$$

$$\therefore \theta = 57^\circ 25' 16''$$

إجابة كريم

$$\therefore \tan \theta = \frac{13}{7}$$

$$\therefore \theta = 62^\circ 34' 44''$$



٤ **التفكير الناقد:** الشكل المجاور يمثل قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين  $A(3, 0)$ ،  $B(7, 3)$  أوجد قياس الزاوية المحصورة بين  $\overline{AB}$  ومحور السينات.

## تمارين ٤ - ١

**أولاً: الاختيار من متعدد:**

- ١ إذا كان  $\text{جا } \theta = 4325^\circ$  ، حيث  $\theta$  زاوية حادة موجبة فإن و  $\angle(\theta)$  تساوى  
 د  $46,316^\circ$  ج  $32,388^\circ$  ب  $64,347^\circ$  أ  $25,626^\circ$

- ٢ إذا كان  $\text{ظا } \theta = 1,8$  وكانت  $\theta \geq 90^\circ$  فإن و  $\angle(\theta)$  تساوى  
 د  $299,005^\circ$  ج  $240,945^\circ$  ب  $119,005^\circ$  أ  $60,945^\circ$

**ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:**

- ١ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من  
 جتا  $\theta$ ، جا  $\theta$  في الحالات الآتية:

ج ب  $(-\frac{8}{10}, \frac{6}{10})$  ب  $(\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}})$  أ ب  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

- ٢ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من  
 قاتا  $\theta$ ، قتا  $\theta$  في الحالات الآتية:

ج ب  $(-\frac{12}{13}, -\frac{5}{13})$  ب  $(-\frac{1}{5\sqrt{3}}, -\frac{2}{5\sqrt{3}})$  أ ب  $(\frac{2}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{3})$

- ٣ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من  
 ظتا  $\theta$ ، ظتا  $\theta$  في الحالات الآتية:

ج ب  $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$  ب  $(\frac{3}{24\sqrt{3}}, -\frac{5}{24\sqrt{3}})$  أ ب  $(\frac{1}{10\sqrt{3}}, -\frac{3}{10\sqrt{3}})$

- ٤ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها  $\theta$  في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب  
 فأوجد و  $\angle(\theta)$  حيث  $90^\circ < \theta < 360^\circ$  عندما:

ج ب  $(\frac{8}{10}, \frac{-6}{10})$  ب  $(-\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}})$  أ ب  $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

٥ أوجد بالقياس الستيني أصغر زاوية موجبة تحقق كلاً من:

ج)  $\cot^{-1} 1,4552$

ب)  $\csc^{-1} 1,436$

أ)  $\tan^{-1} 0,6$

٦ ق)  $\tan^{-1} (-1,6004)$

٤ ه)  $\cot^{-1} 3,6218$

٥ د)  $\csc^{-1} (-2,2364)$

٧ ج)  $\cot^{-1} (-2,1456)$

ب)  $\csc^{-1} (-0,642)$


أ)  $\tan^{-1} (0,2356)$

٨ إذا كانت  $0 \leq \theta < 360^\circ$  فأوجد قياس زاوية  $\theta$  لكل مما يأتي:

٩ إذا كان  $\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$  وكانت  $0 \leq \theta < 180^\circ$




١٠ احسب قياس زاوية  $\theta$  لأقرب ثانية

١١ أوجد قيمة كلٌ من:  $\csc \theta$  ،  $\cot \theta$  ،  $\tan \theta$  ،  $\sec \theta$ .



٨ سلام؛ سلم طوله ٥ أمتار يستند على جدار فإذا كان ارتفاع السلم عن سطح الأرض يساوي ٣ أمتار فأوجد بالراديان زاوية ميل السلم على الأفق.

٩ أوجد قياس زاوية  $\theta$  بالقياس الستيني في كلٍ من الأشكال الآتية:



# ملخص الوحدة

- ١ الزاوية الموجبة: هي زوج مرتب من شعاعين ( $\overrightarrow{OA}$ ,  $\overrightarrow{OB}$ ) هما ضلعاً الزاوية، لهما نقطة بداية واحدة هي رأس الزاوية، ويسمى  $\overrightarrow{OA}$  الضلع الابتدائي،  $\overrightarrow{OB}$  الضلع النهائي للزاوية:



- ٢ الوضع القياسي للزاوية: في نظام إحداثي متعامد تكون رأس الزاوية هي نقطة الأصل، وضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات.

- ٣ الزوايا المتكافئة: هي الزوايا التي قياساتها على الصورة  $(\theta + n \times 360^\circ)$  حيث  $n \in \mathbb{Z}$  يكون لها نفس الضلع النهائي.

- ٤ الزاوية النصف قطرية: هي الزاوية المركزية في الدائرة وتقابل قوساً طوله يساوي طول نصف قطر الدائرة.

- ٥ العلاقة بين القياس الستيني وال دائري: إذا كانت لدينا زاوية قياسها الستيني يساوي  $s^\circ$ . وقياسها الدائري يساوى  $\theta$ ، فإن:

$$\theta = s^\circ \times \frac{\pi}{180}, \quad s^\circ = \theta \times \frac{180}{\pi}$$

- ٦ طول القوس: إذا كان  $\theta$  هو قياس الزاوية المركزية لدائرة طول نصف قطرها  $R$ ، تقابل قوساً من الدائرة طوله  $L$  فإن:  $L = R \times \theta$

- ٧ الزاوية الرباعية: هي زاوية في الوضع القياسي، بحيث يقع ضلعها النهائي على أحد المحورين  $x$  أو  $y$ .

- ٨ دائرة الوحدة: هي دائرة مرسومة في المستوى الإحداثي، ومركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها وحدة واحدة.

- ٩ النسبة المثلثية: هي نسبة بين طولي ضلعين من أضلاع المثلث القائم الزاوي.

- ١٠ اشارات الدوال المثلثية:

لاحظ أن:			
<b>الربع الرابع:</b> $270^\circ < \theta < 360^\circ$ جتا $\theta$ , قتا $\theta$ موجبتان وبقى الدوال سالبة.	<b>الربع الثالث:</b> $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ظتا $\theta$ , ظتا $\theta$ موجبتان وبقى الدوال سالبة.	<b>الربع الثاني:</b> $90^\circ < \theta < 180^\circ$ جتا $\theta$ , قتا $\theta$ موجبتان وبقى الدوال سالبة.	<b>الربع الأول:</b> $0^\circ < \theta < 90^\circ$ كل الدوال المثلثية موجبة

## ملخص الوحدة

١١ الدوال المثلثية للزوايا التي قياساتها:

ثانية:  $(\theta + 180^\circ)$

أولاً:  $(\theta - 180^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta + 180^\circ) &= -\text{جا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta + 180^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{جتا } (\theta + 180^\circ) &= -\text{جتا } \theta, \quad \text{قا } (\theta + 180^\circ) = -\text{قا } \theta \\ \text{ظا } (\theta + 180^\circ) &= -\text{ظا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta + 180^\circ) = -\text{ظتا } \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta - 180^\circ) &= \text{جا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta - 180^\circ) = \text{قتا } \theta \\ \text{جتا } (\theta - 180^\circ) &= -\text{جتا } \theta, \quad \text{قا } (\theta - 180^\circ) = -\text{قا } \theta \\ \text{ظا } (\theta - 180^\circ) &= -\text{ظا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta - 180^\circ) = -\text{ظتا } \theta \end{aligned}$$

ثالثاً:  $(\theta - 360^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta - 360^\circ) &= -\text{جا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta - 360^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{جتا } (\theta - 360^\circ) &= \text{جتا } \theta, \quad \text{قا } (\theta - 360^\circ) = \text{قا } \theta \\ \text{ظا } (\theta - 360^\circ) &= -\text{ظا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta - 360^\circ) = -\text{ظتا } \theta \end{aligned}$$

خامساً:  $(\theta + 90^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta + 90^\circ) &= \text{جتا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta + 90^\circ) = \text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{جا } \theta, \quad \text{قا } (\theta + 90^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{ظا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{ظتا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta + 90^\circ) = -\text{ظا } \theta \end{aligned}$$

رابعاً:  $(\theta - 90^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta - 90^\circ) &= -\text{جتا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta - 90^\circ) = \text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta - 90^\circ) &= \text{جا } \theta, \quad \text{قا } (\theta - 90^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{ظا } (\theta - 90^\circ) &= \text{ظتا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta - 90^\circ) = \text{ظا } \theta \end{aligned}$$

سادساً:  $(\theta + 270^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta + 270^\circ) &= -\text{جتا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta + 270^\circ) = -\text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta + 270^\circ) &= \text{جا } \theta, \quad \text{قا } (\theta + 270^\circ) = \text{قتا } \theta \\ \text{ظا } (\theta + 270^\circ) &= -\text{ظتا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta + 270^\circ) = -\text{ظا } \theta \end{aligned}$$

سابعاً:  $(\theta - 270^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta - 270^\circ) &= -\text{جتا } \theta, \quad \text{قتا } (\theta - 270^\circ) = \text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta - 270^\circ) &= -\text{جا } \theta, \quad \text{قا } (\theta - 270^\circ) = -\text{قتا } \theta \\ \text{ظا } (\theta - 270^\circ) &= \text{ظتا } \theta, \quad \text{ظتا } (\theta - 270^\circ) = \text{ظا } \theta \end{aligned}$$

١٢ خواص كل من دالتي الجيب وجيب التمام

الخاصية	دالة الجيب $D(\theta) = \text{جتا } \theta$	دالة جيب التمام $d(\theta) = \text{جا } \theta$
المجال والمدى	المجال هو $[-\infty, \infty]$ ، المدى هو $[1, 1]$	المجال هو $[-\infty, \infty]$ ، المدى هو $[1, 1]$
القيمة الظمى	تساوي ١ عند $s = \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}, \pm \pi, n \in \mathbb{Z}$	تساوي ١ عند $s = \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}, \pm \pi, n \in \mathbb{Z}$
القيمة الصغرى	تساوي -١ عند $s = \pm \pi, n \in \mathbb{Z}$	تساوي -١ عند $s = \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}, \pm \pi, n \in \mathbb{Z}$

١٣ إذا قطع الضلع النهائي للزاوية  $\theta$  المرسومة في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة  $b(s, c)$  فإن  $s = \text{جتا } \theta$  ،  $c = \text{جا } \theta$  وتعرف بالدوال الدائرية.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتية:



# اختبارات عامة

## (الجبر وحساب المثلثات)

## الاختبار الأول

السؤال الأول : أختير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة :

١ إذا كان  $L$ ،  $M$  جذري المعادلة  $s^2 - 7s + 3 = 0$  فإن  $L + M =$

٧٩ ٥

٥٨ ج

٣ ب

٧ أ

٢ إذا كانت  $\sin \theta = -1$  ،  $\cos \theta = 0$  فإن  $\theta$  تساوى

٧٢ ٥

$\frac{\pi}{2}$  ج

$\pi$  ب

$\frac{\pi}{2}$  أ

٣ المعادلة التربيعية التي جذراها  $-2t^2 + 3t$  هي

١  $s^2 + 4s + 13 = 0$  ب  $s^2 - 4s + 13 = 0$  ج  $s^2 + 4s - 13 = 0$  د  $s^2 - 4s - 13 = 0$

٤ إذا كان أحد جذري المعادلة  $s^2 - (m+2)s + 3 = 0$  معكوساً جميئاً للجذر الآخر فإن  $m$  تساوى

٣- ٥

٢- ج

٢ ب

٣ أ

السؤال الثاني : أكمل

أ الدالة  $d$  : حيث  $d(s) = -(s-1)(s+2)$  موجبة في الفترة

ب الزاوية التي قياسها  $930^\circ$  تقع في الربع

ج إذا كان  $\sin \theta = \frac{1}{3}$  ،  $\cos \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$  فإن  $\theta$  تساوى

٥ المعادلة التربيعية التي جذراها ضعف جذري المعادلة  $s^2 - 8s + 5 = 0$  هي

السؤال الثالث :

١ ضع العدد  $\frac{-2}{2+3}t^2$  في صورة عدد مركب. حيث  $t = -1$ .

ب إذا كان  $z = 2 - 4j$  حيث  $z = x + iy$  أوجد  $x$  و  $y$ .

السؤال الرابع :

أ إذا كانت  $d$  :  $h \leftarrow h \sin d(s) = -s^2 + 8s - 15$

ثانياً: أولاً: ارسم منحني الدالة في الفترة  $[1, 7]$ . عين من الرسم إشارة هذه الدالة.

ب إذا كان  $s = 3 + 2t$  ،  $h = \frac{-4-t}{1-t}$  فأوجد  $s + h$  في صورة عدد مركب.

السؤال الخامس :

أ أوجد مجموعة حل المتباينة  $s^2 + 2s - 4 \geq 0$ .

ب إذا كان ظاب =  $\frac{3}{4}$  حيث  $180^\circ > b > 270^\circ$  فأوجد قيمة: جتا  $(-360^\circ - b)$  - جتا  $(-90^\circ - b)$

# اختبارات عامة

## (الجبر وحساب المثلثات)

## الاختبار الثاني

### السؤال الأول: أكمل ما يأتي

١ أبسط صورة للعدد التخيلي  $t =$

٢ إذا كان جذراً المعادلة  $s^2 - 6s + L = 0$  حقيقيان ومتساويان فإن  $L =$

٣ إذا كان  $90^\circ > \theta > 0^\circ$  وكان  $\sin \theta = 2 \sin \alpha$  فإن  $\tan \theta =$

٤ مدى الدالة  $d$  حيث  $d(\theta) = \frac{3}{\pi} \sin \theta$  هو

### السؤال الثاني: أختير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة:

١ المعادلة:  $s^2(s-1)(s+1) = 0$  من الدرجة:

٤ الرابعة

٣ الثالثة

٢ الثانية

١ الأولى

٢ إذا كان جذراً المعادلة  $s^2 + 3s - m = 0$  حقيقيان و مختلفان فإن  $m$  تساوى:

٤

٣

٢

١

٣ إذا كان مجموع قياسات زوايا أي مضلع منتظم تساوى  $180^\circ(n-2)$  حيث  $n$  عدد الأضلاع فإنقياس زاوية المثلمن المنتظم بالقياس الدائري تساوى:

٥

٣

٢

١

٤ إذا كان  $2 \sin \theta = \sqrt{3}$  ،  $\pi > \theta > 0$  فإن  $\cos \theta$  يساوى

٦

٤

٣

١

### السؤال الثالث:

١ أوجد قيمة  $k$  التي تجعل أحد جذري المعادلة:  $4k s^2 + 7s + k^2 + 4 = 0$  هو المعاكس الضربي للجذر الآخر.

٢ إذا كان  $\sin \theta = \sin 75^\circ = \sin(30^\circ + 60^\circ)$  حيث  $0^\circ < \theta < 360^\circ$  فأوجد  $\cos \theta$ .

### السؤال الرابع:

١ أولاً: أوجد قيمتي  $a$ ،  $b$  اللتين تحققان المعادلة:  $12 + 3a + b = 4b - 27$  ت

ثانياً: أوجد في ح مجموعة حل المتباينة:  $s(s+1) \geq 2$ .

٢ زاوية مركبة قياسها  $\theta$  مرسومة في دائرة طول نصف قطرها ١٨ سم وتحصر قوساً طوله ٢٦ سم. أوجد  $\theta$  بالقياسesimal.


### السؤال الخامس:

١ إذا كان مجموع الأعداد الصحيحة المترتبة  $(1+2+3+\dots+n)$  يعطى بالعلاقة  $H = \frac{n}{2}(1+n)$  فكم عددًا صحيحًا متتاليًا بدءًا من العدد ١ يكون مجموعها مساوياً ٢١٠

٢ إذا كان  $\sin \theta = \frac{4}{5}$  حيث  $90^\circ < \theta < 180^\circ$  فأوجد  $\sin(180^\circ - \theta)$  و  $\cos(360^\circ - \theta)$ .

## اختبارات عامة

### (الهندسة)



### الاختبار الثالث

**السؤال الأول:** أكمل ما يأتي

١ المضلعان المشابهان ثالث يكونان

٢ في الشكل المقابل :

أولاً:  $(ab)^2 = a^2 \times$  ،  $(gb)^2 = g \times a^2$

ثانياً:  $a^2 \times g =$

ثالثاً:  $a^2 \times b = g \times$

**السؤال الثاني:** أختير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة :

١ مستطيلان متشابهان الأول طوله ٥ سم والثاني طوله ١٠ سم، فإن النسبة بين محيط الأول إلى محيط الثاني يساوى:


١:٢ ٥

٢:١ ٢


٣:١ ٣

٥:١ ١


٢ أي من المثلثين الآتيين متشابهين؟




٤ (٤)



٣ (٣)



٢ (٢)



١ (١)

٤ (٤)، (٣) ٥

٣ (١)، (٢) ٦

٢ (٤)، (٢) ٧

١ (١)، (٤) ٨

إذا كانت النسبة بين محيطي مثلثين متشابهين ١ : ٤ فإن النسبة بين مساحتي سطحيهما تساوى

١٦:١ ٩

٨:١ ٩



٤:١ ١

٢:١ ١

٤ في الشكل المقابل: كل التعبيرات الرياضية التالية صحيحة ماعدا العبارة :

أ  $(ab)^2 = a^2 \times ab$       ب  $(ab)^2 = a^2 \times a$

ج  $ab \times a = ah \times a$       د  $ab \times bc = ah \times hc$



**السؤال الثالث :**

١ في الشكل المقابل:  $\triangle AHD \sim \triangle JBG$  أثبت أن:  $jh // bg$

وإذا كان:  $ah = 4$  سم،  $hd = 2$  سم،  $jh = 1.5$  سم،  $bg = 5$  سم.


أوجد طول كل من  $ah$  ،  $jh$

ب  $ab \times bc \times jh$  حيث  $jh = 5$  سم،  $bc = 3$  سم،  $jh = 2$  سم،  $ab = 4$  سم.

أثبت أن  $\triangle AHD \sim \triangle JBG$  ، ثم أوجد النسبة بين مساحتي سطحيهما

## اختبارات عامة

**السؤال الرابع :**




أ) في الشكل المقابل:  $\text{و}(\triangle \text{أـه}) = \text{و}(\triangle \text{جـ})$

أـه = 4 سم ، أـه = 5 سم ، كـه = 6 سم ، كـج = 3 سم  
أوجد طول كل من: كـب ، بـج


بـ جـ بـ جـ وـ هـ = (أ)

أـب = 3 سم ، بـ جـ = 2 سم ، أو = 7,5 سم  
أوجد طول هـ



**السؤال الخامس :**

أ) أـم متوسط في المثلث أـبـجـ ، نصفت  $\triangle \text{أـبـ}$  بمنصف قطع  $\overline{\text{أـبـ}}$  في هـ ، نصفت  $\triangle \text{أـجـ}$  بمنصف قطع  $\overline{\text{أـجـ}}$  في وـ ، رسم هـ وـ ، أثبت أن هـ وـ // بـ جـ



بـ في الشكل المقابل:

أـبـ // هـ وـ ، أـهـ = 8 سم ، جـهـ = 12 سم ، جـوـ = 9 سم ،

بـ مـ = 4 سم ، كـ مـ = 6 سم

أولاً: أوجد طول بـ وـ


ثانياً: أثبت أن: وـ مـ // جـ

**(الهندسة)**

## الاختبار الرابع

**السؤال الأول : أكمل ما يأتي**

أى مضلعين منتظمين لهما نفس عدد الأضلاع يكونان



**فـي الشـكـلـ الـمـقـابـلـ :**

إذا كان المثلث  $\triangle \text{أـهـ} \sim \triangle \text{جـبـ}$





فـإن  $\text{و}(\triangle \text{أـهـ}) = \text{و}(\triangle \text{جـبـ})$

إذا تقاطع المستقيمان الحاويان للوترين هـ وـ ، سـ صـ في نقطة رـ فإن: رـ دـ . رـ هـ =

**فـي الشـكـلـ الـمـقـابـلـ :** إذا كان أـ جـ = 3 سم ، جـهـ = 9 سم فإن أـبـ =

**السؤال الثاني : أختـرـ الإـجـاـبـةـ الصـحـيـحـةـ مـنـ بـيـنـ الـإـجـاـبـاتـ الـمـعـطـاـةـ :**

أى من المضلعين الآتيين متشابهين؟




## اختبارات عامة

١ المضلعلان (١) ، (٢)      ب المضلعلان (١) ، (٣)      ج المضلعلان (٢) ، (٤)


إذا كانت النسبة بين مساحتى سطحى مضلعين متشابهين ١٦ : ٢٥ فإن النسبة بين طولى ضلعين متتاظرين

فيهما تساوى:      ١ ٥ : ٢      ٢ ٢٥ : ١٦      ٣ ٥ : ٤      ٤ ٤١ : ١٦




٢ في الشكل المقابل: جميع التعبيرات الرياضية التالية صحيحة ماعدا التعبير:

$$\begin{array}{l} \text{أ } \frac{ا_١}{ا_٢} = \frac{اه}{هـ} \\ \text{ب } \frac{ا_١}{ا_٢} = \frac{بـ}{بـ جـ} \\ \text{ج } \frac{ا_١}{ا_٢} = \frac{اهـ}{هـ جـ} \\ \text{د } \frac{ا_١}{ا_٢} = \frac{اجـ}{بـ هـ} \end{array}$$



٣ في الشكل المقابل: طول  $\overrightarrow{مـ}$  مع تساوى:

أ ٣.٦ سم      ب ٤.٢ سم      ج ٤ سم



السؤال الثالث:

١ في الشكل المقابل:  $\triangle ABD \sim \triangle ACE$

أثبت أن الشكل بـ جـ هـ رباعي دائري وإذا كان  $A_١ = 3$  سم ،


$B_٢ = 2$  سم ،  $A_٣ = 2.5$  سم . أوجد طول  $هـ جـ$ .

٢ في الشكل رباعي تقاطع قطراته في هـ . رسم  $هـ$  هو  $\parallel \overrightarrow{جــ}$  ويقطع  $\overrightarrow{AـBـ}$  في و  
رسم  $هـ$   $\parallel \overrightarrow{جــ}$  ويقطع  $\overrightarrow{AـEـ}$  في مـ . أثبت أن  $وـ$   $\parallel \overrightarrow{BـEـ}$  .

السؤال الرابع:

١ في الشكل المقابل:  $\angle BAC = 90^\circ$  ،  $A_١ \perp Bـ$  ،  $A_٢ = 5$  سم ،  $Bـ$   $\perp$  جـ ،  $A_٣ = 6$  سم . أوجد طول كل من  $Bـ$  ،  $هـ$  ،  $A_٤$  .

٢ في الشكل رباعي فيه  $Bـ جـ = 27$  سم ،  $A_١ بـ = 12$  سم ،  $A_٢ دـ = 8$  سم ،  $هـ جـ = 12$  سم ،  
 $A_٣ دـ = 18$  سم ، أثبت أن  $\triangle BـAC \sim \triangle DـBC$  .



السؤال الخامس:

١ في الشكل المقابل:  $AB$  مماس للدائرة ، جـ منتصف  $AـDـ$   
 $A_١ Bـ = 363$  أوجد طول  $AـDـ$

٢ في الشكل مثلث فيه  $A_١ Bـ = 8$  سم ،  $A_٢ دـ = 12$  سم ،  $Bـ جـ = 15$  سم ،  $A_٣ \overleftarrow{DـCـ}$  ينصف  $\triangle AـBـCـ$  ويقطع  
 $Bـ جـ$  في دـ ، ثم رسم  $هـ$   $\parallel \overrightarrow{BـAـ}$  ويقطع  $A_٣ دـ$  في هـ ، أوجد طول كل من  $Bـ$  ،  $هـ$  ،  $جـ$  .

٨٢ × ٥٧	المقاس
١٧٢ صفحه	عدد الصفحات بالغلاف
٧٠ جرام	ورق المتن
كوشيه ١٨٠ جم	ورق الغلاف
٤ لیون	ألوان المتن
٤ لیون	ألوان الغلاف
٤١٢/١٠/٣/١١/١/٣٠	رقم الكتب

<http://elearning.moe.gov.eg>

