

القسم الأدبي

الرياضيات

العامة

الصف الثاني الثانوي

كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

تأليف

أ/ كمال يونس كبشة

أ/ سيرافيم إلياس إسكندر

أ.د/ عفاف أبو الفتاح صالح

أ/ أسامة جابر عبد الحافظ

أ/ مجدى عبد الفتاح الصفتى

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يسعدنا ونحن نقدم هذا الكتاب أن نوضح الفلسفة التي تم في ضوئها بناء المادة التعليمية ونوجزها فيما يلى:

- ١ تتنمية وحدة المعرفة وتكاملها في الرياضيات، ودمج المفاهيم والترابط بين كل مجالات الرياضيات المدرسية.
- ٢ تزويد المتعلم بما هو وظيفي من معلومات ومفاهيم وخطط لحل المشكلات.
- ٣ تتبّع مدخل المعايير القومية للتعليم في مصر والمستويات التعليمية وذلك من خلال:
 - (أ) تحديد ما ينبغي على المتعلم أن يتعلمه ولماذا يتعلمه.
 - (ب) تحديد مخرجات التعلم بدقة، وقد ركزت على ما يلى:

أن يظل تعلم الرياضيات هدف يسعى المتعلم لتحقيقه طوال حياته - أن يكون المتعلم محباً للرياضيات ومبادرًا بدراستها - أن يكون المتعلم قادرًا على العمل منفرداً أو ضمن فريق - أن يكون المتعلم نشطاً ومثابراً ومواطباً ومتकراً - أن يكون المتعلم قادرًا على التواصل بلغة الرياضيات.
- ٤ اقتراح أساليب وطرق للتدريس وذلك من خلال كتاب (دليل المعلم).
- ٥ اقتراح أنشطة متنوعة تتناسب مع المحتوى ليختار المتعلم النشاط الملائم له.
- ٦ احترام الرياضيات واحترام المساهمات الإنسانية منها على مستوى العالم والأمة والوطن، وتعرف مساهمات وإنجازات العلماء المسلمين والعرب والأجانب.

وفي ضوء ما سبق روعى في هذا الكتاب ما يلى:

- ★ يتضمن الكتاب ثلاثة مجالات هي: الجبر وال العلاقات والدواو، الحُسْبَان (التفاضل والتكامل)، حساب المثلثات، وتم تقسيم الكتاب إلى وحدات متكاملة ومتراقبة لكل منها مقدمة توضح مخرجات التعلم المستهدفة وخطط تنظيمي لها والمصطلحات الواردة بها باللغة العربية والإنجليزية، ومقسمة إلى دروس يوضح الهدف من تدريسيها للطالب تحت عنوان سوف تتعلم، ويببدأ كل درس من دروس كل وحدة بالفكرة الأساسية لمحنتي الدرس وروعى عرض المادة العلمية من السهل إلى الصعب ويتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتناول الرابط بالمواد الأخرى والحياة العملية والتي تتناسب القدرات المختلفة للطلاب وتراعي الفروق الفردية من خلال بند اكتشاف الخطأ لمعالجة بعض الأخطاء الشائعة لدى الطلاب وتوكل على العمل التعاوني، وتكامل مع الموضوع كما يتضمن الكتاب بعض القضايا المرتبطة بالبيئة المحيطة وكيفية معالجتها.
- ★ كما قدم في كل درس أمثلة تبدأ من السهل إلى الصعب، وتشمل مستويات تفكير متنوعة، مع تدريبات عليها تحت عنوان حاول أن تحل وينتهي كل درس ببند «تمارين» وتشمل مسائل متنوعة تتناول المفاهيم والمهارات التي درسها الطالب في الدرس.
- ★ تنتهي كل وحدة بملخص للوحدة يتناول المفاهيم والتعليمات الواردة بالوحدة وتمارين عامة تشمل مسائل متنوعة على المفاهيم والمهارات التي درسها الطالب في هذه الوحدة.
- ★ تُختتم وحدات الكتاب باختبار تراكمي يقيس بعض المهارات الازمة لتحقيق مخرجات تعلم الوحدة.
- ★ ينتهي الكتاب بإختبارات عامة تشمل بعض المفاهيم والمهارات التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي.

وأخيراً .. تتعنى أن تكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل لها فيه خير لأولادنا، ولمصرنا العزيزة.

وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَدْدَمِ، وَهُوَ يَهْدِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ

المحتويات

الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المحننات

الدوال الحقيقية

اطرق الدوال

الدوال الخطيّة والدوال زناعيّة

شال المثلثي للدوال والتحولات الهندسيّة

معادلات ومتباينات القيمة المطلقة

ملخص الوحدة

اختبار تراكمي

الوحدة الثانية: الأسس واللوغاريتمات وتطبيقات عليها

الأسس الكسرية

الدالة الأسية وتطبيقاتها

حل المعادلات الأسيّة

الدالة اللوغاريتميّة وتطبيقاتها البيئيّة

بعض خواص وتطبيقات

ملخص الوحدة

اختبار تراكمي

المحتويات

الوحدة الثالثة: النهايات

مقدمة في النهايات

إيجاد نهائية الدالة جبرياً

نهاية الدالة عند اللانهاية

ملخص الوحدة

اختبار تراكمي

الوحدة الرابعة: حساب المثلثات

١ - ٤ قانون (قاعدية) الجيب

٢ - ٤ قانون (قاعدية) جيب التمام

ملخص الوحدة

اختبار تراكمي

اختبارات عامة

اختبارات عامة

الوحدة الأولى

الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

Real Functions and Drawing Curves

مقدمة الوحدة

للدوال أنواع مختلفة وتطبيقات هامة في مختلف مجالات الحياة، في علم الفلك والطب والاقتصاد، وعلم الزلازل والجيولوجيا والديموغرافيا ، فنستخدم الدوال في احتساب متغيرات الطقس والتنبؤ بالطقس المتوقع لفترة مقبلة، أو تحديد موضع خلل في عمل القلب باستخدام الرسوم البيانية التي يسلحها رسام القلب الكهربائي، أو تحقيق أفضل ربح بدراسة دالة الربح والتكليف، أو تأثير فئات العمر على تعداد السكان . كما تستخدم أيضاً في الطب الرياضي لتحديد الوزن الأمثل [الوزن = الطول (سم) - ١٠٠] أو قياس نسبة الدهون في الجسم ، ويكثر استخدامها في الصناعة لدراسة تأثير المتغيرات المختلفة على جودة المنتج.

ويعد ليوناردو أويلر Leonhard Euler (١٧٠٧ - ١٧٨٣ م) السويسري الأصل من أبرز علماء القرن الثامن عشر في الرياضيات والفيزياء، وينسب له استخدام الرمز $y=f(x)$ أو $y=d(s)$ للدلالة على الدالة معتبراً أن الدالة ارتباط بين عناصر مجموعتين بعلاقة تسمح بحساب قيمة متغير تابع ص لآخر مستقل س ، كما حول جميع النسب المثلثية التي نوه بها المصريون القدماء والبابليون وبرع فيها العرب إلى دوال مثلثية. في هذه الوحدة ستتعرف صوراً مختلفة من الدوال الحقيقية وسلوكها وتمثيلها بيانياً مستخدماً التحويلات الهندسية والبرامج الرسومية واستخدام الدوال الحقيقية في حل مشكلات رياضية وحياتية في مجالات مختلفة.

مخرجات تعلم الوحدة

بعد دراسة هذه الوحدة ، وتنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن:

- ❖ يستخدم الدوال الحقيقية في حل مشكلات رياضية وحياتية في مجالات مختلفة.
- ❖ يربط بين ما درسه من تأثير التحويلات السابقة على الدوال المثلثية في صورة نشاط.
- ❖ يبحث عن التمثيل البياني للدوال الحقيقة السابقة دراستها، وتأثير التحويلات السابقة باستخدام برنامج الجيوجيريا "geogebra" كنشاط وعمل جماعي.
- ❖ يستنتج تأثير كل من التحويلات: $(s \pm b)$ ، $a(s \pm b)$ على الدوال السابقة.
- ❖ يحدد مجال الدوال الحقيقة، والمجال المقابل والمدى لها.
- ❖ يستنتج إطراد الدوال الحقيقة (تضييد الدوال - تناقص الدوال - ثبوت الدوال).
- ❖ يطبق التحويلات السابقة على رسم منحنيات الدوال الحقيقة.
- ❖ يحل معادلات على الصورة: $|as + b| = j$ ، $|as + b| = |a|s + |b|$ أو فردية $as + b = j$.
- ❖ يتحقق من مطالبات على الصورة: $|as + b| > j$ ، $|as + b| \geq j$ ، $|as + b| < j$ ، $|as + b| \leq j$.
- ❖ يعرف الدوال كثيرات الحدود.
- ❖ يرسم منحنيات الدوال [الدالة التربيعية - دالة المقياس - الدالة التكعيبية - الدالة الكسرية] ويسنتج خواص كل منها.

المصطلحات الأساسية

Rational Function	دالة كسرية	\Leftrightarrow	Odd Function	دالة فردية	\Leftrightarrow	Real Function	دالة حقيقية
Asymptote	خط تقارب	\Leftrightarrow	Monotony of a Function	إطراد دالة	\Leftrightarrow	Domain	مجال
Transformation	تحويل	\Leftrightarrow	Increasing Function	دالة تزايدية	\Leftrightarrow	Co-domain	مجال مقابل
Translation	إزاحة (انتقال)	\Leftrightarrow	Decreasing Function	دالة تناظرية	\Leftrightarrow	Range	مدى
Reflection	انعكاس	\Leftrightarrow	Constant Function	دالة ثابتة	\Leftrightarrow	Vertical Line	خط رأسي
Stretching	تمدد	\Leftrightarrow	polynomial Function	دالة كثيرة الحدود	\Leftrightarrow		دالة متعددة التعريف
Graphical Solution	حل بياني	\Leftrightarrow	Absolute Value Function	دالة مقاييس (قيمة مطلقة)	\Leftrightarrow	Piecewise-Defined Function	دالة زوجية
						Even Function	

مخطط تنظيمي للوحدة

دروس الوحدة

الدرس (١ - ١): الدوال الحقيقية.

الدرس (١ - ٢): اطراد الدوال.

الدرس (١ - ٣): الدوال الزوجية و الدوال الفردية.

الدرس (١ - ٤): التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية.

الدرس (١ - ٥): حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة.

الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات



الأدوات والوسائل


آلية حاسبة رسومية - حاسب آلي مزود ببرامجه رسومية
(Graph, GeoGebra)

Real Functions

استكشف

سبق أن درست مفهوم الدالة، وعلمت بأنها علاقة بين مجموعتين غير خاليتين سـ، صـ بحيث تحدد لكل عنصر من عناصر سـ عنصراً وحيداً من عناصر صـ ويرمز للدالة بأحد الرموز: دـ أو فـ أو رـ أو إذا رمزنا لدالة ما من المجموعة سـ إلى المجموعة صـ بالرمز دـ فإنها تكتب رياضياً:

$\text{د: س} \rightarrow \text{ص}$ وقرأ د دالة من س إلى ص ويلاحظ:



١- لكل عنصر س \in سـ يتعين عنصر وحيد

صـ \in صـ بقاعدة الدالة دـ وتكتب:

$$\text{ص} = \text{د}(\text{s})$$

٢- تسمى المجموعة سـ مجال الدالة ، وتسمى المجموعة صـ المجال المقابل للدالة.

٣- تسمى المجموعة {صـ = دـ(سـ): سـ \in سـ} مدى الدالة وتعرف بمجموعة صور عناصر مجال الدالة.

سوق تتعلم

- مفهوم الدالة الحقيقة.
- اختبار الخط الرأسى.
- الدالة متعددة التعريف (المعرفة بأكثر من قاعدة).
- تحديد مجال ومدى الدالة الحقيقة.
- العمليات على الدوال.


المصطلحات الأساسية

Function	دالة
Domain	مجال
Co-domain	مجال مقابل
Range	مدى
Arrow Diagram	خطط سهمي
Cartesian Diagram	خطط بيانى
Vertical line	خطرأُسى
Piecewise Function	دالة متعددة التعريف
	قاعدة الدالة

Real Function

الدالة الحقيقة

تسمى الدالة دالة حقيقة إذا كان كل من مجالها ومجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقة أو مجموعة جزئية منها.



مثال


١- العلاقة من المجموعة سـ إلى المجموعة صـ الممثلة في المخطط السهمي المجاور تمثل دالة، حيث:
المجموعة سـ هي مجال الدالة = {٤، ٣، ٢، ١}
والمجموعة صـ المجال المقابل للدالة = {٩، ٨، ٧، ٥، ٦}
أما مجموعة العناصر {٦، ٨، ٩} فتعرف بمدى الدالة.

حاول أن تحل

١- أي من العلاقات المبينة بالمخططات السهمية الآتية تمثل دالة وأيها لا تمثل دالة، ثم اكتب المجال والمدى في حال كونها دالة.

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسب.




التمثيل البياني للدوال

إذا كانت $D : S \rightarrow T$ فإن مجموعة الأزواج المرتبة التي تحقق قاعدة الدالة تسمى بيان الدالة أى أن:

$$\text{بيان } D = \{(s, t) : s \in S, t \in T\}$$

وبتمثيل هذه الأزواج المرتبة في المستوى الديكارتي نرسم الشكل البياني للدالة أو منحنى الدالة في مثال (١): بيان $D = \{(1, 6), (2, 3), (3, 8), (4, 6)\}$.



لاحظ أن:


١- الشكل البياني للدالة هو مجموعة من النقط المنفصلة.

٢- الخط الرأسي المار عند كل عنصر من عناصر مجال الدالة يقطع تمثيلها البياني في نقطة وحيدة.



اختبار الخط الرأسي

إذا وجد أن الخط الرأسي عند كل عنصر من عناصر المجال يمر بنقطة واحدة فقط من النقط التي تمثل العلاقة؛ كانت العلاقة دالة من $S \rightarrow T$




Identify the relations representing the function


تحديد العلاقات التي تمثل دالة




٢ في كل شكل من الأشكال الآتية بين ما إذا كانت ص تمثل دالة في س أم لا.




شكل (٤)



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)



شكل (١) يمثل دالة في س


شكل (٢) لا يمثل دالة في S لأن الخط الرأسي المار بالنقطة $(1, 0)$ يقطع الشكل البياني في عدد غير منته من النقاط.

شكل (٣) يمثل دالة في S .


شكل (٤) لا يمثل دالة في S لأن يوجد خط رأسي يقطع المحنن في أكثر من نقطة.

حاول أن تحل


٢) بين أي الأشكال الآتية تمثل دالة من $S \rightarrow S$ مع ذكر السبب.




شكل (٤)



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)

مثال

١) تعين مدى الدالة بيانيًا

إذا كانت $d: [1, 5] \rightarrow S$ حيث $d(s) = s + 1$

ارسم الشكل البياني للدالة d ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.

ب) إذا كانت $r: [1, 5] \rightarrow S$ حيث $r(s) = s + 1$

ارسم الشكل البياني للدالة r ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.



الحل

أ) الدالة d دالة خطية مجالها $[1, 5]$ تمثل بيانيًّا بقطعة مستقيمة طرفاها

ال نقطتين $(1, 6)$ ، $(5, 6)$ أي النقطتين $(1, 6)$ ، $(5, 6)$.

مدى الدالة $d = [6, 2]$

وهو مجموعة الإحداثيات الصادبة لجميع النقط التي تنتمي إلى
محنن الدالة.



ب) الدالة r دالة خطية مجالها $[1, 5]$ واضح أن $r(s) = d(s)$

لكل $s \in [1, 5]$ فتمثل بيانيًّا بقطعة مستقيمة إحدى طرفيها النقطة $(1, 2)$ مع استبعاد النقطة الأخرى $(5, 6)$ من الشكل البياني بوضع دائرة مفرغة عند هذه النقطة.

مدى الدالة $r = [6, 2]$

حاول أن تحل

- أ** إذا كانت $d: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ، حيث $d(s) = 1 - s$ ارسم الشكل البياني للدالة d ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.
- ب** إذا كانت $r: [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ، حيث $r(s) = 1 - s$ ارسم الشكل البياني للدالة r ، واستنتج من الرسم مدى الدالة.

*Piecewise-Defined Functions***الدالة متعددة التعريف:**

السعر بالقروش	الاستهلاك الشهري (متر مكعب)
٤٠	٢٥ حتى
١٠٠	أكثر ٢٥ حتى ٥٠
١٥٠	أكثر من ٥٠

عمل تعاوني

لتشديد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز يتم حساب قيمة الاستهلاك الشهري منها تبعاً لشرائح خاصة تربط كمية الاستهلاك بقيمتها.

يبين الجدول المقابل أسعار شرائح الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي في المنازل بالقروش. احسب مع زميل قيمة استهلاك منزل من الغاز الطبيعي بالقروش للكميات التالية:
١ - ٣٠ متر مكعب شهرياً. **٢** - ٦٠ متر مكعب شهرياً.

[تضاف قيمة الضرائب المستحقة ورسوم تشغيل الخدمة بعد حساب قيمة الاستهلاك الشهري]

اللحوظة: يمكن كتابة دالة d لحساب قيمة استهلاك s مترًا مكعبًا من الغاز شهرياً حيث $s \in \mathbb{R}$ على النحو التالي:

$$d(s) = \begin{cases} 40 & \text{عندما } s \geq 25 \\ 100 & \text{عندما } 25 > s \geq 0 \\ 150 & \text{عندما } s < 0 \end{cases}$$

وهي دالة حقيقة متعددة التعريف (معرفة بأكثر من قاعدة)

تعلم

الدالة متعددة التعريف، هي دالة حقيقة يكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة.

حاول أن تحل

- ٤** تحقق باستخدام الدالة السابقة من صحة إجابتكم في عمل تعاوني، ثم احسب قيمة الاستهلاك الشهري من الغاز للكميات التالية:

- ج** ٥٤ مترًا مكعبًا **ب** ٤٠ مترًا مكعبًا **أ** ١٥ مترًا مكعبًا

رسم الدالة متعددة التعريف:**مثال**

$$\text{إذا كانت } d(s) = \begin{cases} 3-s & \text{عندما } s > 2 \\ s & \text{عندما } 2 \geq s \geq 0 \end{cases}$$

عين مجال الدالة d ومثلها بيانياً واستنتاج من الرسم المدى.

الحل


الدالة d معرفة على فترتين وتعين $d(s)$ بواسطة قاعدتين:

القاعدة الأولى: $d(s) = 3 - s$ عندما $s > 2$ أي على الفترة $[2, \infty)$

وهي دالة خطية تمثل بقطعة مستقيمة طرفاها نقطتين

($1, 2$)، ($2, 5$)، ($2, 1$) مع وضع دائرة مفرغة عند النقطة $(1, 2)$

لأن $\exists s \in [2, \infty)$ كما في الشكل المقابل.




القاعدة الثانية: $d(s) = s$ عندما $s \leq 2$ أي على الفترة $(-\infty, 2]$

وهي دالة خطية تمثل بقطعة مستقيمة طرفاها نقطتين $(2, 2)$ ، $(2, 5)$

ويكون مجال الدالة $d = [-\infty, 2] \cup [2, \infty)$

لاحظ أن



في الشكل البياني الممثل للدالة d

مجال الدالة = $[0, 2]$

مدى الدالة = $[2, 5]$

ويمكن من الرسم البياني نستنتج أن:

مجال الدالة $d = [0, 2]$

مدى الدالة $d = [2, 5]$


حاول أن تحل ٤

إذا كانت $d(s) = \begin{cases} s - 1 & \text{عندما } s > 2 \\ s + 1 & \text{عندما } s \leq 0 \end{cases}$


عين مجال الدالة ومثلها بيانياً واستنتاج من الرسم المدى.

٥ في كل من الأشكال البيانية التالية استنتاج مجال ومدى الدالة.


ب




أ



د



ج



تحديد مجال الدوال الحقيقية والعمليات عليها

Determining the Domain of the Real Functions and Operations on it

يتحدد مجال الدالة من قاعدة تعریفها أو الشكل البياني لها.

تذکر أن



مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقة ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها.

Determining Domains

تعيين مجال الدالة

مثال

٥ حدد مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$\text{ب } D_1(s) = \frac{s+3}{s-9} \quad \text{أ } D_1(s) = \frac{s}{s^2-9}$$

$$\text{ج } D_2(s) = \sqrt[3]{s-5} \quad \text{د } D_2(s) = \frac{1}{s-3\sqrt[3]{s}}$$

الحل

أ الدالة D_1 تكون غير معرفة عندما يكون المقام $= 0$ لذلك نضع $s^2 - 9 = 0$ أي $s = \pm 3$ وعليه يكون مجال الدالة D_1 هو $U \setminus \{-3, 3\}$.



ب مجال الدالة D_2 هو جميع قيم s التي تجعل قيمة ما بداخل الجذر التربيعي موجباً أو صفراء، أي قيم s التي تجعل $s - 3 \leq 0$.
 $\therefore s - 3 \leq 0 \quad \therefore s \leq 3 \quad \therefore \text{مجال } D_2 = [3, \infty)$

ج $D_3(s) = \sqrt[3]{s-5}$ ، دليل الجذر عدد فردی مجال $D_3 = U$



د تكون D_4 معرفة عندما يكون $s-3 < 0$.
وعليه فإن مجال D_4 هو $U \setminus (-\infty, 3)$

اللحوظة:

إذا كانت $D(s) = \sqrt[n]{R(s)}$ حيث $n \in \mathbb{N}^+$ ، $n > 1$ ، $R(s)$ كثيرة حدود

أولاً: عندما ن عدد فردی فإن مجال الدالة $D = U$

ثانياً: عندما ن عدد زوجي فإن: مجال الدالة D هو مجموعة قيم s بشرط $R(s) \leq 0$.

حاول أن تحل

٧ حدد مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$\text{ب } D_4(s) = \sqrt[4]{s-2} \quad \text{أ } D_4(s) = \frac{s^2+2}{s^2-3s+2}$$

$$\text{ج } D_5(s) = \sqrt[3]{s-5} \quad \text{د } D_5(s) = \frac{s^5}{s^4+s^2}$$

تفکیر ناقد:

إذا كان مجال الدالة D حيث $D(s) = \frac{2}{s^2-6s+k}$ هو $U \setminus \{3\}$ أوجد قيمة k .

نشاط



Operations on Functions

العمليات على الدوال

إذا كانت d_1 ، d_2 دالتين مجالا هما M_1 ، M_2 على الترتيب ، فإن:

$$1 \quad (d_1 \pm d_2)(x) = d_1(x) \pm d_2(x) \quad \text{مجال } (d_1 \pm d_2) \text{ هو } M_1 \cap M_2$$

$$2 \quad (d_1 \cdot d_2)(x) = d_1(x) \cdot d_2(x) \quad \text{مجال } (d_1 \cdot d_2) \text{ هو } M_1 \cap M_2$$

$$3 \quad \left(\frac{d_1}{d_2}\right)(x) = \frac{d_1(x)}{d_2(x)} \quad \text{حيث } d_2(x) \neq 0. \quad \text{مجال } \left(\frac{d_1}{d_2}\right) \text{ هو } M_1 \cap M_2 - \{x \mid d_2(x) = 0\}$$

حيث $f(d)$ مجموعة أصفار d

نلاحظ أنه في جميع الحالات السابقة ، مجال الدالة الجديدة يساوى تقاطع مجالي d_1 ، d_2 باستثناء القيم التي تجعل $d_2(x) = 0$ في عملية القسمة.

إذا كان $d_1 : x \mapsto f(x) = 3$ حيث $d_1(x) = 3$ - 1

$d_2 : x \in [2, 3] \mapsto g(x) = x - 2$

أولاً: أوجد قاعدة ومجال كل من الدوال الآتية:

$$5 \quad (d_1 + d_2) \quad 6 \quad (d_1 \cdot d_2) \quad 7 \quad (d_1 - d_2) \quad 8 \quad (d_1 + d_2) \quad 9 \quad (d_1 \cdot d_2) \quad 10 \quad (d_1 - d_2)$$

ثانياً: احسب القيمة العددية - إن امكن ذلك - لكل من:





$$11 \quad (d_1 + d_2)(2) \quad 12 \quad (d_1 - d_2)(3) \quad 13 \quad (d_1 \cdot d_2)(4) \quad 14 \quad (d_1 - d_2)(1)$$

$$15 \quad (d_1 + d_2)(1) \quad 16 \quad (d_1 \cdot d_2)(2) \quad 17 \quad (d_1 - d_2)(3) \quad 18 \quad (d_1 + d_2)(4)$$


تمارين 1 - 1

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


أ) من المخططات الآتية تمثل دالة من S إلى C :




٢ أي من الأشكال البيانية الآتية لا تمثل دالة في س :




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٣ العلاقة المبينة بمجموعة الأزواج المرتبة والتي لا تمثل دالة هي:

$$\{(5, 3), (3, 2), (1, 2), (5, 5), (7, 5), (3, 4)\} \quad \text{ب}$$

$$\{(5, 2), (5, 0), (5, -1), (5, 3), (5, 0)\} \quad \text{د}$$

$$\{(1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 9)\} \quad \text{أ}$$

$$\{(3, 3), (3, 2), (3, 1), (3, 0)\} \quad \text{ج}$$

أجب عن ممایتی:

٤ إذا كانت $d: s \rightarrow y$ وكان $s = \{-3, -2, -1\}$


أوجد مدى الدالة إذا كان $d(s) = s^5 - 3$

٥ إذا كانت $r: \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow s$ حيث $r(s) = s^4 - 3$

أكتب مدى الدالة إذا كانت $r(k) = 17$ فإأوجد قيمة k

أ


٦ استنتج من الشكل البياني مجال الدالة ومداها في كل ممايأته:




٥



ج



ب



أ

٧ حدد مجال الدالة d حيث $d(s) = \begin{cases} s-1 & \text{عندما } s > 2 \\ 1-s & \text{عندما } s \leq 2 \end{cases}$

ثم ارسم الشكل البياني للدالة ، ومن الرسم استنتاج مدى الدالة.

ومن الرسم استنتاج مدى الدالة.

٨ ارسم الشكل البياني للدالة d حيث:

$$d(s) = \begin{cases} s^3 + 3 & \text{عندما } s \leq 2 \\ s^2 - 1 & \text{عندما } s > 2 \end{cases}$$

٩ إذا كانت $d(s) = \begin{cases} s^2 - 3 & \text{عندما } s > 0 \\ 1-s & \text{عندما } s \leq 0 \end{cases}$

ارسم الشكل البياني للدالة d ، ومن الرسم استنتاج مدى الدالة

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{إذا كانت } d(s) = s^3 - 3s > 0 \\ \text{عندما } s \geq 3 \\ \text{عندما } s \leq -3 \end{array} \right.$$

١٠

رسم الشكل البياني للدالة d ، ومن الرسم استنتج مدى الدالة

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{إذا كان: } d(s) = s^3 - 3s < 0 \\ \text{عندما } s < -3 \\ \text{عندما } 3 > s > 0 \\ \text{عندما } s > 3 \end{array} \right.$$

١١

أوجد:

ج) $d(10)$

ب) $d(3)$

أ) $d(2)$

الربط بالتجارة: تمثل الدالة d ، حيث:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{عندما } s \geq 5000 \\ d(s) = \frac{3}{2}s + 10000 \\ \text{عندما } 5000 > s > 2500 \\ d(s) = 2500 + \frac{3}{2}s \\ \text{عندما } s < 2500 \end{array} \right.$$

١٢

المبلغ بالجنيه الذى تتلقاه شركة لتوزيع أحد الأجهزة الكهربائية، حيث s تمثل عدد الأجهزة الموزعة، أوجد:

ج) $d(5000)$

ب) $d(10000)$

أ) $d(5000)$

الربط بالهندسة: إذا كان h محيط مربع طول ضلعه L . اكتب محيط المربع كدالة فى طول ضلعه h (ل)
ثم أوجد:

ب) $h(\frac{15}{4})$

أ) $h(3)$

الربط بالهندسة: إذا كانت M مساحة دائرة طول نصف قطرها r . اكتب المساحة كدالة فى طول نصف القطر
 M (نق) ثم أوجد $M(\frac{1}{2})$ ، $M(5)$.

١٥ عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية:

$$d(s) = \frac{s^3 + 1}{s^3 + 1}$$

ب)

$$d(s) = \frac{s^3 + 6}{s^3 - 5s}$$

أ)

$$d(s) = \sqrt[4]{s - 4}$$

د)


$$d(s) = \sqrt[4]{s - 2}$$

ج)

Monotonicity of Functions

سوف تتعلم

- اطراد الدوال.
- استخدام البرامج الرسومية مثل (Geogebra) في رسم منحني دالة.



المصطلحات الأساسية

- Monotony** اطراد.
- Increasing Function** دالة تزايدية.
- Decreasing Function** دالة تناظرية.
- Constant Function** دالة ثابتة.

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسوب.

فك و نقاش

يوضح الشكل البياني المقابل درجات الحرارة المسجلة بمدينة القاهرة في أحد الأيام ، لاحظ التغير في درجات الحرارة بالنسبة للزمن، ثم حدد من الرسم:


- فترات تناظر درجات الحرارة.
- فترات تزايد درجات الحرارة.
- فترات ثبات درجات الحرارة.

تساعدنا صفات منحنيات الدوال في معرفة سلوك الدالة و تحديد فترات تزايد أو تناظر أو ثبوت د(س) كلما زادت س وهو ما يعرف باطراد الدالة.

تعلم


تزايد الدالة:

يقال للدالة د أنها **تزايدية** في الفترة [أ، ب] إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [A, B]$ حيث $s_2 > s_1$ فإن: $D(s_2) > D(s_1)$




تناظر الدالة:


يقال للدالة د أنها **تناظرية** في الفترة [ج، د] إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [G, D]$ حيث $s_2 > s_1$ فإن: $D(s_2) < D(s_1)$



ثبوت الدالة:

يقال للدالة د أنها **ثابتة** في الفترة [ل، م] إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [L, M]$ حيث $s_2 > s_1$ فإن: $D(s_2) = D(s_1)$





مثال


ابحث اطراط الدالة الممثلة في الشكل البياني المقابل.

الحل

« الدالة تناقصية في الفترة $[0, \infty)$ »

« الدالة تزايدية في الفترة $[0, 2]$ »

« الدالة ثابتة في الفترة $[2, \infty)$ »



حاول أن تحل


في الشكل المقابل:

ابحث الفترات التي تكون فيها الدالة تزايدية، والفترات التي تكون فيها تناقصية، والفترات التي تكون فيها ثابتة.


مثال

يوضح كل شكل من الأشكال البيانية التالية منحنى الدالة $y = f(x)$ ، استناداً إلى الرسم مجال ومدى الدالة، وابحث اطراطها.


ج



ب



أ



الحل

أ مجال $D = \mathbb{R} = [-\infty, \infty]$ ، مدى $D = [-\infty, \infty]$ الدالة تزايدية في $[-\infty, \infty]$

ب مجال $D = [-\infty, \infty] = [2, \infty]$ ، الدالة تزايدية في $[-\infty, 2]$

الدالة تزايدية في $[-\infty, 2]$ ، تزايدية أيضاً في $[2, \infty]$ ، مدى الدالة = ع


ج مجال $D = [-\infty, 1] = [1, \infty]$ ، مدى $D = [-\infty, 4]$

الدالة ثابتة في $[-\infty, 1]$ ، وتناقصية في $[1, \infty]$


حاول أن تحل ٤

٢) في كل من الأشكال التالية استنتج مجال و مدى الدالة ثم ابحث اطراطها:


ج



ب



أ



استخدام البرامج الرسومية في دراسة خواص الدوال

تتعدد البرامج الرسومية لتمثيل الدوال بيانياً، ومن أشهرها برنامج GeoGebra المجاني للتابلت أو الحاسوب.

 نشاط

باستخدام برنامج GeoGebra مثل بيانياً الدالة د حيث: $d(s) = s^3 - 3s + 2$.
ومن الرسم أوجد مجال و مدى الدالة وابحث اطراطها.



شكل (١)

لتنفيذ النشاط اتبع الخطوات التالية:

١- افتح نافذة الجبر، والرسم البياني من برنامج (GeoGebra)

ثم إضغط  واختر  لتصل إلى النافذة المبينة في شكل (١).


٢- في النافذة الجبرية اكتب قاعدة الدالة:

$d(s) = s^3 - 3s + 2$ بمربع الادخال (input)


على النحو التالي:

إبدأ \rightarrow        

ثم اضغط  فيظهر في النافذة البيانية منحنى الدالة،
وفى النافذة الجبرية قاعدة الدالة كما في شكل (٢)



شكل (٢)



٣- لتحديد نقطة على منحني الدالة إختر

من شريط الأدوات ثم نقطة جديدة من القائمة المنسدلة، حرك المؤشر حتى تصل إلى موضع النقطة المراد تحديدها على المنحني، واضغط إدخال لتظهر النقطة على المنحني في النافذة الرسمية كما يظهر إحداثي النقطة في النافذة الجبرية كما في شكل (٢).


من الشكل البياني للدالة نجد:

أ مجال د = [-∞, ∞] ، مدى د = [-∞, ∞]

ب الدالة تزايدية في [-1, ∞] ، تناقصية في [-∞, -1] ، تزايدية في [1, ∞]





تطبيق

باستخدام برنامج Geogebra ارسم منحني الدالة د: د(س) = س³ - س² ومن الرسم ابحث اطراط الدالة




تمارين ١ - ٣

١- الأشكال الآتية تمثل الشكل البياني لبعض الدوال، استنتج من الرسم المدى وابحث الاطراد:




٢) حدد مجال كل من الدوال الممثلة بالأشكال الآتية، ثم اكتب مدى الدالة وابحث اطرادها.


ج




ب




أ




و



هـ



د



٣) إذا كانت د : [-٢, ٦] → ع

$$\left. \begin{array}{l} د(س) = 4 - س \quad \text{عندما } -٢ \leqslant س < ١ \\ د(س) = س \quad \text{عندما } ١ \leqslant س \leqslant ٦ \end{array} \right\}$$

رسم الشكل البياني للدالة د ، واستنتج من الرسم مدى الدالة وابحث اطرادها.

٤) باستخدام أحد البرامج الرسمية ؛ ارسم منحني الدالة د في كل من ما يأتى ، ومن الرسم استنتج مدى الدالة وابحث اطرادها.

ج) $d(s) = (s-1)^3 + 1$

ب) $d(s) = 4 - s^2$

أ) $d(s) = s^3 - 5$

و) $d(s) = \frac{s-2}{s-1}$

هـ) $d(s) = s^3 - 3s$

د) $d(s) = s^3$

الدوال الزوجية والدوال الفردية

Even and Odd Functions


قد يتميز الشكل البياني للدالة D حيث $ص = د(س)$ بصفات هندسية تلاحظ من الرسم بسهولة، ويمكن استخدامها في دراسة الدوال وتطبيقاتها، وأشهر هذه الصفات التماثل Symmetry حول محور الصادات أو التماثل حول نقطة الأصل.

سوف تتعلم

- ◀ التماثل في منحنيات الدوال.
- ◀ الدوال الزوجية.
- ◀ الدوال الفردية.


تمهيد

سبق أن درست التماثل حول مستقيم، حيث يمكن طي الشكل على المستقيم؛ لينطبق نصفاً المنحنى تماماً، ودرست كذلك التماثل حول نقطة الأصل:



التماثل حول نقطة الأصل.

شكل (٢)



التماثل حول محور الصادات

شكل (١)

المصطلحات الأساسية

- | | |
|---------------|--------------|
| Symmetry | ◀ تماثل |
| Even Function | ◀ دالة زوجية |
| Odd Function | ◀ دالة فردية |

في شكل (١):

تكون النقطة $(-س ، ص)$ الواقعة على الشكل البياني لمنحنى الدالة هي صورة النقطة $(س ، ص)$ الواقعة عليه أيضاً بالانعكاس حول محور الصادات.

في شكل (٢):




يوضح الشكل البياني للعلاقة بين $س$ ، $ص$ تماثل المنحنى حول نقطة الأصل، حيث إن النقطة $(-س ، -ص)$ هي صورة النقطة $(س ، ص)$ الواقعة على نفس المنحنى.

الأدوات المستخدمة

- ◀ آلة حاسبة علمية - برامج رسومية للحاسوب

حاول أن تحل ٥

١) في كل شكل من الأشكال الآتية بين المنحنيات المتماثلة حول محور الصادات والمنحنيات المتماثلة حول نقطة الأصل.

**تفكير ناقد:**

هل تتماثل منحنيات جميع الدوال حول محور الصادات أو حول نقطة الأصل فقط؟ فسر إجابتك.

Even and Odd Functions

الدوال الزوجية والدوال الفردية:



الدالة الزوجية: يقال للدالة $d: s \rightarrow c$ إنها دالة زوجية إذا كان $d(-s) = d(s)$ ، لـ كل $s, -s \in s$ ويكون منحني الدالة الزوجية متماثلاً حول محور الصادات.

الدالة الفردية: يقال للدالة $d: s \rightarrow c$ إنها دالة فردية إذا كان $d(-s) = -d(s)$ ، لـ كل $s, -s \in s$ ويكون منحني الدالة الفردية متماثلاً حول نقطة الأصل.

الاحظ: كثير من الدوال ليست زوجية وليست فردية عند بحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية يجب تتحقق شرط انتمام العنصرين $s, -s$ إلى مجال الدالة، وإذا لم يتحقق كانت الدالة ليست زوجية وليست فردية دون إيجاد $d(-s)$.



$$\text{ابحث نوع الدالة } d \text{ في كل مما يأتي من حيث كونها دالة زوجية أو فردية.}$$

أ) $d(s) = s^2$ ب) $d(s) = s^3$ ج) $d(s) = \sqrt[3]{s+3}$ د) $d(s) = \text{جتا } s$



أ) $d(s) = s^2$ ، مجال $d = \mathbb{U}$

\therefore لـ كل $s, -s \in \mathbb{U}$ ، يكون: $d(-s) = (-s)^2 = s^2$

\therefore د دالة زوجية

ب) $d(s) = s^3$ ، مجال $d = \mathbb{U}$

\therefore لـ كل $s, -s \in \mathbb{U}$ ، يكون: $d(-s) = (-s)^3 = -s^3$

\therefore د دالة فردية

أى أن: $d(-s) = -d(s)$

ملاحظة هامة:

تسمى الدالة $d: \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$ ، $d(s) = s^n$ حيث $n \neq 0$ ، $n \in \mathbb{N}$ دالة القوى، وتكون الدالة زوجية عندما عدد زوجي ، فردية عندما عدد فردي.

تنظر أن



- جا (-س) = - جاس
- جتا (-س) = جتس
- ظا (-س) = ظاس

ج) $d(s) = \sqrt[3]{s+3}$, مجال $d = [-\infty, 3]$

لحظ أن $\exists s \in [-4, \infty) \text{ بينما } d(s) \notin \mathbb{R}$

∴ الدالة d ليست زوجية وليست فردية.

د) $d(s) = \sqrt[3]{s^2 - 3}$

لكل $s \in \mathbb{R}$ يكون:

$d(-s) = \sqrt[3]{(-s)^2 - 3} = \sqrt[3]{s^2 - 3} = d(s)$

أى أن: $d(-s) = d(s)$ ∴ دالة زوجية

حاول أن تحل f

ابحث نوع الدالة d في كل مما يأتى من حيث كونها دالة زوجية أو فردية أو غير ذلك.

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| ج) $d(s) = s^3 + \sqrt[3]{s}$ | ب) $d(s) = s^2 - \sqrt[3]{s}$ | أ) $d(s) = \sqrt[3]{s^2 - 3}$ |
| و) $d(s) = s^3 - \sqrt[3]{s}$ | ه) $d(s) = s^2 - \sqrt[3]{s^2}$ | د) $d(s) = \sqrt[3]{s^2 + s}$ |
| ط) $d(s) = \sqrt[3]{s^2 + \sqrt[3]{s}}$ | ح) $d(s) = \sqrt[3]{s^2 + \sqrt[3]{s^2}}$ | ز) $d(s) = s^3 + s^2$ |
- ماذا تستنتج؟

خواص هامة:

إذا كان كل من: د، د، دالة زوجية، وكان كل من: ر، ر، دالة فردية، فإن:

(١) د، د، دالة زوجية \rightarrow د، دالة فردية.

(٢) د، د، دالة فردية \rightarrow د، دالة زوجية.




(٣) د، د، دالة زوجية \rightarrow د، دالة فردية.

(٤) د، د، دالة فردية \rightarrow د، دالة زوجية وليست فردية.

باستخدام الخواص السابقة،تحقق من صحة إجابتك في بند حاول أن تحل (٢)

مثال

٢ يوضح كل شكل من الأشكال البيانية التالية منحني الدالة d ، حدد من الرسم ما إذا كانت الدالة d زوجية أو فردية أو غير ذلك وحقق إجابتك جبرياً.



الحل

أ $d(s) = s^3 + s$ ، من الشكل البياني للدالة d نلاحظ أن:

مجال $d = \mathbb{U}$ ، ومنحنى الدالة متماثل حول نقطة الأصل ؛ أي أن الدالة فردية

$$\therefore d(-s) = (-s)^3 + (-s) \quad \therefore \text{كل } s, -s \in \mathbb{U}$$

$$d(-s) = -s^3 - s$$

$$d(-s) = - (s^3 + s)$$

$$d(-s) = -d(s)$$

بالتبسيط:

نأخذ (١) عاملًا مشتركًا

أي أن الدالة فردية.

ب $d(s) = 2 - s^2$ ، من الشكل البياني للدالة d نلاحظ أن

مجال $d = [-2, 2]$ ، ومنحنى الدالة متماثل بالنسبة لمحور الصادات؛ أي أن الدالة زوجية

$$\therefore d(-s) = 2 - (-s)^2 \quad \therefore \text{كل } s, -s \in [-2, 2]$$

$$d(-s) = 2 - s^2$$

بالتبسيط

$$d(-s) = d(s) \quad \text{أي أن الدالة زوجية}$$

ج $d(s) = s^2 - 4s$ ، من الشكل البياني للدالة d نلاحظ أن:

مجال $d = \mathbb{U}$ ، ومنحنى الدالة ليس متماثلاً حول محور الصادات، وليس متماثلاً بالنسبة لنقطة الأصل؛

أي أن الدالة ليست زوجية ولست فردية:

$$\therefore \text{كل } s, -s \in \mathbb{U} \quad \therefore d(-s) = (-s)^2 - 4(-s)$$

$$d(-s) = s^2 + 4s \neq d(s) \quad \therefore d \text{ ليست زوجية}$$





$$d(s) = -s^2 + 4s$$


$$d(-s) \neq -d(s) \quad \therefore d \text{ ليست فردية}$$

أي أن الدالة d ليست زوجية ولست فردية.


حاول أن تحل

٣ اذكر نوع كل من الدوال الممثلة بالأشكال البيانية الآتية من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.





مثال



٤ يمثل الشكل المقابل منحنى الدالة د حيث:

$$d(s) = \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{عندما } s > 0 \\ \frac{1}{s} & \text{عندما } s < 0 \end{cases}$$

يبين أن هذه الدالة زوجية.

الحل

من الشكل البياني المجاور يتضح أن منحنى الدالة متماثل حول محور الصادات؛ أي أن الدالة زوجية.

حاول أن تحل


$$d(s) = \begin{cases} s^2 & \text{حيث } s \leq -2 \\ -s^2 & \text{حيث } s > -2 \end{cases}$$

٤ مثل الدالة د حيث $d(s) =$


ثم بِّين: هل الدالة زوجية أو فردية أو غير ذلك؟

تمارين ١ - ٣


١ اذْكُر ما إِذَا كان تماثل المنحنى حول محور السينات أو محور الصادات أو نقطة الأصل ثم فَسِّر إِجابتك.




شكل (٣)




شكل (٢)




شكل (١)



شكل (٦)




شكل (٥)




شكل (٤)


٢ أوجد مدى كل دالة وبيان نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.




شكل (ج)




شكل (ب)




شكل (أ)



شكل (و)



شكل (ه)



شكل (د)

٣ ابحث نوع الدالة د من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

ج $d(s) = 5$

ب $d(s) = 3s^3 - 4s$

أ $d(s) = s^4 + s^2 - 1$

و $d(s) = s$ حتى s

هـ $d(s) = \frac{s^3 + s}{s - 3}$

د $d(s) = s^2 - 3s$

٤ إذا كانت d_1, d_2, d_3 دوال حقيقية حيث $d_1(s) = s^0, d_2(s) = \text{حاس}, d_3(s) = s^5$ ،

فبين أي الدوال الآتية زوجية وأيها فردية وأيها غير ذلك.

د $d_1 \times d_2$

ج $d_1 \times d_3$

ب $d_1 + d_2$

أ $d_1 + d_3$


٥ ارسم محننات كل من الدوال المعرفة كمايلى، ثم بين أيها زوجية، وأيما منها فردية وأيتها غير ذلك، ثم ابحث اطرادها.

$$\left. \begin{array}{ll} \text{عندما } s \leq 0 & s \\ \text{عندما } s > 0 & -s \end{array} \right\} = d(s) \quad \text{ب}$$


$$\left. \begin{array}{ll} \text{عندما } s \leq 0 & s+1 \\ \text{عندما } s > 0 & 1-s \end{array} \right\} = d(s) \quad \text{د}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{عندما } s < 0 & 2 \\ \text{عندما } s > 0 & 2-s \end{array} \right\} = d(s) \quad \text{أ}$$


$$\left. \begin{array}{ll} \text{عندما } s \leq 0 & s-1 \\ \text{عندما } s > 0 & 7s \end{array} \right\} = d(s) \quad \text{ج}$$




شكل (٢)



شكل (١)



شكل (٤)



شكل (٣)

أولاً: أكمل رسم شكل (١) وشكل (٣) في كرامستك، بحيث تصبح الدالة زوجية على مجالها.

ثانياً: أكمل رسم شكل (٢) وشكل (٤) في كرامستك، بحيث تصبح الدالة فردية على مجالها.

ثالثاً: حدد مجال ومدى الدالة في كل حالة ثم ابحث اطرادها.

التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية

Graphical Representation of functions, Geometrical Transformations



سوف تتعلم

- ♦ دوال كثيرة الحدود (الدالة الخطية - الدالة التربيعية - الدالة التكعيبية)
- ♦ دالة المقياس (القيمة المطلقة)
- ♦ الدالة الكسرية
- ♦ استخدام التحويلات الهندسية للدالة د في رسم المنحنيات
- $D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$
- $s = D(s) + a$
- $s = D(s + a)$
- $s = D(s + a) + b$
- $s = -D(s)$
- $s = aD(s)$
- $s = a(D(s + b)) + c$
- ♦ التحويلات الهندسية لبعض الدوال المثلثية.



المصطلحات الأساسية

Transformation	تحويل.
Translation	انتقال.
Reflection	انعكاس.
Vertical	رأسى
Horizontal	أفقى
Asymptotes	خط تقارب



الأدوات المستخدمة

- ♦ آلة حاسبة علمية.
- ♦ برامج رسومية للحاسوب.

Polynomial Functions

الدالة كثيرة الحدود

سبق أن درست الدالة كثيرة الحدود التي قاعدتها على الصورة:

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

حيث: $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$

وعلمت أن المجال والمجال المقابل هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} (أو مجموعة جزئية منها)، وتسمى هذه الدوال بـ دوال كثيرة الحدود من الدرجة n ، ودرجة كثيرة الحدود هي أعلى قوة يأخذها المتغير المستقل s .

للحظ

١- إذا كان $D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \neq 0$. فإن د تسمى كثيرة الحدود الثابتة.

٢- دوال كثيرة الحدود من الدرجة الأولى تسمى دوالاً خطية، ومن الدرجة الثانية تسمى دوالاً تربيعية، ومن الدرجة الثالثة تسمى دوالاً تكعيبية.

٣- عند جمع أو طرح دوال قوى مختلفة وثوابت، نحصل على دالة كثيرة الحدود.

٤- أصفار الدالة كثيرة الحدود هي الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنيها مع محور السينات.

Graphs of Functions


رسم منحنيات الدوال

أولاً: دوال كثيرة الحدود

تعلم



فيما يلى التمثيل البياني لبعض دوال كثيرات الحدود::



(١) دالة خطية أبسط صورة لها هي :

$$D(s) = s$$


وهي دالة د ترقق العدد بنفسه، ويمثلها خط

مستقيم يمر بالنقطة $(0, 0)$ ، وميله $= 1$

(تحقق من: مدى $D = s$ ، د فردية، د تزايدية في s)

(٢) دالة تربيعية، أبسط صورة لها هي :


$$d(s) = s^2$$



وهي دالة ترافق العدد بمرربعه، ويمثلها منحنى مفتوح لأعلى ومتماشل حول محور الصادات، ونقطة رأس المنحنى هي $(0, 0)$
 (تحقق من: مدى $d = \mathbb{R}$ ، د زوجية، د تناقصية في $[-\infty, 0]$ ، د تزايدية في $[0, \infty)$)

(٣) دالة تكعيبية، أبسط صورة لها هي :

$$d(s) = s^3$$



وهي دالة ترافق العدد بمكعبه، ويمثلها منحنى نقطة تماثله هي $(0, 0)$
 (تحقق من: مدى $d = \mathbb{R}$ ، د فردية، د تزايدية في \mathbb{R})

مثال

(٤) ارسم الشكل البياني للدالة d حيث:


$$d(s) = \begin{cases} s^2 & \text{عندما } s > 2 \\ 4 & \text{عندما } s < 2 \end{cases}$$

الحل

(١) عندما $s > 2$ ، $d(s) = s^2$

نرسم $d(s) = s^2$ لكل $s \in [2, \infty)$

مع وضع دائرة مفرغة عند النقطة $(2, 4)$ كما في شكل (١)




شكل (١)

(٢) عندما $s < 2$ ؛ $d(s) = 4$

ترسم الدالة الثابتة $d(s) = 4$ لكل $s \in [0, 2]$

على نفس الشكل البياني كما في شكل (٢)

لاحظ أن مجال الدالة $d = \mathbb{R} - \{2\}$ ، ومدى $d = [0, \infty)$



شكل (٢)

حاول أن تحل ٤

- ١ ارسم الشكل البياني للدالة d حيث:
- $$d(s) = \begin{cases} s^2 & \text{عندما } s > 0 \\ s & \text{عندما } s \leq 0. \end{cases}$$
- ثم استنتج مدى الدالة وابحث اطراها.

The Absolute Value Function

دالة المقياس (دالة القيمة المطلقة):




أبسط صورة لدالة المقياس هي

$$d(s) = |s|, s \in \mathbb{R}$$

وتعرف كما يلي:

$$d(s) = \begin{cases} s & \text{عندما } s \leq 0 \\ -s & \text{عندما } s > 0. \end{cases}$$

لاحظ أن: $|x - 0| = |x|$, $0 = |0|$, $3 = |3|$, $|-2| = 2$
أي أن: $|s| = |s|$, $s^2 = |s|^2$

المقدار d يمثلها شعاعان يبدأان من النقطة $(0, 0)$ ميل أحدهما $= 1$, وميل الآخر $= -1$.(تحقق من: مدى $d = [-\infty, \infty]$, د زوجية، د تناقصية في $(-\infty, 0]$ ومتزايدة في $[0, \infty)$)

Rational Function


الدالة الكسرية



أبسط صورة للدالة الكسرية هي:

$$d(s) = \frac{1}{s}, s \in \mathbb{R} - \{0\}$$

وهي دالة ترافق العدد بمعكوسه الضربى ، ويمثلها منحنى نقطة تمثله $(0, 0)$ ويكون من جزئين أحدهما يقع في الربع الأول والآخر يقع في الربع الثالث وكل جزء يقترب من المحورين ولا يقطعهما ($s = 0, s = \infty$ خط تقارب للمنحنى)

(تحقق من: مدى $d = \mathbb{R} - \{0\}$, د فردية، د تناقصية في $(-\infty, 0]$ ومتناقصية أيضاً في $[0, \infty)$)

حاول أن تحل ٥

- ٢ ارسم الشكل البياني للدالة d حيث $d(s) = \begin{cases} s & \text{عندما } s \geq 0 \\ \frac{1}{s} & \text{عندما } s < 0. \end{cases}$

ومن الرسم حدد مدى الدالة وابحث اطراها.

Transformations of Graphs

Vertical Translation

التحويلات الهندسية لمنحنويات الدوال

أولاً: الإزاحة الرأسية لمنحنى الدالة




اعمل مع زميل

(١) ارسم منحنى الدالة $d(s) = s^2$


باستخدام برنامج

(٢) ضع المؤشر على رأس منحنى الدالة واسحبه رأسياً لأعلى


وحدة واحدة، ولاحظ تغير قاعدة الدالة لتعبر عن دالة جديدة قاعدتها $d(s) = s^2 + 1$ كما في شكل (١).



شكل (١)



شكل (٢)



شكل (٣)

(٣) اسحب رأس منحنى الدالة إلى النقط (٠،٠)، (٢،٠)، (٣،٠) وسجل ملاحظاتك في كل مرة.

(٤) اسحب منحنى $d(s) = s^2$ وحدتين رأسياً إلى أسفل ولاحظ تغير قاعدة الدالة لتعبر عن دالة جديدة قاعدتها $d(s) = s^2 - 2$ كما في شكل (٢)

فكرة: بين كيف يمكن رسم $d(s) = s^2 - 5$ باستخدام منحنى $d(s) = s^2$ ؟

مما سبق نلاحظ أن: إذا كان:

$d(s) = s^2$ ، $r(s) = s^2 + 1$ ، $q(s) = s^2 - 2$ فإن:

(١) منحنى $r(s)$ هو نفس منحنى $d(s)$ بازاحة قدرها وحدة واحدة في الاتجاه الموجب لمحور الصادات.

(٢) منحنى $q(s)$ هو نفس منحنى $d(s)$ بازاحة قدرها وحدة في الاتجاه السالب لمحور الصادات.

تفكر ناقد: باستخدام منحنى $d(s) = s^2$ بين كيف يمكن رسم محنويات كل من:


أ) $r(s) = s^2 + 4$

ب) $q(s) = s^2 - 5$



رسم المنحنى $s = d(s) + a$

لأى دالة d ؛ يكون المنحنى $s = d(s) + a$ هو نفس منحنى $s = d(s)$ يازحة قدرها a من الوحدات في اتجاه \leftarrow و \rightarrow ، عندما $a < 0$ ، وفي اتجاه \leftarrow و \rightarrow عندما $a > 0$.



مثال

- ٥ يبين الشكل المقابل منحنيات الدوال d ، r ، q ، حيث كل من r ، q صورة للدالة d بإزاحة رأسية اكتب قاعدة كل من r ، q

الحل

∴ منحنى الدالة r هو نفس منحنى الدالة d بازاحة قدرها ٣ وحدات

في اتجاه وص

$$\therefore r(s) = d(s) - 3$$

$$\therefore d(s) = |s| - 3$$


، ∴ منحنى الدالة q هو نفس منحنى الدالة d بازاحة قدرها ٢ وحدة في اتجاه وص

$$\therefore q(s) = |s| + 2 \quad \therefore d(s) = |s| + 2$$


حاول أن تحل

- ٦ تبيّن الأشكال التالية منحنيات الدوال d ، r ، q حيث كل من r ، q صورة للدالة d بإزاحة رأسية. اكتب قاعدة كل من r ، q في كل شكل.


ج



ب




أ



Horizontal Translation

ثانياً: الإزاحة الأفقيّة لمنحنى الدالة



شكل (١)

عمل تعاونى


اعمل مع زميل:

١١ ارسم منحنى الدالة d : $d(s) = |s|$ مستخدماً


برنامج Geogebra بكتابة قاعدة الدالة في مربع الادخال على النحو التالي: $\text{abs}(x)$ ثم اضغط إدخال

فيظهر منحنى الدالة في النافذة البيانية وقاعدتها

$f(x) = |x|$ في النافذة الجبرية كما في شكل (١)




- ٢ اسحب منحني الدالة أفقياً في الاتجاه الموجب
لمحور السينات بعدد من الوحدات ولاحظ
تغير قاعدة الدالة في النافذة الجبرية
كما في شكل (٢)



- ٣ اسحب منحني الدالة أيضاً في الاتجاه السالب
لمحور السينات بعدد من الوحدات كما في
شكل (٣)، ماذا تلاحظ؟

فكرة: بين كيف ترسم منحني الدالتين r ، d باستخدام منحني الدالة d حيث: $d(s) = |s|$ ، $r(s) = |s - 5|$ ، $q(s) = |s + 4|$.

تعلم



- رسم المنحني $ص = د(س + ١)$
لأى دالة d ؛ يكون المنحني، $ص = د(س + ١)$ هو نفس منحني $ص = د(س)$ بيازاحة قدرها ١ من الوحدات في اتجاه
 $\overleftarrow{و س}$ عندما يكون $١ > ٠$ ، وفي اتجاه $\overrightarrow{و س}$ عندما يكون $١ < ٠$.

للحظ: في الشكل المقابل: $d(s) = |s|$

- ١ منحني الدالة r هو نفس منحني الدالة d بيازاحة
قدرها ٣ وحدات في اتجاه $\overleftarrow{و س}$
 $\therefore r(s) = |s - 3|$ نقطة بدء الشعاعين (٣، ٠).


- ٢ منحني الدالة q هو نفس منحني
الدالة d بيازاحة قدرها ٢ وحدة في اتجاه $\overleftarrow{و س}$
 $\therefore q(s) = |s + 2|$ ، نقطة بدء الشعاعين (٠، ٢).

مثال


- ٦ استخدم منحني الدالة d حيث $d(s) = s^3$ لتمثيل كل من الدالتين r ، q حيث:

$$b \quad ع(s) = (s + 3)^2$$

$$a \quad r(s) = (s - 2)^2$$



ب



أ

ـ منحنى $u(s) = (s+3)^2$ هو منحنى $d(s) = s^2$ يإزاحة ٣ وحدات في الاتجاه السالب لمحور السينات ، وتكون نقطة رأس المنحنى هي $(-3, 0)$.

ـ منحنى $r(s) = (s-2)^2$ هو منحنى $d(s) = s^2$ يإزاحة ٢ وحدتين في الاتجاه الموجب لمحور السينات وتكون نقطة رأس المنحنى هي $(2, 0)$.


حاول أن تحل

٤ استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = s^2$ لتمثيل كل من الدالتي r ، u حيث:


$$u(s) = (s-3)^2$$

$$r(s) = (s+4)^2$$


٥ اكتب قاعدة الدالة d الممثلة بيانياً بالأشكال التالية:



ج



ب



أ

تفكيير ناقد: إذا كان $d(s) = s^2$ ، بين كيف يمكن رسم منحنى الدالة r حيث $r(s) = (s-3)^2 + 2$

رسم المنحنى $ص = د(s+أ)+ب$

مما سبق نستنتج أ: المنحنى $ص = د(s+أ)+ب$ هو نفس منحنى $ص = د(s)$ يإزاحة أفقية قدرها أ من الوحدات

(في اتجاه $\overset{\leftarrow}{وص}$ عندما $A > 0$ ، وفي اتجاه $\overset{\leftarrow}{وص}$ عندما $A < 0$) ، ثم إزاحة رأسية قدرها ب من الوحدات

(في اتجاه $\overset{\leftarrow}{وص}$ عندما $B < 0$ ، وفي اتجاه $\overset{\leftarrow}{وص}$ عندما $B > 0$)


حاول أن تحل ٥

- ٦ استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = s^3$ لتمثيل كل من الدالتين r ، u حيث:
 ب $u(s) = (s - 3)^2 - 4$ أ $r(s) = (s + 2)^2 - 4$

مثال ٧

تطبيق التحويلات الهندسية على رسم منحنيات الدوال

- ٧ ارسم منحنى الدالة r حيث $r(s) = \frac{1}{s+1} + 3$ ومن الرسم حدد مدى الدالة وابحث اطرادها:



الحل

منحنى الدالة r هو نفس منحنى الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s}$
 ييازحة قدرها وحدة واحدة في اتجاه $s < -1$ ، ثم
 إزاحة قدرها 3 وحدات في اتجاه $s > 0$ وتكون نقطة تماثل
 منحنى الدالة r هي النقطة $(1, 3)$ ، مدى $r = \cup \{-3\}$
 اطراود الدالة r :
 ر تناقصية في $[-\infty, 1]$ ، وتناقصيه أيضاً في $[1, \infty)$

تفكير ناقد: هل يمكن القول بأن $d(s) = \frac{1}{s-2} + 3$ تناقصية على مجالها؟ فسر إجابتك.


حاول أن تحل ٨

- ٨ استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s^2 - 2}$ ، لتمثيل كل من:


ب $q(s) = \frac{3s^2 - 2}{2s - 3}$ أ $r(s) = \frac{1}{s^2 + 2}$

- ٩ اكتب قاعدة الدالة الممثلة بيانيًّا بالأسكال التالية :


ج





ب



أ



ملاحظة: يمكن رسم منحنى $d(s) = s^2 + 4s + 1$ باستخدام الإزاحة الأفقيه والإزاحة الرأسية للمنحنى $r(s) = s^2$ كمائيًّا.




$$\begin{aligned} d(s) &= s^2 + 4s + 1 \text{ باكمال المربع} \\ &= (s^2 + 4s + 4) - 3 \\ &= (s+2)^2 - 3 \end{aligned}$$

أى أن منحنى الدالة d (المعطاة) هو نفس منحنى الدالة r حيث
حيث $r(s) = s^2$ بازاحة قدرها ٢ وحدة في اتجاه \overleftarrow{s} ، ثم
٣ وحدات في اتجاه \overrightarrow{s} ويمثله الرسم المقابل.

تطبيق: ارسم منحنى $d(s) = s^2 + 6s + 7$ باستخدام الإزاحة
الأفقية والإزاحة الرأسية لمنحنى $r(s) = s^2$ ثم ابحث اطراط الدالة d .

ثالثاً: انعكاس منحنى الدالة في محور السينات

تبين الأشكال التالية انعكاس منحنيات بعض الدوال الأساسية في محور السينات.



ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟



رسم المنحنى $ص = -d(s)$ لأى دالة d ، يكون المنحنى $ص = -d(s)$ هو نفس منحنى $ص = d(s)$ بانعكاس في محور السينات

مثال


٨ **تطبيق التحويلات الهندسية على رسم المنحنيات**

باستخدام منحنيات الدوال الأساسية ارسم منحنيات الدوال r ، q ، u حيث:

ب $q(s) = 4 - |s+3|$


أ $r(s) = -(s-3)^2$

ج $u(s) = -\frac{1}{s-2}$




أ منحنى $r(s)$ هو انعكاس لمنحنى $d(s) = s^2$ في محور السينات ،
ثم إزاحة أفقية قدرها ٣ وحدات في اتجاه \overleftarrow{s} ، وتكون نقطة رأس
المنحنى هي $(3, 0)$ والمنحنى مفتوح إلى أسفل.

الحل



ب منحنى $q(s)$ هو انعكاس لمنحنى $d(s) = |s|$ في محور السينات، ثم إزاحة أفقية قدرها ٣ وحدات في اتجاه \leftarrow وس ، وإزاحة رأسية قدرها ٤ وحدات في اتجاه \leftarrow ص ، وتكون نقطة بدء الشعاعين هي النقطة $(-3, 4)$ والمنحنى مفتوح لأسفل.



ج منحنى $u(s)$ هو انعكاس لمنحنى $d(s) = \frac{1}{s}$ في محور السينات، ثم إزاحة أفقية قدرها ٣ وحدات في اتجاه \leftarrow وس ، وإزاحة رأسية قدرها ٢ وحدة في اتجاه \leftarrow ص ، وتكون نقطة تماثل المحنن هي $(2, 3)$.

حاول أن تحل

٩ في كل مما يأتى ارسم منحنى الدالة حيث:

$$\text{ج } r(s) = 3 - |s - 3|$$


$$\text{ب } r(s) = -(s - 3)^2$$

ثم تحقق من صحة الرسم باستخدام أحد البرامج الرسمية أو الحاسبة البيانية.

Expanding of graph

رابعاً: تمدد منحنى الدالة:

عمل تعاونى



شكل (١)

رسم منحنى $r(s) = ad(s)$ اعمل مع زميل.


١ ارسم منحنى الدالة $d(s) = s^2$ باستخدام برنامج Geogebra وفي مربع الادخال اكتب قاعدة الدالة ر على النحو التالي:

→ إبدأ a ← ↗ ↘ ↖ ↙

لنظهر لك نافذة جديدة (شكل ١)


Create sliders

إختر منها



شكل (٢)

٢ استخدم مؤشر قيم a لاختيار قيم آخرى لها حيث $a > 1$ ولاحظ حركة منحنى الدالة ر بالنسبة لمنحنى الدالة d لكل $s \in \mathbb{R}$ كما في شكل (٢) وعندما $a < 1$ كما في شكل (٣) ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟



شكل (٣)


تعلم

رسم المنحنى $r(s) = ad(s)$
لأى دالة d ؛ يكون المنحنى $r(s) = ad(s)$ هو تمدد رأسى لمنحنى
 $s = d(s)$ إذا كان $a > 1$ ، و انكماش رأسى لمنحنى
 $s = d(s)$ إذا كان $0 < a < 1$.

مثال

- استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = |s|$ لتمثيل كل من الدالتين r ، u :
- ب) $u(s) = 2 + |s| - 7$
- أ) $r(s) = 2s$

الحل



أ) منحنى $r(s) = 2s$ هو تمدد رأسى لمنحنى الدالة d
معاملة $a = 2 > 1$. وعلى ذلك فإن:
لكل $(s, r(s)) \in$ بيان d
يكون $(s, 2r(s)) \in$ بيان r

ب) منحنى $u(s) = 2 + |s| - 7$ هو نفس منحنى $r(s)$ بإزاحة
أفقية قدرها 7 وحدات في اتجاه \leftarrow s ،
و إزاحة رأسية قدرها 2 وحدة في اتجاه \uparrow s

حاول أن تحل

- استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = s^2$ لتمثيل الدالتين r ، u :
- ب) $u(s) = -\frac{1}{5}(s-5)^2$
- أ) $r(s) = -\frac{1}{3}s^2$
- تحقق من صحة الرسم باستخدام أحد البرامج الرسمية أو الحاسبة البيانية ثم حدد مدى الدالة u وابحث اطراها.

نشاط

﴿ تطبيق التحويلات الهندسية التي درستها في الدوال الجبرية السابقة على دوال الجيب وجيب تمام؟

Trigonometric functions

الدوال المثلثية (منحنى دالة الجيب)

أولاً: الإزاحة في اتجاه محور السينات

- ١) استخدم برنامج جيوجبرا (GeoGebra) وأعد البرنامج بحيث يكون التدريج على محور السينات بالراديان، وذلك بأن تضغط بالفأرة (كлик يمين)، وتحتار منها في آخر سطر محور الفاصلات (السينات) x ، ثم تختار منه نظام التدريج (π).

- ٢) في أسفل البرنامج (كتابة الأوامر) اكتب الأمر: $\sin(x)$ ثم اضغط (enter) فتعطى لك شكل المنحنى

الأحمر، تستطيع التحكم في اللون وسمك المحنن ، وذلك بالضغط على المحنن بالفأرة (الضغط شمال)، فيظهر في أعلى النافذة اللون، وسمك الخط وشكل الخط . منقط ، شرطي ، متصل ،...).

٣) بنفس الطريقة السابقة اكتب الأمر: $\sin(x + (\pi/3))$ ثم اضغط (enter) ولون هذا المحنن بلون آخر.



٤) قارن بين المحننين. ماذا تلاحظ؟
من الرسم نستنتج أن:

تم إزاحة محنن دالة الجيب أفقياً جهة اليسار على محوor السينات بمقدار يساوى $\frac{\pi}{3}$ (كما في الدوال

الحقيقية)، ونلاحظ أن مدي الدالة الثانية هو [١ - ١] وهو نفس مدي الدالة \sin ، كما نلاحظ أن الدالة $\sin(x + \frac{\pi}{3})$ ليست زوجية وليست فردية؛ لأنه لا يوجد تماثل لمحنناتها حول محور الصادات أو نقطة الأصل.

فكير:

﴿ ماذا تتوقع أن يكون اتجاه الإزاحة السينية إذا كانت قاعدة الدالة هي: $\sin(x - \frac{\pi}{3})$.

ثانية: الإزاحة في اتجاه محور الصادات


١) ارسم محنن الدالة د حيث $d(s) = \sin(s)$ كما سبق.

٢) ارسم محنن الدالة ر حيث $r(s) = \sin(s) + 2$ بلون آخر وقارن بين شكل المحننين. ماذا تلاحظ؟

من الرسم نستنتج أن

محنن الدالة الثانية هو نفسه محنن الدالة \sin ،
بعد إزاحته بمقدار وحدتين لأعلى.


ونلاحظ أن مدي الدالة الثانية هو [١ ، ٣]؛ لأنه تم
إزاحته بمقدار وحدتين في الاتجاه الموجب لمحور الصادات عن الدالة الأولى، وأن الدالة $\sin + 2$ ليست زوجية وليست فردية.



إزاحتة بمقدار وحدتين في الاتجاه الموجب لمحور الصادات عن الدالة الأولى، وأن الدالة $\sin + 2$ ليست زوجية وليست فردية.

تفكيير ناقذ:

في كل من الأشكال المقابلة:
صف التحويلات الهندسية لمحننى الدالة د والتي ترسم محننى الدالة ر،
ثم اكتب قاعدة الدالة ر بدلالة س
وحدد مدهاها وابحث اطراها.





تمارين ١ - ٤



١) ارسم منحني الدالة d ، ومن الرسم حدد مداها وابحث اطراها

$$\left. \begin{array}{l} d(s) = s^4 \\ d(s) = s^2 \end{array} \right\} \quad \text{ب} \quad \left. \begin{array}{l} \text{اسا} \quad s \geq 0 \\ \text{عندما} \quad s < 0 \end{array} \right\} \quad \text{أ} \quad d(s) = s^2$$

$$\left. \begin{array}{l} d(s) = \frac{1}{|s|} \\ d(s) = s^3 \end{array} \right\} \quad \text{ج} \quad \left. \begin{array}{l} \text{اس} \quad s > 1 \\ \text{عندما} \quad s < 1 \end{array} \right\} \quad \text{د} \quad \left. \begin{array}{l} \text{عندما} \quad s > 1 \\ \text{عندما} \quad s < 1 \end{array} \right\}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة:

٢) منحني $r(s) = s^2 + 4$ هو نفس منحني $d(s) = s^2$ بازاحة مقدارها ٤ وحدات في اتجاه:

أ وس \leftarrow **ب** وس \leftarrow **ج** وص \leftarrow **د** وص \leftarrow

٣) منحني $r(s) = |s + 3|$ هو نفس منحني $d(s) = |s|$ بازاحة مقدارها ٣ وحدات في اتجاه:

أ وس \leftarrow **ب** وس \leftarrow **ج** وص \leftarrow **د** وص \leftarrow

٤) نقطة رأس منحني الدالة $d(s) = (2 - s)^2 + 3$ هي:


أ (٣، ٢) **ب** (٣ - ٢، ٢) **ج** (٣، ٢ -) **د** (٢ - ٣، ٢)

٥) نقطة تمايل منحني الدالة d حيث $d(s) = 2 - (s + 1)^3$ هي :

أ (٢، ١) **ب** (٢، ١ -) **ج** (١، ٢) **د** (١ - ٢، ٢)

٦) نقطة تمايل منحني الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s - 3} + 4$ هي:

أ (٤ - ٣، ٤) **ب** (٤ - ٣، ٤) **ج** (٣ - ٤، ٤) **د** (٣ - ٤، ٣)




أجب عن ما يأتى:

٧) رسم منحني الدالة d حيث $d(s) = s^2$ ثم أزيح في اتجاه محور الإحداثيات كما في الشكل المقابل.


اكتب قاعدة كل من الدوال الآتية:

ـ ر، ـ ق، ـ ع



٨ في الشكل المقابل: رسم منحنى الدالة d ، حيث $d(s) = s^3$
ثم أزِّيَحْ في اتجاه محور الإحداثيات


اكتب قاعدة كل من الدوال الآتية:
ر، ق، ع




٩ في الشكل المقابل رسم منحنى الدالة d حيث $d(s) = |s|$
ثم أزِّيَحْ في اتجاه محور الإحداثيات

اكتب قاعدة كل من الدوال الآتية:
ر، ق، ع


١٠ رُسم منحنى الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s}$ ، ثم أزِّيَحْ في اتجاه محور الإحداثيات . اكتب قاعدة كل دالة التي تمثلها المحننات الآتية:



ج



ب



أ

١١ استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = s^3$ لتمثيل ما يأتي بيانياً.

ج $d_3(s) = (s - 2)^{-3}$

ب $d_3(s) = (s - 3)^{-2}$

أ $d_3(s) = s^{-3} - 4$

١٢ استخدم منحنى الدالة d حيث $d(s) = |s|$ لتمثيل ما يأتي بيانياً:

ج $d_3(s) = |s - 3|^2$

ب $d_3(s) = |s + 2|$

أ $d_3(s) = |s + 1|$

ثم أوجِد إحداثيات نقط تقاطع المحننات مع المحورين.

١٣ استخدم منحنى الدالة D حيث $D(s) = s^3$. لتمثيل ما يأتي بيانياً:

أ $D(s) = D(s) - 3$ **ب** $D(s) = D(s - 2)$ **ج** $D(s) = D(s + 3)$

ـ ثم حدد نقطة التماشى لمنحنى كل دالة.

١٤ إذا كانت الدالة D حيث $D(s) = \frac{1}{s}$ فارسم الشكل البيانى للدالة Q وحدد نقطة التماشى لمنحنى الدالة:

أ $Q(s) = D(s - 3)$ **ب** $Q(s) = D(s) + 2$ **ج** $Q(s) = D(s)$

١٥ استخدم منحنى الدالة D حيث $D(s) = s^3$ لتمثيل ما يأتي بيانياً:


أ $D(s) = 4 - s^2$ **ب** $D(s) = -(s - 3)^2$ **ج** $D(s) = 2 - (s + 3)^2$

١٦ استخدم منحنى الدالة D حيث $D(s) = |s|$ لتمثيل ما يأتي بيانياً.

أ $D(s) = 2 - |s - 5|$ **ب** $D(s) = |s + 5| - 2$ **ج** $D(s) = |s - 1| - 2$

١٧ ارسم منحنى الدالة D في كل مما يأتي باستخدام التحويلات المناسبة ثم ابحث اطرادها

$$\begin{cases} s^2 + 1 & \text{عندما } s \leq 0 \\ -s^2 - 1 & \text{عندما } s > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} s^2 - 2 & \text{عندما } s \geq 0 \\ -s^2 + 2 & \text{عندما } s < 0 \end{cases}$$



١٨ **الربط مع الصناعة:** صممت بوابة حديدية ارتفاع جانبيها ٣ أمتار وقوتها

على شكل جزءاً من منحنى الدالة $D(s) = |(s - 2)^2 + 4|$ كما في الشكل المقابل. أوجد:

أ قيمة $|s|$ **ب** أقصى ارتفاع للبوابة

ج عرض البوابة

١٩ **الربط مع التجارة:** يدفع تاجر غلال ٥٠ جنيهاً عن كل طن يدخل أو يخرج من مستودعه كأجر تحمل أو تنزيل، أكتب الدالة التي تمثل تكاليف التحميل أو التنزيل ومثلها بيانياً.

٢٠ **المجتمعات العمرانية:** خصصت قطع أراضي مستطيلة الشكل لإسكان الشباب بإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة، فإذا كان طول كل منها s متراً، ومساحتها 400 متر مربع.

أ أكتب قاعدة الدالة D التي تبين عرض قطعة الأرض بدلالة طولها ومثلها بيانياً.

ب أوجد من الرسم عرض قطعة الأرض التي طولها 25 متراً وتحقق من ذلك جبرياً.

حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة

Solving Absolute Value Equations and Inequalities

أولاً: حل المعادلات

فكِّر و نقِّل

مثلاً بيانياً في شكل واحد منحني الدالتين d ، r حيث d دالة مقاييس، r دالة ثابتة.

لاحظ الرسم ثم اجب:

أ ما عدد نقط التقاطع المحتمل لمنحني الدلتتين معاً؟




ب إذا وجدت نقط تقاطع لمنحنيين معاً، هل تتحقق الأزواج المرتبة لها قاعدة

كل من الدلتتين؟

الحظ لأن:

(١) عند نقط التقاطع (إن وجدت) يكون: $d(s) = r(s)$ ، والعكس صحيح لـ كل س تتنتمي إلى المجال المشترك للدلتتين.


(٢) لأى دلتين d ، r تكون مجموعة حل المعادلة $d(s) = r(s)$ هي مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنيهما كما توضّحه الأشكال التالية:



حل المعادلة: $|as + b| = c$

مثال

(١) حل المعادلة: $|s - 3| = 4$ بيانياً وجبرياً.



الحل

بوضع $d(s) = |s - 3|$ ، $r(s) = 4$

(٢) نرسم منحني الدالة d : $d(s) = |s - 3|$ ثالث
يازاحة منحني $d(s) = |s|$ وحدات في اتجاه s

(٢) على نفس الشكل نرسم $r(s) = 4$ ، حيث r دالة ثابتة يمثلها مستقيم يوازي محور السينات ويمر بالنقطة $(0, 4)$

سوق تتعلم

- حل معادلات المقاييس بيانياً
- حل معادلات المقاييس جبرياً
- حل متباينات المقاييس بيانياً
- حل متباينات المقاييس جبرياً
- نبذة مشكلات وتطبيقات حياتية وحلها باستخدام معادلات ومتباينات المقاييس

المصطلحات الأساسية

- | | |
|--------------------|-----------|
| Equation | معادلة. |
| Inequality | متباينة. |
| Graphical Solution | حل بياني. |

الأدوات المستخدمة

- ورق رسم بياني
- برامج رسومية للحاسوب.

∴ الممنجين يتقاطعان في النقطتين (٤، ١)، (٤، ٧)

∴ مجموعة حل المعادلة هي: {١، ٧}

الحل الجبرى:

$$\begin{cases} \text{س} < 3 & \text{عندما س} \\ \text{س} > 3 & \text{عندما س} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{س} = 3 \\ \text{س} = 3 \end{array} \right. \quad \text{من تعريف دالة المقاييس: } D(s) =$$

عندما $s \leq 3$: $s = 3$ أى أن: $s = 3$

عندما $s > 3$: $s = 3$ أى أن: $s = 3$

مجموعة حل المعادلة هي: {١، ٧} وهذا يطابق الحل البياني.

٤ حاول أن تحل

١ حل كلاً من المعادلات الآتية بيانياً وجبرياً.

ج $|s - 7| = 5$

ب $|s + 1| = 4$

أ $|s - 4| = 0$

Properties of the Absolute Value

بعض خواص مقاييس العدد

تعلم

(١) $|ab| = |a| \times |b|$ فمثلاً:

$$6 = 3 \times 2 = |3 - | \times |2| \quad 6 = |6 - | = |3 - \times 2|$$

(٢) $|a+b| \geq |a| + |b|$

ويحدث التساوى فقط إذا كان العددان **أ**، **ب** لهما نفس الإشاره فمثلاً:

$$9 = |5 - | + |4 - | = |5 - 4 - | \quad 9 = |5 + |4| = |5 + 4|$$

(٣) $|a-s| = |s-a|$

الاحظ:

(١) إذا كان: $|s| = a$ فإن: $s = a$ أو $s = -a$ الكل $a \geq 0$

(٢) إذا كان: $|a| = |b|$ فإن: $a = b$ أو $a = -b$ لكلاً، $b \geq 0$

(٣) $|s|^2 = s^2$

حل المعادلة: $|as + b| = |bs + a|$


مثال

٢ حل المعادلة $|s - 3| = |s + 2|$ بيانياً.

الحل

بوضع $D(s) = |s - 3|$, $R(s) = |s + 2|$

منحنى د هو نفس منحنى $|s|$ بإزاحة قدرها ٣ وحدات في اتجاه \overleftarrow{s}



ب $|s - 2| + |s - 1| = 0$ صفر

$$\therefore r(s) = |s - 2| = |s + \frac{1}{2}|$$

$$\therefore r(s) = |s + \frac{1}{2}|$$

منحنى r هو نفس منحنى $|s|$ يازاحة أفقية قدرها $\frac{1}{2}$ وحدة في اتجاه s^- ، ويكون نقط تقاطع منحنينا

الدالتين d ، r هي: $(-\frac{5}{2}, 7)$ ، $(\frac{5}{2}, 7)$

مجموعة حل المعادلة هي $\{-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\}$

حاول أن تحل

٢ حل كلاً من المعادلات الآتية بيانياً.

أ $|s + 7| + |s - 5| = 0$

مثال

٣ أوجد جبرياً مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

ب $|s^2 + 6s + 9| = |s - 5|$

أ $|s + 7| = |s - 5|$

الحل

أ $|s + 7| = |s - 5| \Rightarrow s + 7 = s - 5$

$\therefore s + 7 = s - 5$ (غير ممكن).

أو $s + 7 = -s + 5 \Rightarrow 2s = -2$

$\therefore s = -1$

التحقيق:

بالت遇وض عن $s = -1$ في طرفي المعادلة نجد أن:

أى أن مجموعة الحل هي $\{-1\}$

تذكر أن



إذا كان a ، $b \in \mathbb{R}$
وكان $|a| = |b|$
فإن: $a = \pm b$

تذكر أن



لأى عدد حقيقي a يكون:

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

ب $|s^2 + 6s + 9| = |s - 5|$

أى أن $|s - 9| = |(s - 3)^2 - 9|$

ويكون: $s - 3 = \pm (s - 9)$

$\therefore s - 3 = 9 - s \Rightarrow 2s = 12 \Rightarrow s = 6$

أو $s - 3 = -9 + s \Rightarrow s = 6$

بالت遇وض عن قيم s في طرفي المعادلة

عند $s = 6$ **الطرف الأيمن = الطرف الأيسر = 1**

عند $s = 4$ **الطرف الأيمن = الطرف الأيسر = 1**

أى أن مجموعة حل المعادلة هي: $\{6, 4\}$

حاول أن تحل ٤


٣ أوجد جبرياً مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

$$\text{ب } \frac{1}{s^2 - 4s + 4} = 0$$

$$\text{أ } |s - 1| - 2 = 0$$

*Solving the Inequalities***ثانياً: حل المتباينات**

سبق أن درست المتباينات، وعلمت أن المتباينة هي عبارة رياضية تحتوي أحد الرموز: ($<$ ، $>$ ، \leq ، \geq) والمقصود بحل المتباينة هو إيجاد القيمة أو مجموعة القيم للمتغير التي تجعل المتباينة صحيحة.

حل المتباينات بيانياً

يبين الشكل المقابل منحني كل من الدالتين d ، r حيث:


$c = d(s)$ ، $c = r(s)$ وتكون مجموعة حل المعادلة

$d(s) = r(s)$ هي {أ، ب}

أى أن: $c = r(s)$ عندما $s = a$ أو $s = b$

ويلاحظ: $c > r(s)$ عندما $s \in [a, b]$


$c < r(s)$ عندما $s \in (-\infty, a] \cup [b, \infty)$

مثال ٤**ج**

مجموعه حل المتباينة

$$s - 2 \geq 0$$


$$\text{هي: } [5, 1]$$

ب

مجموعه حل المتباينة

$$2s + 2 \leq 0$$

$$\text{هي: } [-5, -1]$$

أ

مجموعه حل المتباينة

$$2s + 2 > 0$$

$$\text{هي: } (-4, 0)$$

حاول أن تحل ٤

٤ أوجد مجموعة حل كل من المتباينات التالية مستعيناً بالأشكال البيانية في مثال (٧):

$$\text{ج } s - 2 < 0$$

$$\text{ب } |s + 2| \geq 4$$

$$\text{أ } |s + 2| \geq 2$$

حل المتباينات جبرياً



أولاً: إذا كان $|s| \geq 1$, $1 < 0$. فإن: $-1 \geq s \geq 1$

ثانياً: إذا كان $|s| \leq 1$, $1 < 0$. فإن: $s \leq 1$ أو $s \geq -1$



٥ أوجد على صورة فترة مجموعة حل كل من المتباينات الآتية:

$$b: |s-2| \leq 4 \quad a: |s-3| > 4$$

تذكر أن



- لكل من a, b, c
- إذا كان: $a > b$, $b > c$
- فإن $a > c$
- إذا كان: $a > b$ فإن $a + c > b + c$
- أي $a > b$ عند $c > 0$.
- أي $a > b$ عند $c < 0$.

الحل

$$\begin{aligned} &\text{وبإضافة 3 إلى المتباينة} \\ &\text{أي أن: } 1 - s > s - 3 > 4 \\ &\therefore 3 + 4 > 3 + s - 4 > s > 7 \\ &\therefore \text{مجموعة الحل} = [7, 1) \\ &b: |s-1| \leq 4 \quad a: |s-1| > 4 \\ &\therefore -4 \leq s-1 \leq 4 \quad \text{أي } s \leq 5 \quad \text{أي } s > -3 \\ &\therefore -3 < s \leq 5 \\ &\therefore \text{مجموعة حل المتباينة هي } [-3, 5] \cup [5, \infty) \end{aligned}$$



٥ أوجد على صورة فترة مجموعة حل كل من المتباينات الآتية:

$$b: 8 \geq |s+7| \quad a: |s-11| > 7$$

$$j: |s^2 - 6s + 9| \leq 8$$

تفكيير ناقد: اكتب على صورة متباينة القيمة المطلقة كل مما يأتى:

$$j: 0 < s < 6 \quad b: s \geq -2, s \leq 2 \quad a: -4 \leq s \leq 4$$

تطبيقات حياتية



٦ قامت محطة الأرصاد الجوية بتسجيل درجة الحرارة على مدينة القاهرة في يوم ما فكانت 32° باختلاف 7° عن معدتها الطبيعية في ذلك اليوم . كم تكون درجة الحرارة المحتملة لمدينة القاهرة في ذلك اليوم ؟

الحل

بفرض أن درجة الحرارة المحتمل تسجيلها على مدينة القاهرة في هذا اليوم = s°

$$\therefore s - 32 = 7 \text{ أو } s = 32 + 7$$

$$\text{ويمكن } s = 32 - 7 = 25 \text{ أو } s = 39$$

أى أن درجة الحرارة المحتمل تسجيلها هي 39° أو 25°

٤ حاول أن تحل

- ٦ الطب الرياضي:** يختلف وزن باسم عن الوزن الطبيعي لطوله بمقدار ٥ كيلو جرامات، ما الوزن المحتمل له إذا كان وزنه الطبيعي ٦٠ كيلو جراماً؟

مثال

- ٧** تسمح إحدى شركات الغاز الطبيعي بتوظيف قارئ العداد إذا كان طوله يتراوح بين ١٧٨ سم ، ١٩٢ سم . عبر عن الأطوال الممكنة لمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة بمتباينة القيمة المطلقة.

الحل


بفرض أن طول المتقدم لشغل الوظيفة = s سم

$$192 \geq s \geq 178$$

إضافة -١٨٥ إلى أجزاء المتباينة

$$185 - 185 \geq s - 185 \geq 192 - 185$$


$$7 \geq s - 185 \geq -7$$



$$7 \geq |s - 185|$$

٤ حاول أن تحل

- ٧** اكتب متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن درجة طالب في اختبار ما يتراوح بين ٦٠ ، ١٠٠ درجة

نشاط**استخدام الدوال في حل مشكلات رياضية وحياتية**

لاحظ أن: إذا سقط شعاع الضوء على سطح عاكس فإن مساره يخضع للدالة المقاييس فيكون قياس زاوية السقوط مساوياً لقياس زاوية الانعكاس، كذلك مسار كرة البلياردو قبل وبعد تصادمها مع حافة الطاولة.

يوضح الشكل المقابل: تصويب للاعب البلياردو على الكرة السوداء، باعتبار s ، $ص$ محوري الإحداثيات المتعامدة، وأن مسار الكرة يتباع منحنى الدالة d حيث: $d(s) = \frac{4}{3}s - 5$

هل تسقط الكرة السوداء في الجيب b ؟
فسر إجابتك رياضياً.

تمارين الدرس الخامس

أكمل ما يأتى:

- ١ مجموعه حل المعادلة $|s| = \frac{1}{2}$ هي $s = \pm \frac{1}{2}$
- ٢ مجموعه حل المعادلة $|s| = 3 + 0$ هي $s = 3$
- ٣ مجموعه حل المتباينة $|s - 2| \geq 0$ هي $s \in \mathbb{R}$

اختر من القائمة التالية مجموعه الحل المناسبة لكل معادلة أو متباينة مما يأتى:

- | | |
|---------------|--------------------|
| أ $[1, 5]$ | ٤ $ s - 2 = 3$ |
| ب $\{1, 5\}$ | ٥ $ s - 2 > 3$ |
| ج $[5, 1]$ | ٦ $ s - 2 < 3$ |
| د $[-1, 5]$ | ٧ $ s - 2 \geq 3$ |
| ه \emptyset | ٨ $ s - 2 < 3$ |
| و $[1, 5]$ | ٩ $ s - 2 = 3$ |

أوجد جبرياً مجموعه الحل لكل من المعادلات الآتية:

$$7 = |s^2 - 3| \quad (12) \quad 5 = |s^2 - 7| \quad (11) \quad 6 = |s^3 + 3| \quad (10)$$

$$4 = \sqrt{s^2 - 3s + 1} \quad (15) \quad 14 = |s^2 + 1| = |s - 3| \quad (14) \quad 13 = |s - 3| = |s + 1| \quad (13)$$

أوجد بيانياً مجموعه الحل لكل من المعادلات الآتية:

$$3 = |2s - 5| \quad (18) \quad 17 = |s - 1| = |s^3 + 4| \quad (17) \quad 3 = |s + 4| \quad (16)$$

أوجد بيانياً مجموعه الحل لكل من المتباينات الآتية:

$$2 < |s^3 + 2| \quad (21) \quad 20 \geq |s - 2| \quad (20) \quad 3 > |s - 1| \quad (19)$$

أوجد جبرياً مجموعه الحل لكل من المتباينات الآتية:

$$2 \leq |s^3 - 7| \quad (24) \quad 23 \geq |s^2 + 3| \quad (23) \quad 2 < |s - 1| \quad (22)$$

شبكات الطرق: طريقان الأول يمثله منحنى الدالة D حيث $D(s) = |s - 4|$ ، والثانى يمثله منحنى الدالة R حيث $R(s) = 3$ ، إذا تقاطع الطريقان في نقطتين A ، B أوجد المسافة بين A ، B علماً بأن وحدة الأطوال تمثل كيلو متراً واحداً.

٢٦ اكتب متباينة القيمة المطلقة التي تعبّر عن درجة حرارة مقاسه بالترمومتر الطبى وتترواح بين 35° و 42° .

ملخص الوحدة

الدالة: هي علاقة بين مجموعتين غير خاليتين س، ص بحيث يكون لكل عنصر من عناصر س عنصراً وحيداً من عناصر ص، وتكتب رمزيّاً بالصورة $d: S \rightarrow C$ ، وتحدد الدالة بثلاثة عناصر هي: المجال، المجال المقابل، قاعدة الدالة.

وتسمى الدالة د دالة حقيقة إذا كان كل من مجالها ومجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقة أو مجموعة جزئية منها.

اختبار الخط الرأسى: إذا مثلت علاقة بمجموعة من النقاط في مستوى احداثى متعمد وقطع الخط الرأسى عند كل عنصر من عناصر المجال تمثيلهما البيانى في نقطة واحدة فقط فإن هذه العلاقة تمثل دالة.

دالة متعددة التعريف: هي دالة حقيقة يكون لكل مجموعة جزئية من مجالها قاعدة تعريف مختلفة.

اطراد الدوال: تكون الدالة **د تزايدية** في الفترة $[a, b]$ إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$ ، $s_1 < s_2 \Rightarrow d(s_1) < d(s_2)$:

و تكون **د تناقصية** في الفترة $[a, b]$ إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$ ، $s_1 > s_2 \Rightarrow d(s_1) > d(s_2)$

و تكون **د ثابتة** في الفترة $[a, b]$ إذا كان لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$ ، $s_1 < s_2 \Rightarrow d(s_1) = d(s_2)$

الدالة الزوجية والدالة الفردية:

الدالة الزوجية: يقال للدالة د: س —> ص أنها دالة زوجية إذا كان $d(-s) = d(s)$ لـ كل س ، $-s \in S$.

الدالة الفردية: يقال للدالة د: س —> ص أنها دالة فردية إذا كان $d(-s) = -d(s)$ لـ كل س ، $-s \in S$.

خواص هامة:

إذا كان كل من: د ، د₁ دالة زوجية ، وكان كل من: ر ، ر₁ دالة فردية ، فإن:

(١) د₁+ د₂ دالة زوجية (٢) ر₁+ ر₂ دالة فردية.

(٣) د₁ × د₂ دالة زوجية (٤) ر₁ × ر₂ دالة زوجية.

(٥) د₁ × ر₂ ليست زوجية وليس فردية.

الدالة الخطية: أبسط صورها: $d(s) = s$ ويمثلها خط مستقيم يمر بالنقطة (٠، ٠) وميله = ١

الدالة التربيعية: أبسط صورها $d(s) = s^2$ ، نقطة رأس المنحنى هي (٠، ٠)، معادلة محور التماشل س = ٠

الدالة التكعيبية: أبسط صورها $d(s) = s^3$ ، نقطة تماشل منحنيها هي (٠، ٠)

دالة المقاييس: (القيمة المطلقة)

أبسط صورة لدالة المقاييس هي $d(s) = |s|$ ، وتعرف على النحو التالي: $d(s) = \begin{cases} s, & s \leq 0 \\ -s, & s > 0. \end{cases}$

ويمثلها شعاعان يبدأن من النقطة (٠، ٠) ميل أحدهما = ١ وميل الآخر = -١ ويكون:

$$|s| \leq 0, \quad |s| = s, \quad |s|^2 = |s|$$

- ١٠ **الدالة الكسرية:** أبسط صورها هي $D(s) = \frac{1}{s}$ ، نقطة تماثل منحنيها هي $(0, 0)$.
- ١١ **التحولات الهندسية للدالة د، حيث $s = D(s), A < 0$:**
- ﴿ إذا كانت $s = D(s) + A$ فإنها تمثل بإزاحة منحنى د في الاتجاه الموجب لمحور الصادات بمقدار A ﴾
 - ﴿ إذا كانت $s = D(s) - A$ فإنها تمثل بإزاحة منحنى د في الاتجاه السالب لمحور الصادات بمقدار A ﴾
 - ﴿ إذا كانت $s = D(s + A)$ فإنها تمثل بإزاحة منحنى د في الاتجاه السالب لمحور السينات بمقدار A ﴾
 - ﴿ إذا كانت $s = D(s - A)$ فإنها تمثل بإزاحة منحنى د في الاتجاه الموجب لمحور السينات بمقدار A ﴾
 - ﴿ إذا كانت $s = -D(s)$ فإنها تمثل بانعكاس منحنى د في محور السينات. ﴾
 - ﴿ إذا كانت $s = Ad(s)$ فإنها تمثل بتتمدد رأسى لمنحنى د إذا كان $A > 1$ وانكماش رأسى لمنحنى د إذا كان $0 < A < 1$ وانكماش رأسى لمنحنى د إذا كان $A < 0$. ﴾

١٢ خواص مقياس العدد:

- أ $|Ab| = |A| \times |b|$
 - ب $|A + B| \geq |A| + |B|$
 - ج إذا كان $|s| \geq 1, A < 0$ فإن: $-A \leq s \leq A$
 - د إذا كان $|s| \leq 1, A < 0$ فإن: $s \leq A \text{ أو } s \geq -A$
- ١٣ حل المعادلة: لأى دالتين د، تكون مجموعة حل المعادلة $D(s) = R(s)$ هي مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنيهما.
- ١٤ حل المتباينة: هو إيجاد مجموعة قيم المتغير التي تجعل المتباينة صحيحة.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتى:



تمارين عامة

لمزيد من التمارين قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.


اختبار تراكمي


١ ارسم منحني الدالتين d ، s حيث $d(s) = s + 1$ ، $s(s) = 5 - s$ ومن الرسم أوجد:

أ إحدايني نقط تقاطع كل منها مع محور السينات.


ب إحدايني نقطة تقاطع المنحنيين.

ج مساحة المثلث المحدد بالمستقيمين المتتقاطعين ومحور السينات.

٢ استخدم منحني الدالة d حيث $d(s) = |s|$ لتمثيل الدالة s حيث $s(s) = |s - 1| - 2$ ثم أوجد مدى الدالة s .

٣ ارسم منحني الدالة d حيث: $d(s) = \begin{cases} s^2 & \text{لكل } -2 \leq s < 0 \\ 6 & \text{لكل } 2 \geq s \end{cases}$

ومن الرسم عين مدى الدالة وابحث إطراها.



٤ في الشكل المقابل:

أ اكتب إحدايني نقطة رأس المنحني.

ب اكتب قاعدة الدالة.

ج أوجد مدى الدالة وابحث إطراها.

٥ ارسم منحني الدالة d حيث $d(s) = (s-1)^3$ واستنتج من الرسم مدى الدالة واطراها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٦ استخدم منحني الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s}$ لتمثيل الدالة s حيث $s(s) = d(s) + 2$ ثم اكتب نقطة تماثل الدالة الناتجة وابحث اطراها.

٧ إذا كانت الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s+1}$. أوجد مجال الدالة d ونقطة التماثل لمنحني هذه الدالة.
حل المعادلة $d\left(\frac{1}{s}\right) = 4$

٨ أوجد بيانياً مجموعة حل كل من

ب $|s - 4| \leq 3$

أ $|s - 4| = 3$

٩ أوجد جبرياً مجموعة حل كل من المعادلات والمتباينات الآتية:

ب $\sqrt[4]{s^2 - 12} = \sqrt[9]{s + 1}$

أ $|s + 5| = 9$

د $|s^3 + 1| < 7$

ج $|s^2 - 5| \geq 7$

الوحدة الثانية

الأسس واللوغاريتمات وتطبيقاتها

Exponents, Logarithms and their Applications

مقدمة الوحدة

أدخل مفهوم اللوغاريتمات إلى الرياضيات في أوائل القرن السابع عشر، على يد العالم جون نابير، كوسيلة لتبسيط الحسابات؛ ليعتمد عليها بعد ذلك الملحنون والعلماء والمهندسوون وغيرهم لإنجاز حساباتهم بسهولة أكبر ، مستخددين المسطرة الحاسبة، والجداول اللوغاريتمية، كما استفادوا من خواص اللوغاريتمات باستبدال عمليات الضرب لإيجاد لوغاریتم حاصل ضرب عددين بخاصية الجمع وفق الخاصية $\log(s \cdot c) = \log s + \log c$ ، ويرجع الفضل في ذلك للعالم ليونهارت أويلر في القرن الثامن عشر الذي قام بربط مفهوم اللوغاريتم بمفهوم الدالة الأساسية ليتوسخ في مفهوم اللوغاريتمات ويرتبط بالدوال.

ويستفاد من المقياس اللوغاريتمي في مجالات واسعة، فعلى سبيل المثال الديسيبل هو وحدة لوغاريتمية لقياس شدة الصوت، ونسبة القولون، كما يستخدم الأس الهيدروجيني (وهو مقياس لوغاريتمي) في الكيمياء لتحديد حمضية محلول ما.

مخرجات تعلم الوحدة

في نهاية هذه الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- ❖ يستنتج العلاقة بين الدالة الأساسية والدالة اللوغاريتمية بيانياً.
- ❖ يتعرف الدالة الأساسية.
- ❖ يتعرف التمثيل البياني للدالة الأساسية، ويستنتاج خواصها.
- ❖ يتعرف قوانين اللوغاريتمات.
- ❖ يحل معادلات لوغاریتمية.
- ❖ يتعرف قوانين الأسـس الكسرية.
- ❖ يحل معادلة أساسية على الصورة: $a^x = b$.
- ❖ يحل معادلة لوغاریتمية.
- ❖ يتعرف الدالة اللوغاريتمية.
- ❖ يتحول جريأً من الصورة الأساسية إلى الصورة اللوغاريتمية
- ❖ يستخدم الآلة الحاسبة في حل بعض المعادلات الأساسية .
- ❖ يتعرف التمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية في فترات محدودة، ويستنتاج خواصها.

المصطلحات الأساسية

Reflection	انعكاس	\Rightarrow	Exponential Function	دالة أسيّة.	\Rightarrow	The n^{th} Power	القوة التنوينية
Logarithm	لوجاریتم	\Rightarrow	Exponential Growth	نمو إسني.	\Rightarrow	Base	الأساس
Logarithmic Equation	معادلة لوجاریتمية.	\Rightarrow	Exponential Decay	تضاؤل أسيّة.	\Rightarrow	Exponent	الأس
Logarithmic Function	دالة لوجاریتمية	\Rightarrow	Domain	مجال	\Rightarrow	n^{th} Root	جذر نوني
			Range	مدى	\Rightarrow	Rational – Exponent	أُس كسرى

الأدوات والوسائل

آلة حاسبة علمية - برامج رسومية geogebra-graph

دروس الوحدة

١ - الأسس الكسرية


٢ - الدالة الأسية وتمثيلها البياني وتطبيقاتها

٣ - حل المعادلات الأسية

٤ - الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني

٥ - بعض خواص اللوغاريتمات

مخطط تنظيمي للوحدة



الأسس الكسرية

Rational Exponents

تمهيد

سبق أن درست الجذور التربيعية لعدد حقيقي غير سالب، وتعرفت على بعض خواص الجذور التربيعية والتكعيبية، ودرست الأسس الصحيحة وتعرفت على بعض خواصها، وسوف تتعرف في هذا الدرس على الأسس الكسرية.

تعلم

الأسس الصحيحة:

١ لكل $a \in \mathbb{C}$ ولكل $n \in \mathbb{N}$ فإن:

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (\text{حيث العامل مكرر من المرات})$$

ويسمى (a^n) بالقوة التوانية للعدد a ، حيث يسمى العدد a **بالأس**، والعدد n **بالأس** ونقول **أمرفوع للأس n** .

$$\text{لكل } a \in \mathbb{C} \quad \text{ا صفر} = 1 \quad \text{٢}$$

$$a^0 = 1 \quad \text{٣}$$

سوف تتعلم

- ▶ تعليم قوانين الأسس.
- ▶ الجذر التواني.
- ▶ قوانين الأسس الكسرية.

المصطلحات الأساسية

The n^{th} Power	القوة التوانية
Base	الأساس
Exponent	الأس
n^{th} Root	جذر نوني
Rational Exponent	أس كسري

خواص الأسس الصحيحة:

لكل $m, n \in \mathbb{N}$ ، $a, b \in \mathbb{C}$ ، $b \neq 0$ فإن:

$$(ab)^m = a^m b^m \quad \text{٤}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad \text{٥}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \text{٦}$$

مثال

١ أوجد في أبسط صورة المقدار الآتي = $\frac{(-18)^{\frac{2}{3}} \times (-8)^{\frac{3}{2}}}{(-16)^{\frac{3}{4}} \times 81}$

الحل

$$\text{المقدار} = \frac{(-18)^{\frac{2}{3}} \times (-8)^{\frac{3}{2}}}{(-16)^{\frac{3}{4}} \times 81} = \frac{(-18)^{\frac{2}{3}} \times (-8)^{\frac{3}{2}}}{(-16)^{\frac{3}{4}} \times 81}$$

$$= (-18)^{\frac{2}{3}} \times (-8)^{\frac{3}{2}} \times 81^{-1}$$

$$= 1 \times 2 \times (-3)^{12} =$$

الأدوات المستخدمة

- ▶ آلة حاسبة علمية
- ▶ برامج رسومية

حاول أن تحل

١ أوجد في أبسط صورة قيمة المقدار:

$$\frac{^2(12) \times ^3(-27)}{^4(-81) \times ^1(16)} = \frac{^1+^3 \times ^3 \times ^2}{^18 \times ^3}$$

٢ أثبت أن:

تعلم**الجذر التنوبي**

علمت أن الجذر التربيعى لعدد ما هو عملية عكssية لتربيع ذلك العدد، وبالمثل فإن الجذر التنوبي لعدد هو العملية العكssية لرفع هذا العدد للقوة (n).

مثال:

- | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| $2 = \sqrt[3]{8}$
$2 = \sqrt[5]{32}$
$\sqrt[n]{s} = s$ | أى أن
أى أن
أى أن | $s^3 = 8$
$s^5 = 32$
$s^n = 1$ | فإذا كانت
فإذا كانت
فإذا كانت | فإن 2 هو الجذر التكعيبى للعدد 8
فإن 2 هو الجذر الخامس للعدد 32
فإن s هو الجذر التنوبي للعدد 1 |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|

لاحظ أن



رمز الجذر
العدد داخل
الجذر

لأى عدد حقيقي $a < 0$ ، $n \in \mathbb{N}$ ص $-$ { 1 } يكون $\sqrt[n]{a} =$

هذه العلاقة صحيحة أياًً عندما $a > 0$ ، n عدد صحيح فردى أكبر من 1

مثال:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{9} &= (-9)^{\frac{1}{3}} \\ -3 &= \sqrt[3]{-243} = (-243)^{\frac{1}{3}} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \sqrt[4]{16} &= (16)^{\frac{1}{4}} \\ -2 &= \sqrt[3]{-27} = (-27)^{\frac{1}{3}}$$

مثال

٢ إذا كانت $s^n = 1$ فأوجد قيم s فى n (إن وجدت) فى كل من الحالات الآتية:

أ $n = 1, 4, 5$ = صفر **ب** $n = 4, 5$ =

ج $n = 2, 4$ = **د** $n = 3, 5$ =

الحل

$s = 0$	وتكون	$s = 0$	فإن $s = 0$	أ عندما $n = 1, 4, 5$ = صفر
$s = \pm\sqrt[4]{81}$	وتكون	$s^4 = 81$	$s = \pm\sqrt[4]{81}$	ب عندما $n = 4$ =
$s = \pm\sqrt[4]{-243}$	وتكون	$s^4 = -243$	$s = \pm\sqrt[4]{-243}$	ج عندما $n = 4$ =
$s = \pm\sqrt[3]{-8}$	وتكون	$s^3 = -8$	$s = \pm\sqrt[3]{-8}$	د عندما $n = 3$ =

نستنتج من المثال السابق أن:

إذا كانت $s^n = 1$ فإن قيم s التي تتحقق المعادلة تتضمن الجدول التالي:

$\sqrt[n]{s}$	أ	ب
$\sqrt[n]{s} = صفر$	0	$n \in \mathbb{C}^+ - \{1\}$
يوجد جذران حقيقيان هما $\pm \sqrt[n]{s}$	$1 < 0$	عدد صحيح زوجي موجب
لاتوجد جذور حقيقية.	$1 > 0$	عدد صحيح زوجي موجب
يوجد جذر حقيقي واحد فقط هو $\sqrt[n]{s}$	$1 \in \mathbb{Q}$	عدد صحيح فردي موجب، $n \neq 1$

حاول أن تحل ٤

أوجد قيم s في كل مما يأتي (إن وجدت):

ج) $s^3 = 125$

ب) $s^0 = 32$

أ) $s^2 = 36$

د) $s^7 = 128$

هـ) $s^2 = 49$

ـ) $s^4 = 1296$

تفاوت: وضح بمثال عدد الفرق بين الجذر السادس للعدد أ وبين $\sqrt[7]{s}$:

إذا كان $n \in \mathbb{C}^+ - \{1\}$ ، $m \in \mathbb{C}^+$ ، $\sqrt[n]{s} = 1$ فإن: $\sqrt[n]{s} = \sqrt[m]{s}$.

مثال:

$$64 = 4^3 = (\sqrt[3]{64})^3 = (\sqrt[6]{64})^6 = 64^{\frac{3}{6}}$$

$$25 = 5^2 = (\sqrt[2]{25})^2 = (\sqrt[10]{25})^{10} = 25^{\frac{2}{10}}$$

مثال

أوجد في أبسط صورة كلاً من:

ب) $\sqrt[6]{(3+2i)(64)} \pm$

ـ) $\sqrt[9]{-18i} \pm$

الحل

$$\sqrt[3]{(3+2i)8} \pm = \sqrt[3]{2(3+2i)^2} \pm = \sqrt[3]{-18i} \pm$$

$$\sqrt[6]{[(3+2i)8]} \pm = \sqrt[6]{(3+2i)64} \pm$$

$$= \sqrt[3]{(3+2i)8} \pm$$

حاول أن تحل ٥

أوجد في أبسط صورة كلاً من:

ج) $\sqrt[7]{(1+b)(128)}$

ب) $\sqrt[6]{243-b^6}$

ـ) $\sqrt[4]{1625}$

Using The Modulus

استخدام المقياس

يستخدم مقياس العدد إذا كان دليل الجذر (n) عدداً زوجياً فيكون $\sqrt[n]{a} = b$, أما إذا كان دليل الجذر عدداً فردياً فلا داعي لاستخدام المقياس.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{إذا كان } n \text{ زوجياً} \\ \text{إذا كان } n \text{ فردياً} \end{array} \right. \Rightarrow \sqrt[n]{a} = b$$

مثال

٤ أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

لاحظ أن

مربع أي من العددين
(+) أو (-) هو 2

ب $\sqrt[3]{8-s^2}$
٥ $\sqrt[6]{(7-s^2)^2}$

أ $\sqrt[2]{s^3}$
ج $\sqrt[4]{(3s^2-2)^4}$

الحل

أ $\sqrt[2]{s^3} = \sqrt[2]{s(s^2)} = \sqrt[2]{s}\sqrt[2]{s^2}$
ب $\sqrt[3]{s^2-s} = \sqrt[3]{s^2(1-\frac{1}{s})} = \sqrt[3]{s^2}\sqrt[3]{1-\frac{1}{s}}$

ج $\sqrt[4]{3s^2-2} = \sqrt[4]{3s^2-2^2} = \sqrt[4]{(3s^2-2)^2}$ حيث $2 < 3s^2-2$

٥ $1 < \sqrt[7]{s} = \sqrt[7]{s-1} = \sqrt[7]{(s-1)^7}$ حيث $1 < s-1$

٦ حاول أن تحل

٦ أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

ب $\sqrt[18]{(s-2)^2}$
٥ $\sqrt[4]{(5s-2)^4}$

أ $\sqrt[12]{4}$
ج $\sqrt[3]{(5s-2)^3}$

إذا كان $s \in \{-1, 0\}$, $s \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$ فإن: $\sqrt[3]{\frac{1}{s}} = \frac{1}{\sqrt[3]{s}}$

مثال: $\sqrt[3]{4} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}, \quad \sqrt[3]{7} = \frac{1}{\sqrt[3]{7}}$

إذا كان $s \in \{-1, 0\}$, $s \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$ عددين حقيقيين فإن:

$\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}$

حيث $b \neq 0$ $\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \frac{1}{\sqrt[3]{b/a}}$

مثال

٥ أوجد في أبسط صورة كلاً من:

$$\frac{\sqrt[3]{8} \times \sqrt[5]{-32}}{\sqrt[8]{16} \times \sqrt[4]{4}}$$

ب

$$\frac{\sqrt[3-2 \times 1-4 \times 1]{8}}{\sqrt[2 \times 3-6]{6}}$$

الحل

$$\text{المقدار} = \frac{\sqrt[3-2 \times 1-4 \times \frac{1}{2} \times 2]{8}}{\sqrt[2 \times 3-6]{6}}$$

$$= \frac{\sqrt[3-2 \times 1-4 \times (\frac{1}{2} \times 2)]{8}}{\sqrt[2 \times 3-6 \times (2 \times 3)]{6}}$$

$$= \frac{\sqrt[3-2 \times 2-2 \times \frac{3}{2}]{8}}{\sqrt[2 \times 3-2 \times 2-3]{6}}$$

$$= 2 - 2 \times 3 \times 2 + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} =$$

$$= 2 \times 3 \times \text{صفر} = 1$$

تحويل الجذور إلى أسسٍ كسرية.

$$\text{المقدار} = \frac{\sqrt[3]{8} \times \sqrt[5]{32}}{\sqrt[8]{16} \times \sqrt[4]{4}}$$

تحليل كل أساس إلى عوامله الأولية.

$$= \frac{\sqrt[3]{(2^3) \times \sqrt[5]{(2^5) \times (2^2)}}}{\sqrt[8]{(2^4) \times \sqrt[4]{(2^2) \times (2^2)}}}$$

$$= \frac{\sqrt[3]{2^3 \times 2^2}}{\sqrt[8]{2^2 \times \frac{3}{2}}} =$$

٦ حاول أن تحل

٧ أوجد في أبسط صورة كلاً من :

$$\frac{\sqrt[3-8 \times 243]{8}}{\sqrt[9-6 \times 24]{6}}$$

ب

$$\text{أ} = \frac{\sqrt[3-8 \times 243]{8}}{\sqrt[9-6 \times 24]{6}}$$

حل المعادلات:

مثال

٨ أوجد في مجموعة حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$8 = \sqrt[3]{(1+s)}$$

ب

$$9 = \sqrt[3]{s}$$

الحل

رفع الطرفين للقوة ٣

$$\therefore s^{\frac{3}{2}} = 9$$

$$\therefore (s^{\frac{3}{2}})^3 = 9$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$\therefore s^2 = 9$$

$$\therefore s = \pm 3$$

$$\therefore |s| = \sqrt{27}$$

$$\therefore s = \pm \sqrt{27}$$

مجموعة الحل = {٢٧، -٢٧}.

برفع الطرفين للقوة ٤

(س + ١) $\frac{1}{4}$ = ب∴ (س + ٣) $\frac{1}{4}$ = ٨∴ (س + ١) $\frac{1}{4}$ = ٨

∴ س = ١٥ ∴ مجموعه الحل = {١٥}

١٥ = س

٤ = س + ١

حاول أن تحل ٤

٨ أوجد في ع مجموعه حل كل من المعادلات الآتية:

$$\frac{1}{32} = \sqrt[4]{(س - ١)^{\circ}}$$

$$٣٢ = س^{\frac{1}{4}}$$

مثال

٧ **الربط بالهندسة:** إذا كان ل طول ضلع المربع الذي مساحته م يعطى بالعلاقة $L = M^{\frac{1}{2}}$

أ احسب طول ضلع المربع الذي مساحته ٢٥ سم

ب احسب طول ضلع المربع الذي مساحته ١٧ سم مقاربا الناتج لرقم عشرى واحد.

الحل

$$L = \sqrt{\frac{1}{4} \times ١٢٣١٠} \approx \sqrt{١٧٦} = ١٧ \quad \text{ب}$$

$$L = \sqrt{\frac{1}{4} \times ٢٥٦} = ٥ \quad \text{أ}$$

وبالتقريب لرقم عشرى واحد

حاول أن تحل ٩

٩ إذا كان ل طول ضلع مكعب حجمه يعطى بالعلاقة $L = U^{\frac{1}{3}}$ أوجد طول ضلع المكعب الذي حجمه ٢٧

تمارين ٢ - ١

١ اكتب كلاً مما يأتي على صورة أسيبة:

$$\sqrt[3]{٦٢} \quad \text{ج}$$

$$\sqrt[٣]{٤} \quad \text{ب}$$

$$\sqrt[٣]{٦} \quad \text{أ}$$

$$\frac{\sqrt[٣]{٦}}{\sqrt[٣]{٣}} \quad \text{و}$$

$$\sqrt[٣]{٦} \quad \text{هـ}$$

$$\sqrt[٣]{٤٢} \quad \text{دـ}$$

$$\sqrt[٣]{٦} \quad \text{صـ}$$

$$\sqrt[٣]{٢} \quad \text{بـ}$$

$$\sqrt[٣]{٢} \quad \text{أـ}$$

$$\sqrt[٣]{٥} \quad \text{وـ}$$

$$\sqrt[٣]{٣} \quad \text{هـ}$$

$$\sqrt[٣]{٨} \quad \text{دـ}$$

٢ اكتب كلاً مما يأتي على صورة جذرية:

$$\sqrt[٤]{٦} \quad \text{جـ}$$

$$\sqrt[٤]{٢} \quad \text{بـ}$$

$$\sqrt[٤]{٦} \quad \text{أـ}$$

$$\sqrt[٤]{٣٢} \quad \text{بـ}$$

٣ أوجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$\sqrt[٤]{٢٧} \quad \text{جـ}$$

$$\sqrt[٤]{٣٢} \quad \text{بـ}$$

$$\sqrt[٣]{١٦} \quad \text{أـ}$$

$$\frac{١}{\sqrt[٤]{٨ \times \sqrt[٢]{٤ \times \sqrt[٢]{٢}}} \quad \text{وـ}$$

$$\sqrt[٤]{٤} \quad \text{هـ}$$

$$\frac{١}{\sqrt[٤]{٨}} + \frac{١}{\sqrt[٣]{٨}} \quad \text{دـ}$$

٤) أوجد في أبسط صورة ناتج العمليات الآتية:

$$\frac{1}{2}(24 + 23) \quad \text{ج}$$

$$b) \sqrt[3]{a^2} \times a^{\frac{1}{3}}$$

$$a) \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$h) (s^{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{c})(s^{\frac{1}{3}} + \sqrt[3]{c})$$

$$z) \frac{1}{2}(33 + 32)$$

$$d) (s^{\frac{1}{3}} + \sqrt[3]{c})(s^{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{c})$$

$$w) (s^{\frac{1}{2}} + s^{\frac{1}{3}})^2$$

٥) اختصر كلاً مما يأتي لأبسط صورة:

$$\frac{1}{2}(8) \div \frac{1}{2}(16) \quad \text{ج}$$

$$w) \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$b) \left(\frac{729}{8}\right) \times \frac{1}{2}\left(\frac{16}{11}\right)$$

$$h) 2,51 \times 0,216 \times 0,18$$

$$a) \frac{512}{6} + \frac{243}{6}$$

$$d) \frac{1}{2}(64) - \frac{1}{2}(27)$$

$$j) \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}$$

$$z) (15) \times \frac{1}{2} \times (125) \times \frac{1}{2}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

٦) إذا كان $\sqrt[3]{s^2} = 9$ فإن $s =$

$$\phi \quad \text{د}$$

$$\{1\} \quad \text{ج}$$

$$\{27, -27\} \quad \text{ب}$$

$$\{27\} \quad \text{أ}$$

$$= \frac{1}{2} - 64 \quad \text{هـ}$$

$$\frac{1}{2} - \quad \text{د}$$

$$\frac{1}{2} \quad \text{ج}$$

$$2 - \quad \text{بـ}$$

$$2 \quad \text{أـ}$$

$$= \sqrt[3]{s^2} \quad \text{هـ}$$

$$|s| - \quad \text{د}$$

$$|s| \quad \text{جـ}$$

$$s - \quad \text{بـ}$$

$$s^{\frac{1}{2}} \quad \text{أـ}$$

$$= \sqrt[4]{s^4} \quad \text{هـ}$$

$$|s|^{\frac{1}{2}} \quad \text{دـ}$$

$$|s|^{\frac{1}{2}} \quad \text{جـ}$$

$$s^{\frac{1}{2}} \pm \quad \text{بـ}$$

$$s^{\frac{1}{2}} \quad \text{أـ}$$

٧) إذا كان $s^{-\frac{3}{2}} = 8$ فإن $s =$

$$\frac{1}{4} - \quad \text{دـ}$$

$$\frac{1}{4} \quad \text{جـ}$$

$$4 - \quad \text{بـ}$$

$$4 \quad \text{أـ}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} - 6}{36} \quad \text{هـ}$$

$$\frac{1}{6} \quad \text{دـ}$$

$$\frac{1}{6} \quad \text{جـ}$$

$$6 \quad \text{بـ}$$

$$6 \quad \text{أـ}$$

(١٢) أوجد في ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:

$$27 = \sqrt[3]{s^2} \quad \text{ج}$$

$$\frac{1}{128} = s^{\frac{7}{3}} \quad \text{ب}$$

$$5 = s^{\frac{1}{3}} \quad \text{أ}$$

$$\frac{16}{27} = s^{-\frac{3}{2}} \quad \text{و}$$

$$\frac{3}{8} = s^{-\frac{3}{4}} \quad \text{هـ}$$

$$32 = (s-5)^{\frac{5}{2}} \quad \text{دـ}$$

(١٣) **الربط بالاقتصاد:** إذا علم أن الفائدة (ر) لأحد البنوك على مبلغ وقدره (أ) بعد (ن) سنة تعطى بالعلاقة $r = \left(\frac{A}{P}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$ حيث جـ جملة المبلغ بعد ن سنة . فإذا أودع جمال مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه وبعد ٣ سنوات أصبح جملة المبلغ ١٢٥٩٧ ، أوجد النسبة المئوية السنوية للفائدة .

(١٤) **اكتشف الخطأ:**

$$s^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{s^3} \quad \text{بـ}$$

$$\text{إذا كان } s^{\frac{3}{4}} = 4 , \text{ فإن } s = 8 \quad \text{أـ}$$

(١٥) اختصر المقدار: $\frac{17}{171}$

(١٦) **نشاط:**

استخدم الآلة الحاسبة في تبسيط إجراء العمليات الآتية (مقرباً الناتج لرقمين عشريين):

$$\frac{\sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{1-2^6}}{\sqrt[3]{4^6}} \quad \text{بـ}$$

$$75(1,21)^{\frac{19}{2}} \quad \text{أـ}$$

(١٧) **الربط بالتجارة:** بدأ محمد مشروع تربية الأرانب، فإذا كان عدد الأرانب في بداية المشروع هو ٧٥ أرنبًا وكان عدد الأرانب في تكاثرها يتبع العلاقة $U = 75(4,22)^{\frac{n}{2}}$ حيث ن عدد الأشهر . أوجد العدد المتوقع للأرانب بعد مرور ٥ أشهر .

(١٨) **الربط بالجروم:** إذا كان طول ضلع المكعب L يتحدد بالعلاقة $L = 4U$ حيث U حجم المكعب بالوحدات المكعبة . أوجد طول ضلع مكعب حجمه ١٣٣١ سم^٣

تفكير إبداعي:

(١٩) **الربط بالجروم:** إذا كان نصف طول قطر كرة مع حجمها يعطى بالعلاقة $u = \frac{\pi r^3}{4}$.

أـ أوجد طول نصف قطر كرة حجمها ٢٧٠٠٠ سم^٣ .

بـ احسب التغير في حجم الكرة عند زيادة طول نصف القطر إلىضعف.

الدالة الأسية وتطبيقاتها

Exponential Function and its Application

تمهيد

كثيراً ما نتعامل في حياتنا عن أمور تتطلب حسابات دقيقة مثل الفوائد البنكية والزيادة السكانية وتکاثر الخلايا في بعض الكائنات وفترات عمر النصف للذرات المشعة وغيرها، وتلك هذه الأمور تتطلب مفهوم الدالة الأساسية التي سوف نتناولها في هذا الدرس ونعرض بعض خواصها.

لاحظ أن



تعلم

الدالة الجبرية : يكون المتغير المستقل (s) هو الأساس أما الأسس فهو عدد حقيقي.
الدالة الأساسية : يكون المتغير المستقل (s) هو الأساس أما الأساس فهو عدد حقيقي موجب لا يساوي الواحد.

Exponential Function

الدالة الأساسية

إذا كان a عدداً حقيقياً موجباً $\neq 1$ فإن الدالة:
د حيث $d: s \rightarrow a^s$, $d(s) = a^s$
تسمى دالة أساسية اساسها a

تعبير شفهي: وضح لماذا لا تمثل الدالة $d(s) = (-3)^s$ حيث $s \in \mathbb{R}$ دالة أساسية

التمثيل البياني للدالة الأساسية


مثال

بالاستعانة بقيم $s \in [-3, 3]$ ارسم في شكل واحد جزءاً من منحنى كل من الدالتين:

$$d(s) = 2^s, r(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$$

الحل

s	$d(s)$	$r(s)$
3	$2^3 = 8$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
2	$2^2 = 4$	$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$
1	$2^1 = 2$	$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$
0	$2^0 = 1$	$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$
-1	$2^{-1} = \frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$
-2	$2^{-2} = \frac{1}{4}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$
-3	$2^{-3} = \frac{1}{8}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$



من الرسم يمكن استنتاج الخواص الآتية للدالة الأساسية

١ الدالة $d: s \rightarrow 2^s$ متزايدة على مجالها لأن $(a > 1)$

الدالة $r: s \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^s$ متناقصة على مجالها لأن $(0 < a < 1)$

٢ مدى كل من الدالتين هو \mathbb{R}^+

٣ منحنى الدالة $d: s \rightarrow 2^s$ هو صورة منحنى الدالة

$r: s \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^s$ بالانعكاس في محور الصادات.

المصطلحات الأساسية

- Exponential Function دالة أساسية.
- Exponential Growth نمو أسي.
- Exponential Decay تضاؤل أسي.

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية

اضف إلى معلوماتك

تسمى الدالة الأساسية $d(s) = a^s$ في حالة $a > 1$ بدالة النماء (growth function) وبكثير من التطبيقات الحياتية مثل التزايد السكاني والفائدة المركبة للبنوك.

وتسمى الدالة الأساسية $d(s) = a^s$ في حالة $0 < a < 1$ بدالة التضاؤل (decay) وترتبط بكثير من التطبيقات مثل فترة عمر النصف للذرات المشعة.

حاول أن تحل

- ١** بالاستعانة بقيم $s \in \{-2, 2\}$ ارسم في شكل واحد منحنى كُلّ من الدوال $d(s) = s^3$ ، $d(s) = s^4$

مثال

- ٢** إذا كانت $d(s) = s^3$ فأكمل مايأته :

$$\dots = d(s) \times d(-s) \quad \text{ج} \quad d(s) \times s^3 = \dots \quad \text{ب} \quad d(s+2) = \dots \quad \text{أ}$$

الحل

$$s^3 \times 9 = 2^3 \times s^3 = 2^{+3} \quad \text{ب} \quad 9 = 2^3 = \dots \quad \text{أ}$$

$$d(s) \times d(-s) = s^3 \times s^{-3} = s^0 = 1 \quad \text{ج}$$

تطبيقات على الدالة الأسية:**Exponential Growth****أولاً: النمو الأسني**

يمكن استخدام الدالة d حيث $d(n) = A(1+r)^n$ لتمثيل النمو الأسني لكمية A بنسبة مئوية ثابتة r في فترات زمنية متساوية عددها n . (ناقش معلمك في استنتاج هذه العلاقة):

الربح المركب:

عند حساب جـ جملة مبلغ A مستثمر في أحد البنوك التي تعطى ربح سنوي مركب r (نسبة مئوية) لعدد n من السنوات بفترات تقسيم العائد السنوي إلى س فترة فإن جملة المبلغ تعطى بالعلاقة :

$$J = A \left(1 + \frac{r}{S}\right)^n$$

٣ أودع رجل مبلغ ٥٠٠٠ جنيه في أحد البنوك التي تعطى فائدة سنوية مركبة قدرها ٨٪، أوجد جملة المبلغ بعد مرور عشرة أعوام في كُلّ من الحالات الآتية:

$$\text{جـ العائد شهري.} \quad \text{بـ العائد سنوي.} \quad \text{أـ العائد سنوي.}$$

الحل

باستخدام العلاقة $J = A(1 + \frac{r}{S})^n$ حيث س التقسيم السنوي:

$$\text{أـ العائد سنوي} \quad \therefore S = 1$$

$$J = 5000 \left(1 + \frac{0.08}{1}\right)^{10} = 10794.62 \text{ جنيه}$$

$$\text{بـ العائد ربع سنوي} \quad \therefore S = 4$$

$$J = 5000 \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{4 \times 10} = 11040.2 \text{ جنيه}$$

ج العائد شهري $\therefore S = 12$

$$J = 5000 \left(1 + \frac{8}{12 \times 10} \right)^8 = 11098,2 \text{ جنيه}$$

٤ حاول أن تحل

٢ أودع رجل مبلغ ١٠٠٠ جنيه في أحد البنوك التي تعطى فائدة سنوية مركبة قدرها ٥٪، أوجد جملة المبلغ بعد مرور ٨ سنوات في كل من الحالات الآتية:

- أ** العائد سنوي. **ب** العائد نصف سنوي. **ج** العائد شهري.

Exponential Decay

ثانيةً: التضاؤل الأسني

يمكن استخدام الدالة $D(L) = A(1 - r)^n$ والتي أساسها أقل من الواحد وأكبر من الصفر لتمثيل التضاؤل الأسني بنسبة مؤية ثابتة قدرها في فترات زمنية متساوية، عددها n .

مثال

٤ إذا بلغ أقصى إنتاج لمنجم من الذهب في السنة هو ١٨٥٠ كجم، وأخذ هذا الإنتاج في التناقص سنويًا بنسبة ٩٪.

- أ** اكتب دالة أسيّة تمثل إنتاج الذهب من هذا المنجم بعد n سنة.
ب قدر لأقرب كجم إنتاج المنجم بعد مرور ٨ سنوات.

الحل

$$A = 1850, \quad r = 0,09$$

$$\text{أ دالة التضاؤل الأسني } D(L) = A(1 - r)^n$$

$$D(L) = 1850 \cdot (0,09)^n$$

ب بعد مرور ٨ سنوات (بالتعميّض عن $L = 8$)

$$\therefore D(8) = 1850 \cdot (0,09)^8 \approx 870 \text{ كجم}$$

٤ حاول أن تحل

٢ إذا كان السعر السوقى لسيارة يتناقص طبقاً للعلاقة $S = 150000 \cdot (0,94)^n$ حيث س سعر السيارة بالجنيه في الزمن بالسنوات من لحظة شرائها. أوجد :

- أ** سعر السيارة عند شرائها جديدة.
ب سعر السيارة بعد مرور ٣ سنوات من شرائها.



تمارين ٢ - ٢



١ ارسم الشكل البياني لكل من الدوال الآتية، ثم أوجد المجال والمدى لكل منها ويبين: أي منها تكون متزايدة وأي منها متناقصة

٥ $d(s) = 2^{-s+1}$

ج $d(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$

ب $d(s) = s^3$

أ $d(s) = s^2$

٢ أكمل ما يأتى:

- أ الدالة $d : d(s) = 2^s$ تقطع محور الصادات في النقطة
- ب الدالة $d : d(s) = 2^{-s}$ تقطع محور الصادات في النقطة
- ج إذا منحني الدالة $d : d(s) = s^3$ بالنقطة $(1, 3)$ فإن $A =$
- د منحني الدالة $d : d(s) = s^3$ هو صورة منحني الدالة $r : r(s) = \left(\frac{1}{3}\right)^s$ بالانعكاس في
- هـ الدالة d حيث $d(s) = s^3$ تكون تناصصية إذا كان $A \in$
- وـ الدالة d حيث $d(s) = (12)^s$ تكون متزايدة عندما $A \in$

٣ **الربط بالسكان:** إذا كان عدد سكان إحدى الدول في نهاية عام ٢٠٠٠ هو ٤٣٢٦٥٣٤١ نسمة، وكان معدل الزيادة السكانية في السنة يُساوى ١,٥٪ :

- أـ أوجد صيغة تمثل عدد السكان لهذه الدولة بعد مرور n سنة من عام ٢٠٠٠.
- بـ استخدم هذه الصيغة لإيجاد عدد السكان المتوقع لهذه الدولة عام ٢٠٢٠، وذلك إذا استمرت الزيادة بنفس المعدل.

٤ **الربط بالاستثمار:** إذا استثمر رجل مبلغ مليون جنيه في مشروع، بحيث ينمو هذا المبلغ تبعًا لدالةٍ إكسية بزيادة سنوية قدرها ٦٪، أوجد :

- أـ صيغة توضح نماء هذا المبلغ بعد n سنة.
- بـ قدر هذا المبلغ بعد مرور ١٠ سنوات.


٥ أوجد جملة مبلغ ٨٠٠٠ جنيه موضوع في بنك يعطى فائدة سنوية ٥٪ مركبة قدرها ٥٪ لمرة ٧ سنوات.

٦ **الربط بالثروة السمكية:** إذا كان عدد أسماك السلمون في إحدى البحيرات يتزايد تبعًا لدالة النمو الأسلي $d : d(n) = 2^{0.03n}$ حيث n عدد الأسابيع أوجد عدد أسماك السلمون في هذه البحيرة بعد مرور ٨ أسابيع.

٧ إذا كانت $d(s) = s^5$ أثبت أن $\frac{d(s) \times d(s-1)}{d(s-2) \times d(s-1)} = 5^{s+1}$

حل المعادلات الأسيّة

Solving Power Equations



فكرة و ناقش

تتكاثر الأميا بطريقة الانقسام الثنائي بحيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خلتين بعد فترة زمنية ثابتة، ثم تنقسم كل خلية جديدة إلى خلتين بعد نفس الفترة الزمنية، وفي نفس الشروط وهكذا.....

- ١ أوجد عدد الخلايا الناتجة من خلية واحدة بعد ٩ فترات زمنية.
- ٢ أوجد عدد الفترات الزمنية اللازمة لإنتاج ٨١٩٢ خلية من هذه الخلية.

تعلم

Power Equation

المعادلة الأسيّة

إذا تضمنت المعادلة متغيراً في الأس فإنها تسمى معادلة أسيّة مثل ($s^x = 8$)

حل المعادلات الأسيّة :

أولاً: إذا كان $a^x = m$ فإن $x = \log_a m$.

مثال

- ١ أوجد في المجموعة حل كل من المعادلات الآتية:

$$b) \quad s^{-3} = \left(\frac{1}{27}\right)^{-2}$$

$$a) \quad 8 = s^{3+2}$$

الحل

$$\therefore s^{-2} = 2^{3+0} \quad a)$$

$$\therefore s = 3 + 0$$

ومنها $s = 3$

\therefore مجموعه الحل = {3}

$$b) \quad s^{-3} = \left(\frac{1}{27}\right)^{-2} \quad \therefore s^{-3} = 0^{-2}$$

$$\therefore s = 3 - 2$$

ومنها $s = \frac{1}{3}$

$$\therefore s = 2$$

\therefore مجموعه الحل = $\{\frac{1}{3}\}$

المصطلحات الأساسية

Power Equation ▶ معادلة أسيّة.

Graphical Solution ▶ حل بياني.

الأدوات المستخدمة

إلة حاسبة علمية

برامج رسومية

حاول أن تحل**١** أوجد في ح مجموعه حل كل من المعادلات الآتية:

$$\frac{1}{8} = 2^{-x}$$
ب

$$25 = 5^{x+1}$$
أ

ثانيًا: إذا كان $a = b$ حيث $a, b \in \{1, 0, -1\}$ ،
إما: $m = 0$ صفر
أو: $a = b$ عندما m عدد فردي.
 $a = \pm b$ عندما m عدد زوجي.

مثال**٢** أوجد في ع مجموعه حل كل من المعادلات الآتية:

$$4^x = 3^2$$
ب

$$7^x = 3^2$$
أ

الحل

$$7^x = 3^2$$
أ

 $\therefore x + 2 = 0$ صفر

 $\therefore x = -2$ ومنها

 $\therefore \text{مجموعه الحل} = \{-2\}$

$$4^x = 3^2 \quad (3^2 = 4^{x-2})$$
ب

$$4^x = 9^2$$

 $\therefore x - 2 = 0$ صفر

 $\therefore x = 2$ ومنها

 $\therefore \text{مجموعه الحل} = \{2\}$
حاول أن تحل**٣** أوجد في ع مجموعه حل المعادلة:

$$2^x = 7^2$$
ب

$$5^x = 1^2$$
أ

مثال**٤** إذا كانت $d(s) = s^2$ أوجد قيمة s التي تتحقق $d(s) = 32$ **الحل**

$$d(s) = 32$$

$$s^2 = 32$$

$$s = \sqrt{32}$$

$$s = \pm 4$$


حاول أن تحل**٥** إذا كانت $d(s) = s^7$ ، أوجد قيمة s التي تتحقق $d(s) = 49$

Solving the Exponential Equations Graphically

حل المعادلات الأسيّة بيانياً:



- ٤ ارسم في شكل واحد المنحني البياني لكلا من الدالتين d_1 حيث $d_1(s) = s^2$ ، d_2 حيث $d_2(s) = -s + 6$ ومن الرسم أوجد مجموعة حل المعادلة $s^2 = -s + 6$.



الحل

٣	٢	١	٠	$\frac{١}{٢}$	$\frac{٢}{٤}$	$\frac{٣}{٨}$	s
٨	٤	٢	١	$\frac{١}{٢}$	$\frac{٢}{٤}$	$\frac{٣}{٨}$	s^2
٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	$-s + 6$

من الرسم: الإحداثي السيني لنقطة التقاطع يساوي ٢
 \therefore مجموعة حل المعادلة = {٢}.

٥ حاول أن تحل

- ٤ باستخدام أحد البرامج الرسومية (geogebra) ارسم في شكل واحد كلا من الدالتين $d_1(s) = s^2$ ، $d_2(s) = 3$ ومن الرسم أوجد مجموعة حل المعادلة $s^2 = 3$.



- ٥ **الربط بالحياة:** يتكرر أحد الكائنات الدقيقة بطريقة الانقسام الثنائي بحيث تتضاعف عدد هذه الكائنات كل ساعة نتيجة انقسام كل خلية إلى خلتين، فإذا كان عدد الخلايا عند بداية القياس ٢٠ ألف خلية أوجد:
 أ عدد الخلايا بعد مرور ٥ ساعات.

ب بعد كم ساعة يصبح عدد الخلايا ٢ مليون و ٥٦٠ ألف خلية.

الحل

يمكن كتابة عدد الخلايا على صورة دالة أسيّة.

$$d(h) = b(1)^h$$

حيث h عدد الساعات

$$20000 = 2(1)^h$$

أ عدد الخلايا بعد مرور ٥ ساعات (بوضع $h = 5$)

$$64000 = 2^5 \times 20000$$

ب لإيجاد عدد الساعات التي يكون بعدها عدد الخلايا ٢ مليون و ٥٦٠ ألف خلية نضع $d(s) = 2560000$

بالقسمة على 20000

$$2560000 = 2(1)^h$$

$$128 = 2^h$$

$$2^7 = 128$$

و منها $h = 7$ ساعات.

٥ حاول أن تحل

٥ أجب عن سئلة بند فكر وناقش ص (٦٦)



تمارين ٣ - ٣



١ أكمل ما يأتي:

أ إذا كان $s^{-2} = 1$ فإن $s = \dots$

ب إذا كان $s^{-2} = 7$ فإن $s = \dots$

ج إذا كان $s^{+1} = 5$ فإن $s^{+1} = \dots$

د إذا كان $s^2 = 32$ فإن $s = \dots$

٥ إذا قطع منحنى الدالة d ، حيث $d(s) = s^3$ منحنى الدالة d ، حيث $d(s) = 4-s$ في نقطة $(k, 3)$
فإن مجموعة حل المعادلة $s^3 = 4-s$ تساوي

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

٦ إذا كان $s^{-5} = 9$ فإن $s = \dots$

٧- **٥**

٣- ج

٧ ب

٢ أ

٧ إذا كان $s^2 = 20$ حيث $s > n + 1$ ، لـ عدد صحيح فإن $n = \dots$

٤ ٥

٣ ج

٢ ب

١ أ

٨ إذا كان $s^3 = 9$ فإن $s^{+1} = \dots$

٤٥ ٥

٢٧ ج

١٥ ب

٥ أ

٩ العدد $s^{+1} + s^5$ يقبل القسمة على لجميع قيم s الطبيعية.

١٧ ٥

١٣ ج

٦ ب

٧ أ

١٠ إذا كان $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{8}{28}$ فإن $s = \dots$

٥ ٥

٤ ج

٣ ب

٢ أ

١١ منحنيا الدالتان $d(s) = s^2$ ، $r(s) = s^3$ يتقاطعان عند $s = \dots$

٢ ٥

١ ج

٠ ب

١- أ

١٢ أوجد في ع مجموعه حل كل من المعادلات الآتية:

أ $\frac{1}{s^2} = 9$ $s^{+4} = \dots$

ب $s^2 = 1$ $s^5 = \dots$

$$9 \quad 5^{\log_3 7} = 7^{\log_5 3}$$

$$10 \quad 2^{\log_3 4} = 3^{\log_2 5}$$

$$11 \quad \frac{8}{27} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-\log_3 2}$$

$$12 \quad 2^{-\log_3 5} = 5^{\log_2 3}$$

$$13 \quad 64 = 4^{\log_5 2}$$

$$14 \quad \frac{4}{25} = 5^{-\log_2 3}$$

$$15 \quad \frac{1}{9} = (\log_3 5)^{-1}$$

$$16 \quad \frac{1}{4} = -\log_3 5$$

٩ أوجد بيانياً مجموعة حل كل من المعادلات:

$$17 \quad \text{مقرّباً الناتج لرقم عشري واحد} \quad 18 \quad 3^{\log_2 5} = 5^{\log_2 3}$$

$$19 \quad 2^{\log_3 s} = \frac{1}{s} + 1$$

$$20 \quad -s = 3^{\log_3 s + 1}$$

١٠ إذا كانت $d(s) = s^2$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات:

$$21 \quad d(s+1) = \frac{1}{27} \quad 22 \quad d(s) = 8$$

١١ إذا كانت $d(s) = s^3$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات:

$$23 \quad d(s-1) = \frac{1}{9} \quad 24 \quad d(s) = 27$$

١٢ إذا كانت $d(s) = s^7$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات:

$$25 \quad d(2s) = \frac{1}{4} \quad 26 \quad d(s) = 343$$

١٣ اكتشف الخطأ: قام كل من محمد وكريم بحل المعادلة $2^{\log_2 s} = 16$

حل كريم

$$\begin{aligned} 16 &= 2^{\log_2 s} \\ 8 &= \frac{16}{2} = 2^{\log_2 8} \\ 2^2 &= 2^{\log_2 8} \\ 3 &= \therefore s \end{aligned}$$

حل محمد

$$\begin{aligned} 16 &= 2^{\log_2 s} \\ 16 &= 2^{\log_2 16} \\ 2^4 &= 2^{\log_2 16} \\ 2 &= \therefore s \end{aligned}$$

أي الحلين هو الصواب؟ ولماذا؟

١٤ تتناقص أعداد الكائنات البحرية تبعاً لدالة التضاؤل الأسية $s = 8192 \left(\frac{1}{2}\right)^{t-80}$ حيث t عدد الأسابيع بدءاً من الآن. أوجد:

أ عدد هذه الكائنات بعد مرور ٤ أسابيع من الآن.

ب بعد كم أسبوع من الآن يصبح عدد هذه الكائنات ٢٥٦.

٥ حاول أن تحل

١ عَبَرْ عن كُلّ مَا يأْتِي بصورة لوغاريتمية:

ج) $b^s = c$ حيث $b > 0$

ب) $2 = \sqrt[3]{8}$

أ) $1000 = 10^3$

اللوغاریتمات المعتاد

هو اللوغاریتم الذي أساسه ١٠ ويكتب بدون كتابة الأساس، أي $\log_10 7 = \log 7$ ، $\log_{10} 127 = \log 127$ ويمكن استخدام مفتاح \log الموجود بالحاسبة لإيجاد اللوغاریتم المعتاد لأي عدد.

مثال

٢ حَوْلَ كُلَّ مَا يأْتِي إِلَى الصورة الأُسْيَة:

ج) $\log_b 1 = \text{صفر}$

ب) $\log_b 1000 = 3$

أ) $\log_b 32 = 5$

الحل

ج) صفر = $\log_b 1$

ب) $1000 = b^3$

أ) $32 = b^5$

٦ حاول أن تحل

٢ حَوْلَ كُلَّ مَا يأْتِي إِلَى الصورة الأُسْيَة:

ج) $\log_b 1 = 5$

ب) $\log_b 100 = 2$

أ) $\log_{10} b = 25$

مثال إيجاد قيم عبارات لوغاريتمية

٣ أُوجِدَ قِيمَة كُلُّ مِنْ:

ب) $\log_b 0.01$

أ) $\log_b 125$

الحل

أ) نفرض $\log_b 125 = s$ وبالتحويل إلى الصورة الأُسْيَة

ومنها $s = 3$

$.. = 5^s$

$.. = 125^s$

$.. = 125^{\frac{1}{3}}$

ب) نفرض $\log_b 0.01 = s$ (لوغاریتم معتاد أساسه ١٠) وبالتحويل للصورة الأُسْيَة

$.. = 10^{-s}$

$.. = 0.01$

$.. = 10^{-2}$

$s = -2$ منها $s = -2$

حاول أن تحل ٤**٣** أوجد قيمة كل من:

ب $\log_{\frac{1}{2}} 32$

أ $\log_3 81$

مثال حل المعادلات**٤** أوجد في ع مجموعة حل كُلّ من المعادلات الآتية:

ج $\log_s (s+6) = 2$

ب $\log_s 625 = s - 1$

أ $\log_s (s+5) = 3$

الحل**أي** $s < -5$ (مجال تعريف المعادلة)**أ** المعادلة معرفة لكل قيم $s + 5 < 0$ صفر

وبتحويل المعادلة إلى الصورة الأسيّة

$\therefore s + 5 = 2^2$

$\therefore s + 5 = 5$

$\therefore s = 3$

.. **مجموعه الحل = {3}****..** **مجال تعريف المعادلة****ب** المعادلة معرفة لجميع قيم s الحقيقة وبتحويل المعادلة إلى الصورة الأسيّة.

$\therefore s^{-1} = 5^4$

$\therefore s^{-1} = 625$

$\therefore s = 5$

$\therefore s = 1$

.. **مجموعه الحل = {5}****ج** المعادلة معرفة لجميع قيم s التي تتحقق كلاً من $\begin{cases} s+6 > 0 \\ s > 0 \\ s \neq 1 \end{cases}$ **أي** **أ** مجال تعريف المعادلة هو $[0, \infty)$ [صفر، ∞]

وبتحويل المعادلة إلى الصورة الأسيّة:

$s^2 - s - 6 = 0$

$s^2 - s - 6 = 0$

$(s-3)(s+2) = 0$

$\therefore s = 3 \quad \text{أو} \quad s = -2$

وحيث إن $s = -2$ \notin مجال تعريف المعادلة**..** **مجموعه الحل = {3}****حاول أن تحل ٥****٤** أوجد في ع مجموعة حل كُلّ من المعادلات الآتية:


ج $\log_{(s-1)} 9 = 2$

ب $\log_{\frac{1}{3}} 27 = s + 2$

أ $\log_s (s-1) = 1$

Graphical Representation of the Logarithmic Function

التمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية



إذا كانت $d(s) = a^x$ حيث $a > 1$ فإن الدالة العكسيّة للدالة d تسمى بالدالة اللوغاريتمية أي $s = \log_a x$

العلاقة بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية


الشكل المقابل يمثل الدالة الأسية $s = a^x$ والدالة اللوغاريتمية $s = \log_a x$ ادرس خواص كل من الدالتين من حيث المجال والمدى والاطراد والتماثل حول المستقيم $s = x$.

مثال

٥ ارسم في شكل واحد منحنى كُل من الدالتين $s = \log_2 x$, $s = \log_{\frac{1}{2}} x$

الحل

نختار قيم s قوى العدد ٢ (الأساس) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 4\}$



٤	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	s
٢	١	صفر	-١	-٢	$\log_2 s$
-٢	-١	صفر	١	٢	$\log_{\frac{1}{2}} s$

من الرسم يمكنك استنتاج الخواص الآتية لمنحنى الدالة اللوغاريتمية

المجال = $x > 0$, المدى = s

متزايدة لكل $x > 1$ ومتناقصة لكل $0 < x < 1$ الدالة $s = \log_2 x$

حاول أن تحل

٦ مثل بيانياً منحنى الدالة $s = \log_2 x$ ومن الرسم أوجد المدى وابحث اطرادها.

مثال

تطبيقات حياتية: تطبق إحدى الدول نظاماً ضريبياً بحيث يدفع الممول الضريبة المستحقة سنوياً وفقاً للدالة

$$d(s) = \begin{cases} 10\%s & \text{عندما } s \geq 5000 \\ 10\%s + 100 & \text{عندما } s < 5000 \end{cases}$$

حيث s هي صافي الربح السنوي . أوجد:

أ) الضريبة المستحقة على أحد الممولين الذين يبلغ صافي ربحهم السنوي ٣٦٠٠ جنيه.

ب) الضريبة المستحقة على أحد الممولين الذين يبلغ صافي ربحهم السنوي ٨٠٠ جنيه.

الحل

أ $D(3600) = 3600 \times 10\% = 360$ جنيه

ب $D(8000) = 8000 \times 10\% + 1147 = 9117$ جنيه

حاول أن تحل

- ٦** إذا كانت A تعبّر عن المبلغ المصروف على الدعاية لأحد الشركات في السنة s حيث $A = 10e^{0.1s} + 1147$ [جنيه] احسب A عندما $s = 100$ [جنيه].



تمارين ٢ - ٤


١ أكمل ما يأتي:

أ الصورة الأسيّة المكافئة للصورة $y = 3^x$ هي

ب الصورة اللوغاريتميّة المكافئة للصورة $y = 3^x$ هي

ج $y = 10^{\log x}$

هـ إذا كان $y = 2^x$ فإن $x =$

ز مجال الدالة $d(s) = s^x$ هو

ط منحنى الدالة d حيث $d(s) = s^x$ يمر بالنقطة $(8, 1)$

ي إذا كان $y = 3^x$ ، $y = 5^x$ ، $y = 15^x$ (بدالة s ، ص)

٢ أوجد في مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:-

أ $y = (s-1)^2$

ب $y = (s+2)^3$

ج $y = \frac{9}{s}$

د $y = \frac{8}{s+4}$

٣ بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة

أ $y = \sqrt[7]{s^3 + s^2}$

٤ مثل بيانياً الدالة d في كل مما يأتي الآتية ومن الرسم أوجد مداها وابحث اطرادها:

أ $d(s) = s^2$

ب $d(s) = s^2$

ج $d(s) = s^2$

ج $d(s) = s^2$

٥ استخدم الحاسبة في إيجاد قيمة كل من:-

أ $y = \sqrt[7]{s^3 - s^2}$

ب $y = \sqrt[7]{s^3 + s^2}$

ج $y = \sqrt[7]{s^3 - s^2}$

- ٦** إذا كانت مصاريف الاشتراك السنوي بالجيّه لأسرة في أحد النوادي الاجتماعية تتبع العلاقة $d(s) = 500 + 100s$ حيث s عدد سنوات الاشتراك s عدد الأفراد. أوجد قيمة اشتراك أسرة مكونة من ٥ أفراد للسنة الرابعة في هذا النادي.

بعض خواص اللوغاريتمات

Some Properties of Logarithms

تعلّمت في الدرس السابق مفهوم اللوغاریتم وكيفية تمثيل الدالة اللوغاريتمية بيانياً وفيما يلي ندرج بعض خواص اللوغاريتمات التي تُساعد في تبسيط المقادير اللوغاريتمية أو حل المعادلات التي تحتوي على لوغاریتم.



Some Properties of Logarithms

بعض خواص اللوغاريتمات

إذا كان $A \in \mathbb{C}^+$ - $\{1\}$ ، $s, c \in \mathbb{C}^+$ فإن

$$1 - \log A = 1$$

فمثلاً $\log_3 1 = 0$ ، $\log_{10} 1 = 0$

$$2 - \log 1 = 0$$

فمثلاً $\log_1 1 = 0$ ، $\log_0 1 = 0$

حاول إثبات كل من ١، ٢ من تعريف اللوغاريتم

٣ - خاصية الضرب في اللوغاريتمات:

$\log_s c = \log_s + \log_c$ حيث $s, c \in \mathbb{C}^+$

لإثبات صحة هذه الخاصية:

$\log_b (s \cdot c) = \log_s + \log_c$

ومن تعريف اللوغاريتمات فإن:

$s = a^b$ ، $c = a^j$

ف تكون $s \cdot c = a^{b+j}$ أي أن $\log_b (s \cdot c) = \log_b a^{b+j}$

وبتحويل هذه الصورة إلى الصورة اللوغاريتمية تكون: $\log_s c = b + j$

وبالتعميّض عن قيمتي b ، j تكون $\log_s c = \log_s a^b + \log_s a^j$



بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة $\log_{\frac{1}{3}} 2 + \log_{\frac{1}{4}} 17$ ١

سوف تتعلم

- استخدام بعض خواص اللوغاريتمات.
- حل المعادلات اللوغاريتمية.
- استخدام الحاسبة في حل المعادلات الأسية.
- تطبيقات حياتية على اللوغاريتمات.

المصطلحات الأساسية

- معادلة لوغاريتمية.

Logarithmic Equation

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- حاسب آلي مزود ببرامج رسومية

 الحل

$$\text{المقدار} = \log_{\frac{3}{4}}(2 \times 17)$$

$$= \log_{\frac{3}{4}}$$

$$= 1$$

استخدام خاصية (١)

 حاول أن تحل إذا كان $\log_7 2.8 = 13$ ، $\log_3 7 = 1$ أوجد بدون استخدام الحاسبة قيمة $\log_{\frac{9}{11}}$  ٤ - خاصية القسمة في اللوغاريتمات:

$$\log_{\frac{s}{c}} = \log_s - \log_c \quad (\text{حاول بنفسك إثبات صحة العلاقة})$$

 مثال بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة $\log_{\frac{5}{10}} 50$  الحل

$$\text{المقدار} = \log_{\frac{5}{10}} 50$$

استخدام خاصية القسمة

استخدام خاصية (١)

$$= \log_{10} 10$$

 حاول أن تحل بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة $\log_{\frac{7}{5}} 7$  ٥ - خاصية لوغاريتم القوة:

$$\log_s s^x = x \log_s s \quad (\text{حاول إثبات صحة العلاقة بنفسك})$$

 مثال بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة $\log_{\frac{5}{3}} 125$  الحل

$$\text{المقدار} = \log_{\frac{5}{3}} 125$$

استخدام خاصية القوة

استخدام خاصية (١)

$$= \log_{\frac{5}{3}} 5$$

$$= 3$$

$$= 1 \times 3$$

لاحظ أن: $\log_{\frac{1}{s}} \left(\frac{1}{s}\right) = -\log_s s$ حيث $s \in \mathbb{R}^+$  حاول أن تحل أوجد في أبسط صورة $\log_{\frac{3}{7}} 27$  تفكير ناقد: هل مجال الدالة $D(s) = \log_s s$ هو نفسه مجال الدالة $M(s) = s \log_s s$ فسر إجابتك

٦ - خاصية تغيير الأساس

$$\log_{\text{ص}} = \frac{\log_{\text{أ}}}{\log_{\text{أ}}}$$

وإثبات صحة هذه الخاصية

$$\log_{\text{ص}} = \log_{\text{أ}}$$

بالتحويل إلى الصورة الأسيّة
يأخذ لوغاريتم الطرفين للأساس أ

$$\log_{\text{ص}} = \frac{\log_{\text{أ}}}{\log_{\text{أ}}} \quad \text{أي أن: } \log_{\text{ص}} = \frac{\log_{\text{أ}}}{\log_{\text{أ}}}$$

فتكون

مثال

٤ اختصر لأبسط صورة $\log_7 16 \times \log_4 9$

الحل

استخدام خاصية (٦)

$$\begin{aligned} \text{المقدار} &= \frac{\log_4 9}{\log_7 2} \times \frac{\log_7 16}{\log_4 2} \\ &= \frac{\log_7 16}{\log_7 2} \\ &= \frac{\log_7 2^4}{\log_7 2} \end{aligned}$$

استخدام خاصية (٥)

$$8 = 2 \times 4 =$$

٥ حاول أن تحل

٥ أوجد حل المثال السابق بتغيير الأساس لعدد آخر غير ١٠

٧ - خاصية المعكوس الضربي

$$\log_{\text{أ}} \frac{1}{\log_{\text{ب}}} \quad \text{أي أن} \quad \text{كلاً من } \log_{\text{أ}} \text{، } \log_{\text{ب}} \text{، معكوس ضربي للآخر (حاول إثبات صحة العلاقة)}$$

مثال

٥ أوجد بدون استخدام الحاسبة قيمة $\log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{15}$

الحل

$$\text{المقدار} = \log_{\frac{1}{5}} 15 + \log_{\frac{1}{5}} 5$$

$$= \log_{\frac{1}{5}} (5 \times 3)$$

$$= \log_{\frac{1}{5}} 15 = 1$$

حاول أن تحل ٤

٦ بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{30} + \log_{\frac{1}{30}} \frac{1}{3} + \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3}$

Simplifying the Logarithmic Expressions تبسيط المقادير اللوغاريتمية

مثال

٦ اختصر لأبسط صورة $\log_{\frac{1}{12}} 3 + \log_{\frac{27}{12}} 5 - \log_{\frac{9}{12}} 9$

الحل

$$\text{المقدار} = \log_{\frac{1}{12}} 9 - \log_{\frac{27}{12}} 5 - \log_{\frac{9}{12}} 9$$

$$= \log_{\frac{1}{12}} \left(\frac{125}{16} \times \frac{9}{27} \right)$$

$$= \log_{\frac{1}{12}} 1 = \text{صفر}$$

حاول أن تحل ٤

٧ اختصر لأبسط صورة $\log_{\sqrt[3]{7}} 1 - \log_{\frac{9}{7}} 3 - \log_{\frac{1}{7}} \frac{1}{3}$

Solving Logarithmic Equations حل المعادلات اللوغاريتمية

مثال

٧ أوجد في ع مجموعة حل كل من المعادلات

أ $\log_s + \log_s (s+1) = 1$

الحل

أ الدالة معرفة لـ $s > 0$ ، $s \neq 1$ $<$ صفر

أى أن $s > 0$ $<$ صفر (مجال تعريف المعادلة)

استخدام خاصية (٣) $\therefore \log_s (s+1) = 1$

تحويل من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسيّة

$\therefore s^1 = s+2$ $\therefore (s+2)(s-1) = 0$ $\therefore s = -2$ $\text{أو } s = 1$ $\therefore s = 1$ صفر

إما $s = 1$ \therefore حيث إن $s = 1 \notin$ مجال تعريف المعادلة

\therefore مجموعة الحل = {1}

ب الدالة معرفة لـ $s > 0$ (مجال تعريف المعادلة)

$$\log_s + \log_s^2 = 3 \quad \text{خاصية (٦)} \quad \therefore \log_s + \log_s^2 = 3$$

$$\therefore \log_s^2 + \log_s 2 = 6 \quad \therefore \log_s 3 = 2$$

..
وحيث إن $s = 4$ \in مجال تعریف المعادلة
حاول أن تحل ٤

٨ أوجد في ع مجموعه حل كل من المعادلات الآتية:

$$\text{ب} \quad \log_2 s = \log_s 2 \quad \text{أ} \quad \log(2s+1) - \log(3s-1) = 1$$

حل المعادلات الأسيّة باستخدام اللوغاريتمات

مثال

٩ أوجد في ع مجموعه حل كل من المعادلات الآتية مقرباً الناتج لأقرب رقمين عشربيّن:

$$\text{ب} \quad 2^s = 5^{s+2} \quad \text{أ} \quad 7 = 2^s$$

الحل

بأخذ لوغاريتم الطرفين أ

$$\therefore s = \frac{\log 7}{\log 2} = \log_2 7 \quad \therefore s = \log_2 7 = \log_7 2$$

وباستخدام الحاسبة بالتتابع الآتي:

$\therefore s \approx 2.81$.. مجموعه الحل = {٢،٨١}.

(تحقق من صحة الإجابة باستخدام الحاسبة)

بأخذ لو للطرفين ب

$$\therefore (s+1)\log 3 = (s-2)\log 5 \quad \therefore s = \frac{\log 5 - \log 3}{\log 5 - \log 3}$$

$$\therefore s = \frac{\log 5 - \log 3}{\log 5 - \log 3} = \log_3 5 - \log_5 3$$

$$\therefore s = \frac{\log 5 - \log 3}{\log 5 - \log 3}$$

وباستخدام الحاسبة بالتتابع الآتي:

$\therefore s \approx 8.45$.. مجموعه الحل = {٨،٤٥}.

(تحقق من صحة الإجابة باستخدام الحاسبة)

حاول أن تحل ٥

٨ أوجد لأقرب رقمين عشربيّن مجموعه حل كل من المعادلات:

$$\text{ب} \quad 4^{s-1} = 7^s \quad \text{أ} \quad 2 = s^4$$



نشاط

تطبيقات رياضية وحياتية



الربط بالصناعة: إذا كانت كفاءة عمل أحد الآلات تتناقص سنويًا طبقاً للعلاقة $y = k \cdot e^{-0.9x}$ حيث k كفاءة الآلة، x الكفاءة الابتدائية للآلة، x عدد سنوات عمل الآلة. فإذا علم أنَّ الآلة تتوقف عن العمل إذا بلغت كفاءتها ٤٠٪، فما عدد السنوات التي تعملها هذه الآلة قبل أنْ تتوقف عن العمل.

الحل

المقصود ببلغ الكفاءة ٤٠٪ أي ٤٠٪ من الكفاءة الابتدائية $\therefore k = 0.4$.
 بأخذ لو للطرفين $\therefore x = \frac{\ln 0.4}{-0.9} = \frac{\ln 0.4}{-0.9} = 8,696718$.
 أي أنَّ الآلة لا تعمل أكثر من ٨ سنوات ونصف السنة.

تطبيق على النشاط

٩ في المثال السابق أوجد كفاءة الآلة بعد مرور ٤ سنوات من تشغيلها



تمارين ٢ - ٥



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ $\ln 8^2 = 2$

١٠ ٥

١٦ ج

٣ ب

٤ أ

٢ $\ln 2 + \ln 5 = 7$

١٠ ٥

ج $\ln 2,5$

ب $\ln 7$

١ أ

٣ $\ln \sqrt{5} = \frac{1}{2} \ln 5$

١- ٥

ج $\frac{1}{2}$

ب ٥

٢ أ

٤ إذا كان $\ln 3 = s$ ، $\ln 4 = t$ فإن $\ln 12 =$

٥ $s + t$

ج $s - t$

ب $s \cdot t$

أ $s + t$

٥ $\ln 2 + \ln 2 + \ln 3 = \ln 6$

١٢ ٥

ج ٢

ب ٣٦

٦ أ

٦ $\ln 5 \times \ln 2 = \ln 10$

٥ صفر

ج $\frac{5}{2}$

ب ١٠

١ أ

٧ $\ln 2 \times \ln 5 \times \ln 3 = \ln 30$

٣٠ ٥

ج صفر

ب ١

أ ٣٠

٨ عَبَرْ عن كُلِّ ممَا يأْتِي بدلالة لوس ، لو ($s + 1$)

ج لو_٢س (س + 1)^٢

ب لو $\frac{s}{s+1}$ أ لو س (س + 1)

٩ اختصر لأبسط صورة:

ج لو_٣ + لو_٢

ب لو_٦ + لو_٣

أ لو_٦ - لو_٤

و لو_٧^{٣+٤٩} لو_٧

ه لو_٦^{١-لو_٥}

د لو_٦ + لو_٥ - لو_٦

ز لو_٣^٢ + لو_٣^١ + لو_٣^٠ ح $\frac{1}{3} \log_3 + \frac{1}{3} \log_3 + 2 \log_3 - \log_{\sqrt{3}} - \log_3^3$

١٠ أوجد في ع مجموعة حل كُلِّ من المعادلات الآتية:

ج لو_٢س - لو_٢^٢

ب لو س + لو (س - ٣) = ٣

أ لو_٢س + لو_٢ (س + ٢) = ٣

٢ = $\frac{لوس - لو س}{لو س - لو س}$ و

٢ = $\frac{1}{لو س} + \frac{1}{لو س^3}$ ه

د لو (س + ٣) - لو_٣ = لو س

١١ أثبت أن $\log_a \times \log_b \times \log_c = \log_a + \log_b + \log_c$ ثم احسب قيمة $\log_3 5 \times \log_5 7 \times \log_7 16$

١٢ أوجد قيمة س في كُلِّ مما يأْتِي مقرِّباً الناتج لرقم عشرى واحد.

٥ $s^2 - s^3 = 1^{+}$

ج $7 \times 4^{-s} = 1$

ب $s^5 - 1 = 2$

أ $s^3 = 7$

نشاط



الربط بالحياة: إذا كان حجم عينة من البكتيريا في لحظة معينة هو 10^3 و كان حجم العينة يزداد تبعاً لدالة أسيّة $H = 10^3 \times 1.15^t$ فأوجد حجم البكتيريا بعد ٤ ساعات.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الواقع الآلي:



ملخص الوحدة**(١) الأسس الصحيحة**

أ $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (العامل المكرر من المرات)

ب $a^0 = 1$ حيث $a \neq 0$ **ج** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ حيث $a \neq 0$

خواص الأسس الصحيحة

لكل $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$ فإن:

ج $a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$ **ب** $(ab)^n = a^n b^n$ **أ** $a^{m+n} = a^m a^n$

هـ $(a^m)^n = a^{mn}$ **د** $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

(٢) الجذور التوينة

المعادلة $s^n = a$ حيث $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ لها n من الجذور

أ n عدد زوجي، $a \in \mathbb{R}^+$

يوجد جذران حقيقيان (باقي الجذور أعداد مركبة)، أحدهما موجب والآخر سالب ويرمز لهما $\pm \sqrt[n]{a}$ **بـ** n عدد زوجي، $a \in \mathbb{R}$ ليس للمعادلة جذور حقيقية (جميع الجذور أعداد مركبة)

جـ n فردي، $a \in \mathbb{R}^+$

يوجد للمعادلة جذر حقيقي وحيد (باقي الجذور أعداد مركبة)، ويرمز له $\sqrt[n]{a}$

د $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, $a = 0$ صفر

يوجد للمعادلة حل وحيد هو الصفر (لها n من الجذور المكررة وكل منها يساوي صفر).

(٣) خواص الجذور التوينة:

إذا كان $\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b} \in \mathbb{R}$ فإن:

أ $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b}$ **بـ** $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

د $\sqrt[n]{a^n} = a$ إذا كان n فردي **جـ** $\sqrt[n]{a^n} = \pm a$ إذا كان n زوجي

٤) الأسس الكسرية $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$

(٥) خواص الأسس الكسرية

أ $a^{\frac{p}{q}} = (\sqrt[q]{a})^p$ حيث $a \in \mathbb{R}^+, p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$, $p < q$, a عامل مشترك.

بـ يمكن تعميم قوانين القوى الصحيحة على القوى الكسرية.

٦) الدالة الأسية: إذا كانت $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $d(s) = a^s$ لـ $a > 0$, $a \neq 1$ فإن d تسمى دالة أسية أساسها a

٧ خواص منحنى الدالة الأسية

أ مجال الدالة $= \cup^+$

ج الدالة متزايدة على مجالها لـ $\forall x > 1 \Rightarrow e^x > e^1$ وتسمي بدالة النمو الأسية.

د الدالة متناقصة على مجالها لـ $\forall x < 1 \Rightarrow e^x < e^1$ وتسمي بدالة التضاؤل الأسية.

٨ النمو الأسية: يمكن استخدام الدالة د حيث $D(x) = A(e^x - 1)$ لتمثيل النمو الأسية بنسبة مؤوية ثابتة في فترات زمنية متساوية حيث A هي الفترة الزمنية، A القيمة الابتدائية، e النسبة المؤوية للنمو في الفترة الزمنية الواحدة.

٩ التضاؤل الأسية: يمكن استخدام الدالة د حيث $D(x) = A(1 - e^{-x})$ لتمثيل التضاؤل الأسية بنسبة مؤوية ثابتة في الفترات زمنية متساوية حيث A هي الفترة الزمنية، A القيمة الابتدائية، e النسبة المؤوية للتضاؤل في الفترة الزمنية الواحدة.

١٠ الدالة اللوغاريتمية

أ إذا كانت $A \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ فإن الدالة $C = \ln(Ax)$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية $C = A^x$.

ب $A^x = B \Leftrightarrow x = \ln(B/A)$ (التحويل من الصورة الأساسية إلى الصورة اللوغاريتمية والعكس).

ج اللوغاريتم المعتاد هو لوغاریتم اساسه ۱۰ (لاحظ أن $\ln(10) = 1$)

١١ خواص الدالة اللوغاريتمية

أ مجال الدالة $= \cup^+$

ج الدالة $C = \ln(x)$ متزايدة لـ $\forall x > 1$ ومتناقضة لـ $\forall x < 1$

١٢ خواص اللوغاريتمات: إذا كانت $A \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

أ $\ln(A) = 1$ ب $\ln(A^x) = x \ln(A)$ ج $\ln(A^x) = x \ln(A)$ حيث $x > 0$

د $\ln(A + B) = \ln(A) + \ln(B)$ حيث $A, B > 0$

ه $\ln(A - B) = \ln(\frac{A}{B})$ حيث $A > B > 0$

و $\ln(\frac{A}{B}) = \frac{\ln(A)}{\ln(B)}$ حيث $A > 0, B > 0$

ذ $\ln(A) \times \ln(B) = \ln(A \times B)$

تمارين عامة

لمزيد من التمارين قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.


اختبار تراكمي


١ عَيْنِ مَجَالٌ كُلُّ مِن الدَّوَالَاتِ الْآتِيَةِ:

ج $s(s) = \ln(s - 2)$ **ب** $d(s) = \frac{s-2}{s}$ **أ** $d(s) = \sqrt{s-2}$

٢ ارسم منحنى كُلُّ مَا يُأْتِي، وَمِن الرَّسْمِ عَيْنِ المَدِيِّ وَابْحَثْ اطْرَادَ الدَّالَّةِ وَنُوعَهَا مِنْ حِيثِ كُونَهَا زُوْجِيَّةً أَمْ فَرْدِيَّةً.

ب $d(s) = s^3 - 1$ **أ** $d(s) = (s-2)^2$

د $h(s) = 1 - \ln s$ **ج** $s(s) = 2 - |s|$

٣ اخْتَصِرْ:

$$\frac{1}{15} \times \frac{1}{81} \times \frac{2}{125} \quad \text{ب} \quad \frac{\sqrt[3]{15} \times \sqrt[3]{81} \times \sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{1}}$$

٤ أُوجِدْ قِيمَةً كُلُّ مَا يُأْتِي (بِدُونِ اسْتِخْدَامِ الْحَاسِبَةِ):

ج $\sqrt[3]{15^2 \times 9 \times 2} = \sqrt[3]{15^3}$ صفر **ب** $\sqrt[3]{27^2} = 27^{\frac{2}{3}}$ **أ** $(16)^{\frac{1}{3}}$

و $\frac{243}{125} + \ln^5 s$ **هـ** $\ln^{\frac{1}{9}} s$ **د** $\ln^{\frac{1}{5}} s + \ln^{\frac{1}{9}} s$

٥ أُوجِدْ فِي عِجْمَوْنَةِ حلْ كُلُّ مِنَ الْمَعَادِلَاتِ:

ب $s^3 - 2 = \frac{1}{3}$ **أ** $|s - 2| = 5$

د $\ln s = \ln^3 10 + \ln^2 10$ **ج** $s^{-4} = \frac{1}{16}$

٦ أُوجِدْ بِاسْتِخْدَامِ الْحَاسِبَةِ:

أ قِيمَةُ s الَّتِي تُحقِقُ $s^{-3} = 25$ مُقْرَبًا النَّاتِج لِرَقْمِيْنِ عَشْرِيْنِ

ب قيمة $\frac{70}{51}$

٧ أَيُّ الدَّوَالَاتِ الْآتِيَةُ تُمَثِّلُ دَالَّةً نُمُوًّا وَأَيُّهَا تُمَثِّلُ دَالَّةً تَضَاؤً:

ب $s = (1, 1)(10, 2)$ **أ** $s = (1, 0.5)(0, 1)$

د $s = (0, 2)(0, 1)$ **ج** $s = (\frac{1}{2}, 0)(0, 4)$

الوحدة الثالثة

النهايات

Limits

مقدمة الوحدة

التفاضل والتكامل (Calculus) أحد الفروع الحديثة لمادة الرياضيات، والتي تختص بدراسة النهايات والاتصال والاشتقاق والتكامل والمتسلسلات اللانهائية وهو علم يستخدم لدراسة التغير في الدوال وتحليلها.

ويدخل علم التفاضل والتكامل في العديد من التطبيقات الهندسية والحياتية والتجارية والعلوم المختلفة، فكثيراً ما نحتاجه لدراسة سلوك الدالة، والتغير فيها وحل بعض المشكلات التي يعجز علم الجبر وبعض العلوم الأخرى عن حلها.

مخرجات تعلم الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- ❖ يتعرف بعض الكميات غير المعنية مثل:
 $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\infty - \infty$, $\infty \times 0$, صفر، صفر، $\frac{1}{n}$ ، $n^{\frac{1}{n}}$.
- ❖ يحدد طريقة إيجاد نهاية دالة: بالتعويض المباشر، بالتحليل، بالقسمة المطولة، بالضرب في المرافق.
- ❖ يوجد نهاية دالة عند اللانهاية جبرياً وبيانياً
- ❖ يستخدم الحاسوبات البيانية للتحقق من صحة نهاية دالة وتقدير قيمة النهاية.
- ❖ يتعرف تطبيقات متنوعة على المفاهيم الأساسية لنهايات الدوال.

المصطلحات الأساسية

نهاية الدالة عند الانهائية <i>Limit of a Function at Infinity</i>	<i>direct Substitution</i>	تعويض مباشر	<i>Unspecified Quantity</i>	كمية غير معينة
Conjugate		مرافق	<i>Undefined</i>	غير معروف
<i>Polynomial Function</i>		دالة كثيرة الحدود	<i>Limit of a Function</i>	نهاية دالة

مخطط تنظيمي للوحدة



دروس الوحدة

الدرس (١-٣): مقدمة في النهايات.

الدرس (٢-٣): إيجاد نهاية الدالة جبرياً.

الدرس (٣-٣): نهاية الدالة عند الانهائية.

الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسب آلي - برامج رسومية

مقدمة في النهايات

Introduction to Limits of Functions

يعتبر مفهوم نهاية دالة عند نقطة من المفاهيم الأساسية في علم التفاضل، ويعتمد هذا المفهوم بصفة أساسية على سلوك الدالة عند جميع نقاط تعريفها. ولدراسة هذا السلوك ينبغي التعرف على أنواع الكميات في مجموعة الأعداد الحقيقية.

سوق تتعلم

- ◀ الكميّات غير المعينة.
- ◀ نهاية دالة عند نقطة.

فكّر و نقش

تنكر أن



∞ هي رمز يدل على كمية غير محددة أكبر من أي عدد حقيقي يمكن تصوره أو تخيله.

أوجد ناتج العمليات الآتية إن أمكنك ذلك:

$$4 \div 28 \quad 1$$

$$0 \div 7 \quad 2$$

$$3 + \infty \quad 3$$

$$\infty - \infty \quad 4$$

$$0 \div 0 \quad 5$$

$$\infty \div \infty \quad 6$$

الكميّات غير المعينة:

تعلم

Unspecified Quantities

في بند فكر و نقش نجد أن بعض نواتج العمليات محددا تماماً مثل رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، بينما بعض النواتج لا يمكن تحديدها مثل باقي العمليات.

لاحظ أنَّ: $0 \div 7$ غير معرفة حيث إن القسمة على صفر لا معنى لها.

والآن لا يمكن تحديد ناتج العملية $0 \div 0$ حيث يوجد عدد لا نهائي من الأعداد إذا ضرب كل منها في صفر كان الناتج صفر لذلك فإن صفر كمية غير معينة، ومن الكميّات غير المعينة أيضاً: $\infty \times \infty$ (لماذا؟)

أضف إلى معلوماتك



تجري العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد الحقيقية والرموزين ∞ ، $-\infty$ كالتالي:

لكل $A \in \mathbb{R}$ فإن:

$$\infty - A = \infty \quad 1$$

$$A + \infty = \infty \quad 2$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} & \infty - A, \text{ إذا كان } A > 0 \\ & \infty, \text{ إذا كان } A < 0 \end{aligned} \right\} = A \times \infty \quad 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} & \infty - A, \text{ إذا كان } A < 0 \\ & \infty, \text{ إذا كان } A > 0 \end{aligned} \right\} = A \times \infty \quad 4 \end{aligned}$$

الأدوات المستخدمة

- ◀ آلة حاسبة علمية
- ◀ برامج رسومية للحاسوب

مثال

١ أوجد ناتج العمليات الآتية إذا كان ذلك ممكناً:

$$0 \div 5 - \boxed{5}$$

$$3 \div 0 \boxed{ج}$$

$$\infty - 3 \boxed{ب}$$

$$\infty + 4 \boxed{أ}$$

$$\infty \times 6 - \boxed{ح}$$

$$\infty \times 5 \boxed{ز}$$

$$0 \div \infty \boxed{و}$$

$$\infty + \infty \boxed{هـ}$$

الحل

$$5 \text{ غير معرفة} \boxed{د}$$

$$\infty \boxed{ج}$$

$$\infty - \boxed{ب}$$

$$\infty \boxed{أ}$$

$$\infty \boxed{ح}$$

$$\infty \boxed{ز}$$

$$\infty \text{ كمية غير معينة} \boxed{و}$$

$$\infty \boxed{هـ}$$

٤ حاول أن تحل

١ أوجد ناتج العمليات الآتية إذا كان ذلك ممكناً:

$$0 \times \infty \boxed{د}$$

$$\infty \div 9 \boxed{ج}$$

$$0 \div 7 \boxed{ب}$$

$$(2 - 0) \div \infty \boxed{أ}$$

$$\infty \div \infty \boxed{ح}$$


$$\infty + \infty \boxed{ز}$$

$$12 + (\infty -) \boxed{و}$$

$$\infty \times (7 -) \boxed{هـ}$$

نهاية دالة عند نقطة :

في الشكل التالي: الخط البياني للدالة d المعرفة على U وفق القاعدة $d(s) = 2s + 1$ أكمل الجداول الآتية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



$d(s)$	s
4,8	1,9
4,98	1,99
4,998	1,999
4,9998	1,9999
.....
\downarrow	\downarrow
5	2

$s > 2$

س تقترب من 2 من جهة اليمين

$d(s)$	s
5,2	2,1
5,02	2,01
5,002	2,001
5,0002	2,0001
.....
\downarrow	\downarrow
5	2

$s < 2$

س تقترب من 2 من جهة اليسار

لاحظ أن:

﴿ عندما تقترب س إلى العدد 2 من جهة اليمين، ما القيمة التي تقترب إليها $d(s)$.

﴿ عندما تقترب س إلى العدد 2 من جهة اليسار، ما القيمة التي تقترب إليها $d(s)$.

عندما تقترب س من العدد 2 من اليمين و من اليسار فإن $d(s)$ تقترب من العدد 5 ونُعبّر عن ذلك رياضيًّا كالتالي: $\lim_{s \rightarrow 2} (2s + 1) = 5$


إذا كانت قيمة الدالة d تقترب من قيمة وحيدة L ، عندما تقترب s من a من جهتي اليمين واليسار، فإن نهاية $d(s)$ تساوى L ونكتب رمزيًا: $\lim_{s \rightarrow a} d(s) = L$

وتقرأ: نهاية $d(s)$ عندما تقترب s من a تساوى L

مثال

(٢) إذا كانت $d(s) = \frac{s-2}{s-4}$ فادرس قيم $d(s)$ عندما تقترب s من 2 .

الحل



$d(s)$	s
٣,٩	١,٩
٣,٩٩	١,٩٩
٣,٩٩٩	١,٩٩٩
.....
↓	↓
٤	٢

$s > 2$

$d(s)$	s
٤,١	٢,١
٤,٠١	٢,٠١
٤,٠٠١	٢,٠٠١
.....
↓	↓
٤	٢

$s < 2$

من الشكل البياني ومن بيانات الجدول الموضحة نجد أن $d(s) \rightarrow 4$ عندما $s \rightarrow 2$ من جهة اليمين و من جهة اليسار $\therefore \lim_{s \rightarrow 2^-} \frac{s-2}{s-4} = 4$

لاحظ من هذا المثال أن:


- الفجوة في الشكل البياني تعني حالة من حالات عدم التعين صفر عندما $s = 2$ (أى أن الدالة غير معرفة عند $s = 2$)
- وجود نهاية للدالة عندما $s \rightarrow 2$ لاتعني بالضرورة أن تكون الدالة معرفة عند $s = 2$

حاول أن تحل


(٢) إذا كانت $d(s) = \frac{1}{s+1}$ فادرس قيم $d(s)$ عندما تقترب s من (-1) .

مثال


(٣) في كل من الأشكال الآتية أوجد $\lim_{s \rightarrow -1} d(s)$



شكل (٣)



شكل (٢)




شكل (١)

الحل


شكل (١) $\lim_{s \rightarrow 3} d(s) = 1$

(لاحظ أن الدالة غير معرفة عند $s = 3$) $\lim_{s \rightarrow 3} d(s) = 1$


شكل (٣) $\lim_{s \rightarrow 2} d(s)$ ليس لها وجود



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)


من الأمثلة السابقة نستنتج أنَّ:

وجود نهاية للدالة عندما $s \rightarrow a$ \rightarrow لا يعني بالضرورة أن تكون الدالة معرفة عند $s = a$,

والعكس إذا كانت الدالة معرفة عند $s = a$ فهذا لا يعني وجود نهاية للدالة عند $s = a$.

تعبر شفهيًّا: عبر بأسلوبك عن الفرق بين قيمة دالة عند نقطة ونهاية الدالة عند نفس النقطة.

تمارين (١-٣)




أولاً: تمارين على إيجاد النهاية بيانيًّا:

١ من الرسم البياني أوجد:

أ $\lim_{s \rightarrow 0} d(s)$


ب $\lim_{s \rightarrow 0} d(s)$



٢ من الرسم البياني المقابل أوجد إنْ كان ذلك ممكناً:

أ $\lim_{s \rightarrow 3} d(s)$

ب $\lim_{s \rightarrow 3} d(s)$




٣ من الرسم البياني المقابل أوجد:

أ $\lim_{s \rightarrow -2^-} d(s)$

ب $d(-2)$

ج $\lim_{s \rightarrow -2^+} d(s)$

د $\lim_{s \rightarrow 0} d(s)$




$$d(s) = 2 - s^2$$

٤ الشكل البياني المقابل للدالة $d(s) = 2 - s^2$

من الشكل البياني المقابل أوجد:

أ $\lim_{s \rightarrow 0^+} (2 - s^2)$

ب $d(0)$




٥ الشكل البياني المقابل للدالة $d(s) = \frac{s^2 - 4}{2 + s}$

من الشكل البياني المقابل أوجد:

أ $\lim_{s \rightarrow -2^+} d(s)$

ب $d(-2)$



٦ من الشكل البياني المقابل أوجد:

أ $\lim_{s \rightarrow 0^+} d(s)$

ب $d(0)$

ج $\lim_{s \rightarrow 2^+} d(s)$

د $d(2)$

ثانياً: إيجاد نهاية الدالة جبرياً:

٧ أكمل الجدول الآتي واستنتج $\lim_{s \rightarrow 2} d(s)$ حيث $d(s) = s + 4$

s	d(s)
٢,١	٢,٠١
٢,٠٠١	→
٢	←
١,٩٩٩	←
١,٩٩	←
١,٩	←
	s
	d(s)

٨ أكمل الجدول الآتي واستنتج $\lim_{s \rightarrow 1^-} (s^3 + 1)$

s	d(s)
١,١-	١,٠١-
١,٠٠١-	→
١-	←
٠,٩٩٩-	←
٠,٩٩-	←
٠,٩-	←
	s
	d(s)

٩ أكمل الجدول الآتي واستنتاج $\lim_{s \rightarrow 1^-} \frac{s^2 - 1}{s^2 + 4}$

s	d(s)
١,١-	١,٠١-
١,٠٠١-	→
١-	←
٠,٩٩٩-	←
٠,٩٩-	←
٠,٩-	←
	s
	d(s)

١٠ أكمل الجدول الآتي واستنتاج $\lim_{s \rightarrow 2^-} \frac{s^2 - 4}{s^2 - 4}$

s	d(s)
٢,١	٢,٠١
٢,٠٠١	→
٢	←
١,٩٩٩	←
١,٩٩	←
١,٩	←
	s
	d(s)

إيجاد نهاية الدالة جبرياً

Finding the Limit of a Function Algebraically

في هذا الدرس نتعرف على بعض الطرق والنظريات التي تمكنا من حساب نهاية دالة عند نقطة دون الحاجة إلى عمل جدول وإيجاد النهاية عددياً أو رسم منحنى الدالة وإيجاد النهاية بيانياً.

سوق تعلم

- نهاية الدالة كثيرة الحدود.
- بعض نظريات النهايات.
- استخدام القسمة المطولة في إيجاد قيمة نهاية دالة.
- استخدام النظرية $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\infty}{\infty}$

نشاط



إذا كانت $d(s) = s^2 + 1$ ، $d(s) = s^3 + 3$ أوجد

١- $\lim_{s \rightarrow 1^-} d(s)$ (ماذا تلاحظ)

٢- $\lim_{s \rightarrow 0^+} d(s)$ (ماذا تلاحظ)

تعلم



نهاية الدالة كثيرة الحدود

Limit of a Polynomial Function

﴿إذا كانت $d(s)$ كثيرة حدود، $\exists L$ ع

فإن: $\lim_{s \rightarrow a^-} d(s) = L$

المصطلحات الأساسية

- Limit of a Function
- نهاية دالة
- دالة كثيرة الحدود
- Polynomial Function
- تعويض مباشر
- Direct Substitution
- Synthetic Division
- قسمة تركيبية
- Conjugate
- المترافق

مثال



أوجد نهاية كل من الدوال الآتية:

١- $\lim_{s \rightarrow 3^-} (s^2 - 3s + 5)$ أ حل

$$\lim_{s \rightarrow 3^-} (s^2 - 3s + 5) = 3^2 - 3(3) + 5 = 5 - 6 = -1$$

(بالتعويض المباشر)

لاحظ أن $d(s) = 4$ ثابتة لكل قيمة $s \in \mathbb{R}$

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسوب.

حاول أن تحل

أوجد كل من النهايات الآتية:

١- $\lim_{s \rightarrow 1^-} (s^2 - 5)$ أ

٢- $\lim_{s \rightarrow 2^-} (s^3 + s - 4)$ ب

١- $\lim_{s \rightarrow 1} f(s) = m$	إذا كان $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = l$ فإن:
٢- $\lim_{s \rightarrow 1} [d(s) \pm f(s)] = l \pm m$	حيث $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = l$.
٤- $\lim_{s \rightarrow 1} \frac{f(s)}{d(s)} = \frac{l}{m}$ بشرط $m \neq 0$.	٣- $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) \cdot f(s) = l \cdot m$
٥- $\lim_{s \rightarrow 1} (d(s))^n = l^n$ حيث $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = l$.	

مثال

٢ أوجد كلاً من النهايات الآتية:

$$\lim_{s \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan s}{\sin s}$$

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 + 3}{s^2 + 2s - 5}$$

الحل

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan s}{\sin s} &= \lim_{s \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\cos s}}{\sin s} = \lim_{s \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos s} = \lim_{s \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos s} \\ &= \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 + 3}{s^2 + 2s - 5} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{ds}(s^3 + 3)}{\frac{d}{ds}(s^2 + 2s - 5)} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{3s^2}{2s + 2} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{3s^2}{2s + 2} = \frac{3}{4}$$

٤ حاول أن تحل

٤ احسب النهايات الآتية:

$$\lim_{s \rightarrow \pi} \frac{\sin s}{s}$$

$$\lim_{s \rightarrow 2} \frac{s^3 - 8}{s^2 - 4}$$

لذذ

إذا كانت $d(s) = f(s)$ لـ كل $s \in \mathbb{R} - \{a\}$

وكان $\lim_{s \rightarrow a} f(s) = L$ فإن $\lim_{s \rightarrow a} d(s) = L$

مثال


٣ أوجد: $\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 - 1}{s - 1}$


الحل

نلاحظ أن $d(s) = \frac{s^3 - 1}{s - 1}$ غير معینة عند $s = 1$

بالتحليل والقسمة على العوامل المتشابهة غير الصفرية

فإنه يمكن كتابة $d(s)$ على الصورة:





$$d(s) = \frac{(s+1)(s^2+s+1)}{(s+1)} = s^2 + s + 1$$

$$\therefore f(s) =$$

من ذلك نجد أن $d(s) = f(s)$ لـ $s \neq -1$

وحيث أن $\lim_{s \rightarrow 1} f(s) = 3$ (كثيرة الحدود)

فإنه طبقاً للنظرية السابقة نستنتج أن $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = 3$

$$\therefore \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 + s^2 + s + 1}{s + 1} = \frac{1 + 1 + 1 + 1}{1 + 1} = 3$$

حاول أن تحل ٤

$$\text{أوجد: } \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s^3 + s^2}{s^2 + s}$$

مثال ٤

أوجد:

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 - 2s^2 + s}{s^2 + s - 2}$$

الحل

نلاحظ أن دالة البسط $d(s) = 0$ وذلك بالتعويض عن $s = 1$,

كذلك دالة المقام $f(s) = 0$ بالتعويض أيضاً عن $s = 1$ وهذا يعني أن العامل $(s - 1)$ مشترك في كـل من البسط والمقام. ونظراً لصعوبة تحليل دالة البسط إلى عوامل أحدها $(s - 1)$ نستخدم القسمة المطولة لوجود العامل الآخر للمقدار $s^3 - 2s^2 + s^2 + s - 2$ كـالآتي:

$$\begin{array}{r} s^3 - 2s^2 + s \\ \hline s^3 - s^2 - s^2 + s \\ \hline 0 - s^2 \\ \hline -s^2 + s \\ \hline 0 - s + 1 \\ \hline -s + 1 \\ \hline \text{صفر} \end{array}$$

لذلك فإن:

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{(s-1)(s^2 - s - 1)}{(s-1)(s^2 + s - 2)} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^2 - s - 1}{s^2 + s - 2} = \frac{1 - 1 - 1}{1 + 1 - 2} = -1$$

حاول أن تحل ٤

$$\text{ب } \lim_{s \rightarrow -3} \frac{s^3 - 10s^2 - 5s + 6}{s^3 + 2s^2 - 3s}$$

$$\text{أ } \lim_{s \rightarrow 2} \frac{s^3 - s^2 - 5s + 6}{s^2 - 2s}$$

مثال

استخدام المرافق

أوجد النهايات الآتية: ٥

$$\lim_{s \rightarrow 4} \frac{s^2 - 5s}{s + 4}$$

$$\lim_{s \rightarrow 4} \frac{1 - \sqrt[3]{s-4}}{s-4}$$

الحل

$$\text{لاحظ أن: } d(s) = \frac{1 - \sqrt[3]{s-4}}{s-4} \quad \text{غير معينة عند } s=4$$

لذلك نبحث عن طرق نتخلص بها من العامل $(s-4)$ في كل من البسط و المقام.

$$\lim_{s \rightarrow 4} \frac{\frac{1 - \sqrt[3]{s-4}}{s-4} \times \frac{1 - \sqrt[3]{s-4}}{1 + \sqrt[3]{s-4}}}{(1 + \sqrt[3]{s-4})(s-4)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 4} \frac{\frac{s-4}{s-4}}{(1 + \sqrt[3]{s-4})(s-4)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 4} \frac{1}{1 + \sqrt[3]{s-4}}$$

$$\lim_{s \rightarrow 4} \frac{s^2 - 5s}{s + 4} = \lim_{s \rightarrow 4} \frac{\frac{2 + \sqrt[3]{s+4}}{s+4} \times \frac{s^2 - 5s}{3 - \frac{4}{s+4}}}{3 + \frac{4}{s+4}}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 4} \frac{s(s-5)(s+5)}{s^2 - 4^2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 4} s(s+5) = 4(4+5) = 40$$

حاول أن تحل ٤

أوجد النهايات الآتية: ٥

$$\lim_{s \rightarrow 5} \frac{1 + \sqrt[5]{s-5}}{2 - \sqrt[5]{s-5}}$$

$$\lim_{s \rightarrow 5} \frac{2 - \sqrt[5]{s-5}}{5 - \sqrt[5]{s-5}}$$

$$\lim_{s \rightarrow 5} \frac{s^n - 1}{s - 1} = n^{th}$$



مثال

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^{19} - 1}{s - 1} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{19s^{18} \times 1}{1} = 19$$

نتائج على النظرية:

$$2 - \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^n - 1}{s - 1} = n^{th}$$

$$1 - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s+1)^n - 1}{s} = n^{th}$$

مثال

أوجد:

$$\frac{32 - ^0s}{s - 2} \quad \text{ب}$$

$$\frac{625 - ^4s}{s - 5} \quad \text{أ}$$

$$\frac{32 + ^0s}{s - 2} \quad \text{د}$$

$$\frac{1 - ^{11}s}{s - 1} \quad \text{ج}$$

$$20 = 32 \times \frac{5}{3} = \frac{32 - ^0s}{s - 2} \quad \text{ب}$$

$$500 = 35 \times 4 = \frac{625 - ^4s}{s - 5} \quad \text{أ}$$

$$11 = 1 - ^{11}s \quad 1 \times 11 = \frac{1 - ^{11}s}{s - 1} \quad \text{ج}$$

$$\frac{^0(2) - ^0(4-s)}{(2) - (4-s)} = \frac{32 + ^0s}{s - 2} \quad \text{د}$$

$$80 = ^4(2-s) 5 =$$

حاول أن تحل

أوجد:

$$\frac{81 - ^4(3+s)}{s - 5} \quad \text{ب}$$

$$\frac{s^4 - 5}{s - 5} \quad \text{أ}$$

$$\frac{1 - \sqrt[3]{s+1}}{s} \quad \text{ج}$$

تمارين (٣-٢)

أكمل ما يأتي:

$$\dots = \frac{1 - s}{1 + s} \quad \text{٢}$$

$$\dots = (s^3 + 1)s \quad \text{١}$$

$$\dots = \frac{s^2 - s}{s} \quad \text{٤}$$

$$\dots = \frac{s^2 - s}{s} \quad \text{٣}$$

$$\dots = \frac{s^3 - s}{s^2 - s} \quad \text{٦}$$

$$\dots = \frac{s^0 - 1}{s - 1} \quad \text{٥}$$

$$\dots = \frac{s^4 - 16}{s^2 - 4} \quad \text{٨}$$

$$\dots = \frac{s^2 + s - 1}{s - 1} \quad \text{٧}$$

$$\dots = ^0\left(\frac{s^2 - 1}{s - 1}\right) \quad \text{٩}$$

$$\dots = \frac{32 - ^0s}{s^3 - 8} \quad \text{٩}$$

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 2 \\ s \leftarrow 1^-}} \frac{s^2 - 3s + 2}{s^3 - s^2} = \frac{1 + 7}{1 + 1} = 8 \quad (11)$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة:

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 2 \\ s \leftarrow 1^-}} \frac{s^2 - 3s + 2}{s^3 - s^2} \text{ تساوى:} \quad (13)$$

١ ب

٠ أ

٥ ليس للدالة نهاية

٢ ج

ب صفر

١- أ

٣ د

١ ج

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 1^- \\ s \leftarrow 1^+}} \frac{s^2 - 3s + 2}{s^3 - s^2} \text{ تساوى:} \quad (14)$$

٤ ب

٢ أ

٨ د

٦ ج

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 2 \\ s \leftarrow 2^-}} \frac{s^2 - 8s + 2}{s^2 - 8s} \text{ تساوى:} \quad (15)$$

٧ ب

١ أ

٥ ليس للدالة نهاية

٢ ج

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow \frac{\pi}{2}^- \\ s \leftarrow \frac{\pi}{2}^+}} \frac{\text{جاس}}{s} \text{ تساوى:} \quad (16)$$

١ ب

٢ أ

٥ ليس للدالة نهاية

٤ ج

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow \frac{\pi}{3}^- \\ s \leftarrow \frac{\pi}{3}^+}} \frac{\text{طاس}}{s} \text{ تساوى:} \quad (17)$$

أوجد قيمة كل من النهايات الآتية (إن وجدت)

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 3^- \\ s \leftarrow 2^-}} \frac{s^3 - 2s^2}{s^3 - s^2} = (s^2 - 3s + 2) \quad (18)$$

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow \frac{\pi}{2}^- \\ s \leftarrow \pi^-}} \frac{\text{جتا} s}{s} = (2s - \text{جاس}) \quad (20)$$

$$\text{نهاية } \lim_{\substack{s \rightarrow 1^- \\ s \leftarrow 9^-}} \frac{s^{-9}}{s^{-2} - 81} = \frac{1}{s^3 + 1} \quad (22)$$

٢٥ نهاية $\frac{1 - s^2}{s - 1}$	٢٤ نهاية $\frac{s^2 + 4}{s - 4}$
٢٧ نهاية $\frac{s^2 - 25}{s - 5}$	٢٦ نهاية $\frac{4s^2 - 64}{s - 4}$
٢٩ نهاية $\frac{5 + s^2}{3 - s^3}$	٢٨ نهاية $\frac{2 - s^2}{s + 1}$
٣١ نهاية $\frac{2s^2 - s^3 - 9}{4s^2 - 2s^3}$	٣٠ نهاية $\frac{s^3 + 8}{s^3 - 2}$
٣٣ نهاية $\frac{2s^2 + 5s^3 - 6}{3s^2 + s^3 - 6}$	٣٢ نهاية $\frac{6s^2 - s^3}{2s^2 - s^3}$
٣٥ نهاية $\frac{(s+1)(s-1)^3}{s^0}$	٣٤ نهاية $\frac{1 - s^5}{s^5}$
٣٧ نهاية $\frac{2s^3 - s^2 + 2s^2 - 1}{s^3 - 1}$	٣٦ نهاية $\frac{(s^3 + 4s^3 - s^3)}{(s^3 + 1)}$
٣٩ نهاية $\frac{s^3 - s^5 - s}{s^4 + 2s^0}$	٣٨ نهاية $\frac{2 - s^3}{s - 1}$
٤١ نهاية $\frac{1 - \sqrt[6]{s}}{s - 1}$	٤٠ نهاية $\frac{2 - s^3}{s^3 - 1}$
٤٣ نهاية $\frac{1 - \sqrt[6]{s+1}}{s^0}$	٤٢ نهاية $\frac{3 - \sqrt[3]{s^4 - 3}}{s^3 - 3}$
٤٥ نهاية $\frac{1 - \sqrt[7]{s}}{s^1 - 1}$	٤٤ نهاية $\frac{4 - \sqrt[4]{s^9 + 16}}{s^0}$
٤٧ نهاية $\frac{64 - s^3}{s^4 - s^2}$	٤٦ نهاية $\frac{s^4 - 16}{s^2 - 2}$
٤٩ نهاية $\frac{128 - s^7}{s^2 - s^4}$	٤٨ نهاية $\frac{243 - s^5}{s^3 - 3}$
٥١ نهاية $\frac{128 - s^3}{16 - s^2}$	٥٠ نهاية $\frac{s^6 - 64}{s^3 - 32}$
٥٣ نهاية $\frac{\frac{1}{s} - s^{\frac{7}{3}}}{s^2 - s^1}$	٥٢ نهاية $\frac{16^{32} - s^0}{16^{16} - s^4}$
٥٥ نهاية $\frac{81 - s^4}{s^6 - s^0}$	٥٤ نهاية $\frac{1 - s^9}{s^0 - s^1}$
	٥٦ نهاية $\frac{81 - s^4}{s^1 - s^0}$

الوحدة الثالثة

٣-٣

نهاية الدالة عند الالانهائية

Limit of a Function at Infinity

سوف تتعلم


- نهاية الدالة عند الالانهائية
- إيجاد نهاية الدالة عند الالانهائية باستخدام الخل الجبرى.
- إيجاد نهاية الدالة عند الالانهائية باستخدام الخل البياني.

المصطلحات الأساسية

- نهاية دالة عند الالانهائية.
- Limit of a Function at Infinity*

نحتاج في كثير من التطبيقات العملية والحياتية إلى معرفة سلوك الدالة (s) عندما $s \rightarrow \infty$ والنطاق التالي يوضح ذلك.

نشاط



استخدم أحد برامج الحاسوب في رسم الدالة D حيث: $D(s) = \frac{1}{s}$, $s > 0$.

ماذا تلاحظ من منحنى الشكل إذا أزدادت قيم s الموجبة حتى تقترب من ما لانهائية؟
من الشكل المرسوم نلاحظ أن:

«إنه كلما زادت قيمة s واقتربت من مالا نهاية اقتربت قيمة $D(s)$ من الصفر، لذلك نقول إنَّ نهاية $D(s)$ عندما تقترب من ما لانهائية تُساوى صفر.

تعلم

نهاية دالة عند الالانهائية

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s = \infty$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0 \quad \text{حيث } n \in \mathbb{N}^+, \text{ ثابت}$$

قواعد أساسية:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} g = g, \text{ حيث } g \text{ ثابت}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s^n = \infty \quad \text{إذا كان } n \text{ عددًا موجباً أكبر من الواحد فإنَّ}$$

لاحظ أن: **نظيرية (٢)** المتعلقة بنهاية مجموع أو فرق أو ضرب أو قسمة دالتين عند $s \rightarrow \infty$ السبق دراستها في الدرس السابق صحيحة عندما $s \rightarrow \infty$


مثال

أوجد: ١

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{3}{s^2} \right) \quad \text{ب}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{s} \right) \quad \text{أ}$$

ثم تتحقق من ذلك بيانياً باستخدام أحد البرامج الرسمية.




الحل

$$3 = \lim_{s \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{s} \right) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{s^2} \right) + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s^2} \quad \text{أ}$$

$$3 = 3 + 0 =$$

$$\therefore \lim_{s \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{3}{s^2} \right) = 3$$



$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{3}{s^2} \right) = \lim_{s \rightarrow \infty} 4 - \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3}{s^2} \quad \text{ب}$$

$$4 = 0 \times 3 - 4 = \lim_{s \rightarrow \infty} 3 - \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4}{s}$$

$$\therefore \lim_{s \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{3}{s^2} \right) = 4$$

حاول أن تحل ٤

أوجد: ١

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{2}{s^2} \right) \quad \text{ب}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{5}{s^2} \right) \quad \text{أ}$$

مثال

أوجد: $\lim_{s \rightarrow \infty} (s^3 + 4s - 5)$ ٢

الحل

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s^3 + 4s - 5) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^3 \left(1 + \frac{4}{s^2} - \frac{5}{s^3}\right)$$

وذلك بأخذ s^3 عامل مشترك

$$\lim_{s \rightarrow \infty} = 1 \times \infty = (\frac{0}{s^3} + \frac{4}{s^2}) \lim_{s \rightarrow \infty} s^3 = \lim_{s \rightarrow \infty} s^3$$

٤ حاول أن تحل**٢** أوجد كلاً من النهايات الآتية:




أ $\lim_{s \rightarrow \infty} (s^3 + 7s^2 - s^3)$

مثال**٣** أوجد كلاً من النهايات الآتية:

ج $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 - s^2}{1 + s^3}$

ب $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 - s^3}{1 + s^3}$

أ $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 - s^2}{1 + s^3}$

الحلفي كل الحالات نقسم كل من البسط والمقام على s^2 (أعلى قوة للمتغير s في المقام).

$$\therefore = \frac{\dots}{\dots + 3} = \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} (\frac{3}{s^2} - \frac{2}{s})}{\lim_{s \rightarrow \infty} (\frac{1}{s^3} + 1)} = \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{3}{s^2} - \frac{2}{s})}{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{1}{s^3} + 1)} = \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} (3s - 2)}{\lim_{s \rightarrow \infty} (1 + s^3)} = \frac{3 - 2}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{s^2} - \frac{2}{s}}{\frac{1}{s^3} + 1} &= \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{3}{s^2} - \frac{2}{s})}{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{1}{s^3} + 1)} \\ &= \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} (3s - 2)}{\lim_{s \rightarrow \infty} (1 + s^3)} = \frac{3 - 2}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(s^2 - s^3)}{s^3 + 1} &= \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{3}{s^2} - \frac{2}{s})}{\lim_{s \rightarrow \infty} s^3 (\frac{1}{s^3} + 1)} \\ &= \frac{\lim_{s \rightarrow \infty} (3s - 2)}{\lim_{s \rightarrow \infty} (1 + s^3)} = \frac{3 - 2}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

نستنتج من هذا المثال أنَّ: عند إيجاد $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{d(s)}{r(s)}$ حيث كل من $d(s)$ ، $r(s)$ دوال كثيرات الحدود فإنَّ

﴿ النهاية تعطى عدداً حقيقياً لا يساوي الصفر إذا كانت درجة البسط تساوى درجة المقام. ﴾

﴿ النهاية تساوى صفرًا إذا كانت درجة البسط أقل من درجة المقام. ﴾

﴿ النهاية تطوى (∞ أو $-\infty$) إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام. ﴾

﴿ يستخدم هذا الاستنتاج فقط للتحقق من حلول المسائل باستخدام النظرية والنتيجة ولا تعتبر طريقة للحل. ﴾

حاول أن تحل ٥

أوجد: ٣

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1 + s^2 - 6s^3}{2s^2 + s^3}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4s^4 - 5s^5}{2s^8 + 3s^4}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^5 - 3s^3 + s^2}{s^2 - s^3 + s^5}$$


$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s - \sqrt[4]{s^2 + 4})$$

مثال

أوجد النهايات الآتية: ٤

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 - 3}{1 + s^3}$$

الحل




$$d(s) = \frac{s^2 - 3}{1 + s^3}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على s^3

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{s^2 - 3}{s^3}}{\frac{1 + s^3}{s^3}} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{s} - \frac{3}{s^3}}{\frac{1}{s^3} + 1} =$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s - \sqrt[4]{s^2 + 4})$$



$\therefore s < 0 \Rightarrow d(s) = s$ بقسمة كل من البسط والمقام على $s = \sqrt[4]{s^2}$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{s} - \frac{4}{s^3}}{\frac{1}{s^3} + 1} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{s} - \frac{4}{s^3}}{\frac{1}{s^3} + 1} =$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s - \sqrt[4]{s^2 + 4})$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 - 4}{s^2 + 4}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4 - s^2}{s^2 + 4}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{-s^2}{s^2}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} -1$$

$$\therefore s \rightarrow -\infty$$

حاول أن تحل ٦

أوجد النهايات الآتية: ٤

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s^3 + s^5 - s^7)$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 - 25}{s^4 + 2}$$



تمارين (٣-٣)



أكمل ما يأتى:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{s} \right) \quad \textcircled{2}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{s} + 1 \right) \quad \textcircled{1}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s^2 - 3) \quad \textcircled{4}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (7 - s) \quad \textcircled{3}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^5 - s^3}{1 + s^3} \quad \textcircled{6}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2}{s} \quad \textcircled{5}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3}{1 - s^2} \quad \textcircled{8}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 + s^5}{s^5 - s^3} \quad \textcircled{7}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (1/s^2 - 1/s) = \lim_{s \rightarrow \infty} (1/s^2) - \lim_{s \rightarrow \infty} (1/s) \quad \textcircled{10}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{s} + \frac{7}{s^3} \right) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4}{s} - \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3}{s^2} \quad \textcircled{9}$$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{6s}{s^2 + 3} \quad \text{تساوي:} \quad \textcircled{11}$$

٥

ج

ب

أ صفر

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \sqrt[4]{s^4 + 1} \quad \textcircled{12}$$

٥

ج

ب

أ صفر

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 - 2}{s^2 - s} \quad \textcircled{13}$$

٥

ج

ب

أ صفر

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 - 1}{s^3 + 1} \quad \textcircled{14}$$

٥

ج

ب

أ صفر

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \sqrt[4]{s^4 - 1} \quad \textcircled{15}$$

٥

ج

ب

أ صفر

إيجاد نهاية الدالة عند اللانهاية

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^{7-2}}{s^{3+2}} \quad \textcircled{18}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (s^3 + s^5) (1 + s^2) \quad \textcircled{17}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3}{s^2} \quad \textcircled{16}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^{6-5}}{s^2 + s^4} \quad \textcircled{21}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^4}{s^3 + s^2} \quad \textcircled{20}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{s^3 + s} \quad \textcircled{19}$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1-s^2}{4s^3-5s-1} \quad (24)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3-1}{s^3+4s^2-1} \quad (23)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1-s^2}{s^2+4s+1} \quad (22)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2s^3} - \frac{s^5}{s^2} \right) \quad (25)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{s^3+1} + \frac{7}{s^2} \right) \quad (26)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{6-2s^2}{(s-1)^2} \quad (27)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s^4+s^2} \quad (28)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{s}{s^2+1} + \frac{s^3}{s^3-1} \right) \quad (29)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \left(\frac{5s^5+4s^4+s^2-2s}{s^5+2s^4+s^2+s} \right) \quad (30)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4-3s^3}{9+s^6} \quad (31)$$

$$\text{نهاية } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+s-1}{s^3-3s^2-8s} \quad (32)$$

تفكيير ابداعى

تنتيج إحدى الشركات بطاقات معايدة بتكلفة ابتدائية قدرها ٥٠٠٠ جنيه، وتكلفة لكل كارت نصف جنيه فكانت التكلفة الإجمالية $J = \frac{1}{2}s + 5000$ حيث s عدد البطاقات المنتجة.

أوجد:

١ تكلفة إنتاج الكارت عند إنتاج:

ب 10000 كارت

أ 1000 كارت

٢ أوجد تكلفة إنتاج الكارت عندما تنتيج الشركة عدداً لانهائي من الكروت.

تمارين عامة

لمزيد من التمارين قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

نشاط




استخدام التكنولوجيا في إيجاد نهاية دالة عند نقطة (الحاسبة البيانية)
استخدم الحاسبة البيانية في رسم كل من الدوال الآتية، ثم أوجد نهاية كل دالة عند النقطة المبينة:

ب
$$d(s) = \frac{s^3 - 1}{s - 1}$$
 عند $s = 1$


أ
$$d(s) = s^3$$
 عند $s = 0$

ج
$$d(s) = \frac{s^{22} - s}{s - 1}$$
 عند $s = 0$


الحل



أ باستخدام الحاسبة البيانية نمثل منحني الدالة $d(s) = s^3$ من الرسم $\lim_{s \rightarrow 1^-} d(s) = 0$



ب باستخدام الحاسبة البيانية نمثل منحني الدالة $d(s) = \frac{s^{22} - s}{s - 1}$ من الرسم $\lim_{s \rightarrow 1^-} d(s) = 1$ (لاحظ الفجوة عند النقطة $(1, 1)$)



ج باستخدام الحاسبة البيانية نمثل منحني الدالة $d(s) = \frac{s^{22} - s}{s - 1}$ من الرسم $\lim_{s \rightarrow 1^-} d(s) = 1$

معلومات إثرائية @

قم بزيارة المواقع الآتية:



مُلْخَصُ الْوَحْدَةِ

﴿ تجري العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد الحقيقة والرموز ∞ ، $-\infty$ كالتالي: لكل $a \in \mathbb{R}$ فإن:

$$\infty - a = \infty \quad (2)$$

$$a + \infty = \infty \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} a \times \infty = \infty, \text{ إذا كان } a > 0. \\ \infty \times a = \infty, \text{ إذا كان } a > 0. \end{array} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} a \times \infty = \infty, \text{ إذا كان } a > 0. \\ \infty \times a = \infty, \text{ إذا كان } a > 0. \end{array} \right\} \quad (4)$$

﴿ إذا كانت قيمة الدالة d تقترب من قيمة وحيدة L ، عندما تقترب س من أ من جهتي اليمين واليسار، فإن نهاية $d(s)$ تساوى L **وتكتب رمزيًا:** $\lim_{s \rightarrow a} d(s) = L$ **وتقرأ:** نهاية $d(s)$ عندما تقترب س من a تساوى L .

﴿ إن وجود نهاية للدالة عندما س $\rightarrow a$ لا يعني بالضرورة أن تكون الدالة معرفة عند س = a ، والعكس إذا كانت معرفة عند س = a فهذا لا يعني وجود نهاية للدالة عند س = a .

﴿ **إذا كانت** $\lim_{s \rightarrow a} d(s) = L$ **فإن:**

$$\lim_{s \rightarrow a} [d(s) \pm f(s)] = L \pm M \quad (1)$$

$$\lim_{s \rightarrow a} [d(s) \cdot f(s)] = L \cdot M \quad (2)$$

$$\lim_{s \rightarrow a} \frac{d(s)}{f(s)} = \frac{L}{M} \quad (3)$$

$$\lim_{s \rightarrow a} (d(s))^n = L^n \quad (4)$$

$$\lim_{s \rightarrow a} (d(s))^{-n} = \frac{1}{L^n} \quad (5)$$

نهاية الدالة عند الالانهاية.

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0. \quad \{ \text{حيث } n \in \mathbb{N}, \text{ ثابت} \} \quad (1)$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s^n = \infty \quad (2)$$

﴿ عند إيجاد $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{d(s)}{f(s)}$ حيث كل من $d(s)$ ، $f(s)$ دوال كثيرات الحدود فإن:

١) النهاية تعطى عدداً حقيقياً لا يساوى الصفر إذا كانت درجة البسط = درجة المقام.

٢) النهاية تساوى صفرًا إذا كانت درجة البسط أقل درجة المقام.

٣) النهاية تعطى $\pm \infty$ إذا كانت درجة البسط أكبر درجة المقام.

﴿ عند إجراء عملية القسمة المطلولة يجب مراعاة ما يأتي:

١) ترتيب حدود كل من المقسم والمقسوم عليه ترتيباً تصاعدياً ، وتنازلياً بنفس النظام.

٢) نقسم الحد الأول من المقسم على الحد الأول من المقسوم عليه وتكتب ناتج القسمة.

٣) نضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه ويطرح الناتج من المقسم للحصول على الباقي.

٤) نستمر بنفس الطريقة حتى الانتهاء من عملية القسمة.

اختبار تراكمي

١) وضع كلَّ كَسْرٍ مِنَ الْكَسُورِ الْجَبَرِيَّةِ الْآتِيَةِ فِي أَبْسِطِ صُورَةِ :

٥) $\frac{s^3 + s}{s^3 - 9s}$

ج) $\frac{25s^2}{(s-5)^2}$

ب) $\frac{s+1}{s^2+3s+1}$

أ) $\frac{s}{s^2-s}$

إذا كان $b(s) = \frac{s^2 + 4s}{s^2 + 8s + 16}$ هل $b(s) = b(s)$? فسر إجابتك.

إذا كان $b(s) = \frac{3}{s+1}$ فأوجد $b(s) = b(s) + b(s)$ مبيناً مجال b .

٤) أُوجِدْ أَبْسِطْ صُورَةً لِلداَلَةِ d حِيثُ $d(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1}$ مبيَّناً مجالها.

٥) أُوجِدْ أَبْسِطْ صُورَةً لِلداَلَةِ r حِيثُ $r(s) = \frac{s^2 + 5s}{s^3 - s}$ مبيَّناً مجالها.

٦) اكتب التعبير الرمزي للجملة الرياضية الآتية:
إذا اقتربت $d(s)$ من l ($l \in \mathbb{Q}$) حينما تقترب s من a فإن l تعرف كنهاية $L(d(s))$ عندما تقترب s من a .

٧) إذا كانت $d(s) = \frac{s^2 - 1}{s-1}$ فادرس قيم $d(s)$ عندما تقترب s من 1


٨) إذا كانت الدالة d حِيثُ $d(s) = \begin{cases} s & \text{عندما } s > 2 \\ s^2 & \text{عندما } s \leq 2 \end{cases}$

رسم منحني هذه الدالة، ثم ابحث وجود $\lim_{s \rightarrow 2^-} d(s)$

٩) أعطِ أمثلة عَدَديَّةً تُوَضِّحُ فيها ما يَأْتِي:

أ) وجود نهاية للدالة عندما $s \rightarrow 1$ لا يعني بالضرورة أن تكون الدالة معرفة عند $s = 1$

ب) إذا كانت الدالة معرفة عند $s = 1$ فهذا لا يعني وجود نهاية للدالة.



١٠) في الشكل المقابل أُوجِدْ :

أ) $\lim_{s \rightarrow -\infty} d(s)$
ب) $\lim_{s \rightarrow 0^+} d(s)$

ج) $\lim_{s \rightarrow 2^-} d(s)$
د) $\lim_{s \rightarrow \infty} d(s)$

١١) أُوجِدْ النهايات الآتية إِنْ وُجِدَتْ:

أ) $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{4s^7}{5s^2 + 2s}$
ب) $\lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{s^4 - 3s^2}{s^5 + 2s^3}$
ج) $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{as}{s^3 + 1 - s}$
د) $\lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{b}{s^2 + 1}$

هـ) $\lim_{s \rightarrow 2^-} \frac{s^2 - 5s + 6}{s^2 - 2s}$
وـ) $\lim_{s \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt[3]{s+3} - \sqrt[3]{1}}{s-1}$

الوحدة الرابعة

حساب المثلثات

Trigonometry

مقدمة الوحدة

حساب المثلثات (باللاتيني Trigonometry) هو أحد فروع مادة الرياضيات بوجه عام والهندسة العامة بوجه خاص حيث يوجد العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه في صورة دوال مثلثية (دالة الجيب، دالة جيب التمام، دالة الظل، ...)، وكان قدماء المصريين أول من عمل بقواعد حساب المثلثات، إذ استخدموها في بناء الأهرامات وبناء معابدهم، ترجع معرفتنا لعلم حساب المثلثات إلى الأغريق الذين وضعوا قوانينها وصاغوا نظرياتها، كما قدم البيروني برهاناً لمساحة المثلث بدلالة أطوال أضلاعه. كما أن الغرب عرفوا هندسة أقليدس عن طريق العرب. ومن مآثر العرب في حساب المثلثات هو استخدامهم النسب المثلثية لست حيث كشف التباني العلاقة الخاصة بالمثلث الكروي القائم الزاوية كما اكتشف قانون إيجاد ارتفاع الشمس.

لعلم حساب المثلثات تطبيقات كثيرة في حساب المسافات والزوايا التي تستخدم في إنشاء المباني والملاعب الرياضية والطرق وفي صناعة المحركات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، كما يستخدم حساب المثلثات في حساب المسافات الجغرافية والفلكلية وفي أنظمة الاستكشافات بالأقمار الصناعية.

مخرجات تعلم الوحدة :

في نهاية هذه الوحدة وتنفيذًا للأنشطة فيها يتوقع من الطالب أن:

- ❖ يُتَعْرِفُ بِقَانُونِ (قَاعِدَةِ) الْجِيبِ لِأَيِّ مُثَلِّثٍ، وَالَّذِي يَنْصُّ عَلَى أَنَّهُ فِي أَيِّ مُثَلِّثٍ تَنَاسِبُ أَطْوَالُ أَضْلاعِ المُثَلِّثِ مَعَ جِيَوبِ الزُّوَايَا الْمُقَابِلَةِ لَهَا.
- ❖ يُسْتَخْدِمُ قَانُونِ (قَاعِدَةِ) الْجِيبِ فِي إِيجَادِ أَطْوَالِ أَضْلاعِ أَيِّ مُثَلِّثٍ.
- ❖ يُسْتَخْدِمُ قَانُونِ (قَاعِدَةِ) الْجِيبِ وَجِيبِ التَّمَامِ لِأَيِّ مُثَلِّثٍ فِي إِيجَادِ قِيَاسِ زُوَايَا هَذِهِ الْمُثَلِّثِ.
- ❖ يُسْتَخْدِمُ قَانُونِ (قَاعِدَةِ) الْجِيبِ لِأَيِّ مُثَلِّثٍ فِي إِيجَادِ قِيَاسِ حلِّ هَذِهِ الْمُثَلِّثِ.
- ❖ يُسْتَخْدِمُ الْآلَةُ الْحَاسِبَةُ فِي حلِّ تَمَارِينِ وَأَنْشَطَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ عَلَى قَانُونِ (قَاعِدَةِ الْجِيبِ، وَجِيبِ التَّمَامِ) لِأَيِّ مُثَلِّثٍ.
- ❖ يَسْتَنْتَجُ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ قَانُونِ (قَاعِدَةِ) الْجِيبِ لِأَيِّ مُثَلِّثٍ وَطُولِ نِصْفِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ الْخَارِجَةِ لِهَذِهِ الْمُثَلِّثِ.
- ❖ يُتَعْرِفُ بِقَانُونِ (قَاعِدَةِ) جِيبِ التَّمَامِ لِأَيِّ مُثَلِّثٍ.

المصطلحات الأساسية

Largest Angle	أكبر زاوية	Shortest Side	أقصر ضلع	Trigonometry	حساب مثلثات
The Area of the Triangle	مساحة المثلث	Longest Side	أطول ضلع	Sine Rule	قاعدة الجيب
أطوال أضلاع المثلث		Missing Length	طول ضلع مجهول	Cosine Rule	قاعدة جيب التمام
The Sides Lengthes of a Triangle		UnKnown Angle	زاوية مجهولة	Acute Angle	زاوية حادة
The Opposite Angle of an Side		Smallest Angle	أصغر زاوية	Obtuse Angle	زاوية منفرجة
زاوية مقابلة				Right Angle	زاوية قائمة

الأدوات والوسائل

دروس الوحدة

آلة حاسبة علمية

الدرس (١-٤): قانون (قاعدة) الجيب

الدرس (٢-٤): قانون (قاعدة) جيب التمام

مخطط تنظيمي للوحدة



قانون (قاعدة) الجيب

The Sine Rule


تمهيد

سبق أن تعلّمت كيفية حل المثلث القائم الزاوية، والآن سوف نتعامل مع مثلثات غير قائمة الزوايا لتعلم كيفية إيجاد أطوال أضلاع وقياسات زوايا هذه المثلثات. تعلم أنَّ كل مثلث يتكون من ستة عناصر، ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، وإذا أعطيت أي ثلاثة عناصر منها (على أن يكون من بينها طول أحد الأضلاع على الأقل) فإنه يمكنك إيجاد العناصر الثلاثة الأخرى، وذلك باستخدام قانوني الجيب وجيب التمام، وعندئذ نقول: إنه أمكننا حل المثلث.

تعلم


قانون (قاعدة) الجيب

تمثل الأشكال الآتية ثلاثة أنواع من المثلثات.




شكل (٣)

$$\angle A = 90^\circ$$



شكل (٢)

$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C$$



شكل (١)

$$\angle A = 90^\circ$$

$$\sin A = \frac{a}{c}$$

في الشكل (١) حيث $\triangle ABC$ حاد الزوايا

$$\sin B = \frac{b}{c}, \quad \sin C = \frac{c}{b}$$

وبالمثل يمكن استنتاج أن

في الشكل (٢) حيث $\triangle ABC$ منفرج الزاوي في A

$$\sin A = \sin(180^\circ - B) = \sin B$$

$$[\text{لاحظ أن: } \sin(180^\circ - B) = \sin B]$$

$$\therefore \sin A = \frac{a}{c}$$

وبالمثل يمكن استنتاج أنَّ

$$\sin B = \frac{b}{c}, \quad \sin C = \frac{c}{b} \quad (\text{استعن بمعلمك لاثبات صحة ذلك})$$

لاحظ أن



$a/b = \sin A / \sin B$ رموز لأطول
الأضلاع $b/c = \sin B / \sin C$ ، $c/a = \sin C / \sin A$
في $\triangle ABC$ على الترتيب.

سوق تعلم

- قانون (قاعدة) الجيب لأى مثلث.
- استخدام قانون (قاعدة) الجيب فى حل المثلث.
- نمذجة وحل مشكلات رياضية وحياتية باستخدام قاعدة الجيب.
- العلاقة بين قانون (قاعدة) الجيب لأى مثلث وطول نصف قطر الدائرة الخارجية لهذا المثلث وحل مسائل عليها

المصطلحات الأساسية

Sine Rule	قاعدة الجيب
Acute Angle	زاوية حادة
Obtuse Angle	زاوية منفرجة
Right Angle	زاوية قائمة

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية

تذكر أن



الزوايا المحيطية التي تحضر نفس القوس في الدائرة متساوية في القياس.
الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قائمة.

والآن: حاول إثبات نفس العلاقة السابقة في $\triangle ABC$ حيث c القائم الزاوية في $\triangle ABC$ وبصفة عامة قانون (قاعدة) الجيب في المثلث ABC هي:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

حيث c طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث.

أي أن: في أي مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع جيوب الزوايا المقابلة لها.

تعلم ذاتك



أثبت قانون الجيب بطرق أخرى


استخدم قانون (قاعدة) الجيب في إيجاد أطول أضلاع أي مثلث:

مثال



- ١ في المثلث ABC إذا كان $\angle A = 34^\circ$, $\angle B = 75^\circ$, $\angle C$ أقرب عدد صحيح.

الحل



باستخدام الآلة الحاسبة

$$c = \frac{10.2 \times \sin 71^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 6 \text{ سم}$$

ابدأ → ١ ٠ . ٢ × sin ٧ ١ „) ÷ sin ٧ ٥ „) =

حاول أن تحل



- ١ في المثلث ABC إذا كان $\angle A = 49^\circ$, $\angle B = 61^\circ$, $\angle C$ أصغر من A , C .

إيجاد طول أكبير ضلع في المثلث

مثال



- ٢ أوجد طول أكبير ضلع في المثلث ABC الذي فيه $\angle A = 11^\circ$, $\angle B = 17^\circ$, $\angle C = 111^\circ$, $a = 11.22$ سم مقرباً الناتج لأقرب رقمين عشربيين.

تنظر أن



أكبر ضلع في المثلث هو الضلع المقابل لأكبر زاوية والعكس أصغر زاوية في المثلث هي المقابلة لأصغر ضلع.

الحل

$$\therefore \text{و}(\angle J) = 180^\circ - [\text{و}(\angle A) + \text{و}(\angle B)] \\ 180^\circ = 117^\circ + 49^\circ - 54^\circ 32$$

\therefore أكبر ضلع هو المقابل لزاوية ب، أي أن المطلوب هو إيجاد ب

$$\therefore \frac{11,22}{\sin 17^\circ} = \frac{b}{\sin 32^\circ} \quad \therefore \frac{b}{\sin B} = \frac{\sin 32^\circ}{\sin 17^\circ} \times 11,22 \\ \therefore b \approx \frac{13,38}{\sin 17^\circ}$$

حاول أن تحل

- ٢ أوجد طول أصغر ضلع في المثلث أب ج، الذي فيه $\text{و}(\angle A) = 43^\circ$, $\text{و}(\angle B) = 65^\circ$, $\text{ج} = 4$, سم مقرباً الناتج لرقم عشري واحد.

Solving the Triangle Using the Sine Rule

حل المثلث باستخدام قانون الجيب

المقصود بحل المثلث هو إيجاد قياسات العناصر المجهولة فيه إذا علم منه ثلاثة عناصر من العناصر الستة بشرط أن يكون من بين العناصر المعلومة طول أحد الأضلاع على الأقل، لأنه لا يمكن حل المثلث إذا علم منه قياسات ثلاث زوايا، ويسمح لنا قانون الجيب بحل المثلث، إذا علم منه قياساً زاويتين وطول أحد أضلاعه.

حل المثلث إذا علم منه قياساً زاويتين وطول أحد أضلاعه:

لاحظ أنه لحل المثلث أب ج إذا علم فيه قياساً زاويتين ب، ج والطول أ تتبع التالى:

١- نستخدم العلاقة $\text{و}(\angle A) + \text{و}(\angle B) + \text{و}(\angle J) = 180^\circ$ لإيجاد $\text{و}(\angle J)$

٢- نستخدم قانون الجيب: $\frac{A}{\sin A} = \frac{B}{\sin B}$ لإيجاد ب

٣- نستخدم قانون الجيب: $\frac{A}{\sin A} = \frac{C}{\sin C}$ لإيجاد ج

وفيما يلى أمثلة توضح ذلك:

مثال


- ٣ حل المثلث أب ج الذي فيه $\text{و}(\angle A) = 36^\circ$, $\text{و}(\angle B) = 48^\circ$, $\text{ج} = 8$ سم مقرباً الناتج لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

الحل

نوجد $\text{و}(\angle J)$ من العلاقة:

$$\text{و}(\angle J) = 180^\circ - 36^\circ - 48^\circ = 96^\circ$$

نوجد ب من قانون الجيب كالتالي:



وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالتالي:

8 \times sin 48 ÷ sin 36 =

$$\therefore \frac{ج}{ج_ا} = \frac{\sin ج}{\sin ج_ا}$$

$$\therefore ج = \frac{\sin ج_ا \times ج}{\sin ج_a}$$

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالتالي:

حاول أن تحل

٣ حل المثلث س ص ع فيه ص = ١٠٧, ٢ ، و (ج) = ٤٤° ، و (جـ) = ٦٣°

Geometrical Applications

تطبيقات هندسية

العلاقة بين قاعدة الجيب لأي مثلث وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث

سبق أن علمنا أن: $\frac{ج}{ج_ا} = \frac{\sin ج}{\sin ج_ا}$ حيث مع نصف قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث

مثال

٤ أ ب ج مثلث فيه ج = ١٥ سم، و (جـ) = ٤٥° ، و (جـ) = ٦٠° ، أوجد جـ وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج مقارباً الناتج لأقرب عدد صحيح.

الحل


نوجد و (جـ) كالتالي:

$$\begin{aligned} و (جـ) &= [١٨٠ - ٦٠] + ٤٥ \\ &= ١٢٠ + ٤٥ \\ &= ١٦٥ \end{aligned}$$

نستخدم قانون الجيب لإيجاد جـ :

$$\begin{aligned} \therefore \frac{ج}{ج_ا} &= \frac{\sin ج}{\sin ج_ا} \\ ج &= \frac{ج_ا \times \sin ج}{\sin ج_ا} \end{aligned}$$

$$ج = \frac{١٥ \times \sin ١٦٥}{\sin ٦٠}$$



لإيجاد نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج نستخدم العلاقة:

$$\therefore ج = \frac{ج_ا}{ج_ا \times \sin جـ} = \frac{١٥}{١٥ \times \sin ٦٠}$$

$$\therefore ج = \frac{١٥}{٢ \times \sin ٦٠} \approx ٩ سم$$

و (جـ) = ١٦٥

حاول أن تحل

٤ أ ب ج مثلث فيه و (جـ) = ٦٤٢٣° ، و (جـ) = ٧٢٢٣° ، جـ = ١٨ سم، أوجد كل من أ ، بـ وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب جـ .

تنكر أن




مساحة سطح المثلث =
 $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب أى ضلعين
 × جيب الزاوية بينهما

مثال



- ٥ أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة مركزها م، وطول نصف قطرها ١٠٠ سم فإذا كان $أب = 182$ سم أوجد
- أ طول \overline{Bc} لأقرب رقم عشري واحد.
 ب مساحة سطح المثلث أب ج لأقرب سنتيمتر مربع.



الحل

نوجد $\angle B$ كالتالي:
 في $\triangle ABC$ يكون:

$$\frac{AC}{AB} = \frac{\sin B}{\sin C}$$

$$\frac{182}{200} = \frac{\sin 65^\circ}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore \angle B = 48.59^\circ$$

$(\angle B) = (\angle C)$ لأن المثلث أب ج متساوي الساقين وكلاهما زاوية حادة)

نوجد $\angle A$

$$\angle A = 180^\circ - 65^\circ - 48.59^\circ \approx 66.41^\circ$$

نوجد طول \overline{BC} باستخدام قانون الجيب كالتالي:

$$\therefore BC = \frac{182 \times \sin 65^\circ}{\sin 48.59^\circ} \approx 150.9 \text{ سم}$$

$$\therefore \frac{BC}{\sin 48.59^\circ} = \frac{182}{\sin 65^\circ}$$

ابداً → ١ ٨ ٢ × sin ٤ ٨ ... ٥ ٩ ٢ ٢) ÷

sin ٦ ٥ ... ٣ ٠ ... ١ ٩ ...) =

$$\text{مساحة المثلث } ABC = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin A$$

$$= \frac{1}{2} \times 182 \times 182 \times \sin 65^\circ \approx 12497 \text{ سم}^2$$

حاول أن تحل

- ٥ أ ب ج مثلث فيه $AB = 10.3$ سم، مرسوم داخل دائرة طول نصف قطرها ٤ سم أوجد:



ب مساحة سطح المثلث أب ج

أ طول القاعدة \overline{BC}

Life Applications on the Sine Rule

تطبيقات حياتية على قاعدة الجيب

يمكن استخدام قاعدة الجيب في حل الكثير من التطبيقات وذلك برسم مثلث ثم حل هذا المثلث لإيجاد المطلوب.



مثال

٦ البرط

المقابل ثلاثة لاعبين من فريق كرة القدم خلال إحدى المباريات. أوجد المسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث لأقرب قدم.

الحل

$$\text{و } (\angle\text{ب}) = 180^\circ - (47^\circ + 70^\circ) = 63^\circ$$

والمسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث هي أ


$$\text{فيكون: } \frac{\text{أ}}{\text{جا}} = \frac{92 \times 92}{63} \Rightarrow \text{أ} = \frac{63}{92} \times 92 \text{ قدماً}$$

باستخدام الآلة الحاسبة

المسافة بين اللاعب الثاني واللاعب الثالث هو تقريرًا ٧٦ قدماً

حاول أن تحل

٦ أوجد المسافة بين اللاعب الأول واللاعب الثاني لأقرب قدم.



مثال

٧ البرط بالجغرافية: في الشكل التالي ثلاثة مواقع جغرافية

تشكل مثلثاً، إذا كانت المسافة بين الموقع أ، والموقع ب، ٢٣٦ مترًا، وكان قياس الزاوية عند الموقع ب يساوي 72° ، وقياس الزاوية عند الموقع أ تساوي 51° . أوجد:

أ المسافة بين الموقع ج، والموقع ب مقاربًا الناتج لأقرب عدد صحيح.

ب مساحة الأرض التي تمثل الموقع أ، ب، ج رؤوساً لها مقاربًا الناتج لأقرب متر مربع.

الحل

$$\text{أ نوجد } (\angle\text{ج}) \text{ في } \triangle\text{أب ج}: \text{و } (\angle\text{ج}) = 180^\circ - (72^\circ + 51^\circ) = 57^\circ$$


نستخدم قاعدة الجيب لإيجاد طول ب جـ:

$$\therefore \frac{\text{ب جـ}}{\text{جا}} = \frac{\text{أب}}{\text{جـاجـ}} \text{ (قاعدة الجيب)} \therefore \frac{\text{ب جـ}}{\text{جا}} = \frac{236}{\text{حا}^{51^\circ}} \therefore \text{ب جـ} = \frac{236 \times \text{جا}}{\text{حا}^{51^\circ}} \text{ ومنها ب جـ} = \frac{236 \times 236}{\text{حا}^{51^\circ}} \approx 218,6871 \text{ مترًا}$$

ب نوجد مساحة سطح المثلث أب جـ بمعلومية أ، جـ، و (ب)

$$\therefore \text{مساحة المثلث أب جـ} = \frac{1}{2} \text{أ جـ جـاب}$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث أب جـ} = \frac{1}{2} \times 218,6871 \times 236 \times \text{جا}^{72^\circ} \approx 24542 \text{ م}^2.$$




٥ حاول أن تحل

٧ في الشكل المقابل ثلاثة مواقع جغرافية تشكل مثلثاً، إذا كانت المسافة بين الموقع س والموقع ص تساوى ٩ كم، وقياس الزاوية عند الموقع س تساوى 40° ، وقياس الزاوية عند الموقع ع تساوى 105° ، فأوجد:

أ المسافة بين الموقع س والموقع ع.

ب مساحة سطح المثلث الذي رؤوسه المواقع الثلاثة س، ص، ع.

استخدام قاعدة الجيب لأي مثلث في إيجاد قياسات زوايا هذا المثلث (يوجد حلين لزاوية مجهولة).



نشاط ١

ارسم المثلث أب ج الذي فيه ب = ٧ سم، أ = ٥ سم، و ($\angle A = 30^\circ$)

الأدوات المستخدمة:

ورق - قلم رصاص - مسطرة - فرجار - منقلة.

أ من نقطة أ ارسم أس ←




ب من نقطة أ استخدم المنقلة لرسم زاوية قياسها 30° ←

مع أـس ثم ارسم جـ التي طولها ٧ سم.

ج ركز سن الفرجار عند النقطة جـ وبفتحة الفرجار بمقدار ٥ سم ارسم قوساً يقطع

أس في نقطة ب ماذا تلاحظ؟ ←

نلاحظ أن القوس يقطع أـس في نقطتين. أي أن يوجد رسمان للمثلث أب جـ أحدهما حاد الزوايا والآخر منفرج الزاوية.



٦ قارن بين ارتفاع المثلث (ع) المرسوم من نقطة جـ تـأس و بين طول بـجـ . ماذا تلاحظ؟ ←

نلاحظ أن: $ع = ٣,٥$ سم، $ب = ج = ٥$ سم، $أ = جيب ع > أ > ب$

هل يمكنك استخدام قاعدة الجيب في إيجاد قياسات زوايا المثلث السابق؟ فسر إجابتك.

نبح إمكانية حل المثلث $أ - ج - ب$ كالتالي:

نوجد أقصر بعد مرسوم من $ج$ على $\overline{أب}$ وليكن $ع$. $ع = ب - ج$

حيث أن $\angle ب$ حادة، $ع > ب$ فتوجد قيمتان لزاوية $ب$ أحدهما الزاوية الحادة والأخرى هي الزاوية المكملة لها. نستخدم قاعدة الجيب كالتالي:

$$\frac{ب}{ج} = \frac{أ}{جيب الع} \quad \text{أي أن: } ج = \frac{أ \times الع}{جيب الع} \quad \text{ومنها تكون: } ج = \frac{أ \times ٣٠}{جيب الع}$$


لذلك فإن $\cos(\angle ب) \approx ٠٣٧$

وتكون الزاوية الأخرى (منفرجة) $\approx ١٣٥^\circ$

تطبيق على النشاط

ل $م$ مثلث فيه $ل = ١٢$ سم، $م = ١٥$ سم، $و(\angle ل) = ٤٠^\circ$. اثبت أنه يوجد لزاوية $م$ قيمتان ثم أوجدهما.

استخدام الآلة الحاسبة في حل تمارين وأنشطة على قاعدة الجيب.



نشاط ٢

الشكل المجاور يمثل ثلاثة مواقع لمدن مصرية تكون مثلثاً.

إذا كانت المسافة بين السويس والقاهرة ٨ سم وقياس الزاوية عند السويس ٣٠°

وعند الفيوم ٤٠° . أوجد لأقرب كيلو متر المسافة بين القاهرة والفيوم إذا كان كل ١ سم في الرسم يمثل $١٦,٧٥$ كم في الحقيقة.

أ هل يمكنك إيجاد $\angle(أ)$ ؟

$$\angle(أ) = ١٨٠^\circ - (٤٠^\circ + ٣٠^\circ) = ١١٠^\circ$$

$$→ \begin{array}{ccccccccc} 1 & 8 & 0 & - & (& 3 & 0 & + & 4 & 0 &) & = \\ & & & & & & & & & & & \end{array}$$

ب كيف توجد المسافة الحقيقة بين السويس والقاهرة؟

الطول في الحقيقة = الطول في الرسم \div مقياس الرسم

$$\text{أب} = \frac{٨}{١٦,٧٥} = ٠١٣٤ \text{ كم.}$$

$$→ \begin{array}{ccccccccc} 8 & \div & (& 1 & \div & 1 & 6 & . & 7 & 5 &) & = \\ & & & & & & & & & & & \end{array}$$

ج كيف توجد المسافة الحقيقة بين القاهرة والفيوم؟

نستخدم قاعدة الجيب كالتالي: $\frac{ب}{ج} = \frac{ج}{ج - الع}$

تذكرة أ



الطول في الرسم	=	مقياس الرسم	الطول في الحقيقة
الطول في الرسم	=	الطول في الحقيقة	\div مقياس الرسم
الطول في الرسم	=	الطول في الحقيقة \times مقياس الرسم	

$$\text{أي أن: } \frac{\sin 30^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{134}{x} \Rightarrow x = \frac{134 \times \sin 30^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 104 \text{ كم.}$$

→ ابدأ 1 3 4 × sin 3 0) ÷ sin 4 0) =

٥ هل يمكنك استخدام الطول الدقيق في الرسم لإيجاد المسافة بين القاهرة والفيوم؟

من الرسم الموجود بهذا النشاط نجد أن: $AJ \approx 6,2$ سم

لذلك فإن الطول الحقيق بينهما $\approx 6,2 \div \frac{1}{16,75} \approx 104$ كم.

تدريب على النشاط:

في النشاط السابق أوجد باستخدام قاعدة الجيب المسافة الحقيقة بين السويس والفيوم ثم تحقق من صحة الناتج باستخدام القياس.



أكمل:

١ في أي مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع

٢ أب ج مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلعه 3610 سم، فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث تساوى

٣ مثلث أب ج فيه و($\angle A = 60^\circ$ ، و($\angle G = 40^\circ$ ، ج $= 80^\circ$) سم فإن أ = سم

٤ في المثلث أب ج يكون $\frac{ب}{ج} = \frac{ج}{ب}$ مع

٥ دائرة طول قطرها 20 سم، تمر برؤوس المثلث أب ج الحاد الزوايا الذي فيه ب ج = 10 سم فإن و($\angle A$) =

٦ مساحة المثلث المتساوي الأضلاع الذي طول ضلعه 6 سم يساوى

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

٧ طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب ج الذي فيه و($\angle A = 30^\circ$ ، و($\angle G = 10^\circ$) هو

٥ ٤٠ ٢٠ أ ١٠ اسم

٨ إذا كان طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أب ج يساوى 4 سم، و($\angle A = 30^\circ$) فإن طول أ هو

٥ ٣٦٤ ٢ أ ٤ سم

٩ في المثلث أب ج يكون المقدار 2 مع جاً مساوياً

٥ م(ΔA ج) ج ج ب ب أ أ مع

١٠ إذا كانت بع هي طول نصف قطر الدائرة الخارجة عن المثلث س ص ع فإن جاص يساوى

٥ ٤ ٢ أ بع ج ج ب ب

١١ المثلث ل م ن فيه، و($L = 30^\circ$ ، م ن = 7 سم، فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوسه تساوى:

$$\frac{14}{36} \quad ٥$$

$$\text{جـ } ١٤ \text{ سم}$$

$$\text{بـ } ٣٣,٥ \text{ سم}$$

$$\text{أـ } ٧ \text{ سم}$$


١٢ في المثلث $\triangle ABC$ إذا كانت $\angle A = 30^\circ$ ، $\angle B = 20^\circ$ ، $\angle C = 130^\circ$ ، $BC = 14$ سم، $AC = 33,5$ سم، $AB = ?$

$$6 : 3 : 4 \quad ٥$$


$$6 : 4 : 3 \quad \text{جـ}$$

$$3 : 4 : 6 \quad \text{بـ}$$

$$4 : 3 : 2 \quad \text{أـ}$$



$$\text{بـ}$$



$$\text{أـ}$$

حل كلّ مثلث $\triangle ABC$ باستخدام قانون الجيب إذا علمت أن:

$$14 \quad \text{وـ } (\angle A) = 75^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 19^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 105^\circ, \text{ جـ } 11,1 \text{ سم} \quad ١٤$$

$$16 \quad \text{وـ } (\angle A) = 116^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 36^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 18^\circ, \text{ بـ } 2,5 \text{ سم} \quad ١٦$$

$$18 \quad \text{وـ } (\angle A) = 49^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 17^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 112^\circ, \text{ جـ } 11 \text{ سم} \quad ١٨$$

$$19 \quad \text{وـ } (\angle A) = 115^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 117^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 11^\circ, \text{ بـ } 516,2 \text{ سم} \quad ١٩$$

أوجد طول قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث $\triangle ABC$ في كلّ حالة مما يلى:

$$20 \quad \text{وـ } (\angle A) = 75^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 50^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 90^\circ, \text{ جـ } 21 \text{ سم} \quad ٢٠$$

$$22 \quad \text{وـ } (\angle A) = 70^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 85^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 102^\circ, \text{ بـ } 11 \text{ سم} \quad ٢٢$$

نشاط (٢٤، ٢٥، ٢٦)



في كلّ مثلث $\triangle ABC$ ، أوجد قياسات زاويتي B ، C التي تتحقق الشروط المعطاة، ارسم أشكالاً لتساعدك في تقرير ما إذا كان هناك مثلاً ممكِن لمثلث واحد.

$$24 \quad \text{وـ } (\angle A) = 62^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 30^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 48^\circ, \text{ بـ } 125 \text{ سم} \quad ٢٤$$

$$26 \quad \text{وـ } (\angle A) = 23^\circ, \text{ وـ } (\angle B) = 89^\circ, \text{ وـ } (\angle C) = 17^\circ, \text{ بـ } 17 \text{ سم} \quad ٢٦$$

٢٧ في المثلث $\triangle ABC$ ، $\text{وـ } (\angle A) = 22^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle B) = 44^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle C) = 33^\circ$ ، $AB = 100$ سم، أوجد محيط المثلث $\triangle ABC$ ومساحة سطحه.

٢٨ في المثلث $\triangle ABC$ إذا كان $AB = 68$ سم، $AC = 46$ سم، $\text{وـ } (\angle A) = 40^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle B) = 100^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle C) = 40^\circ$ ، أوجد سـ وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث $\triangle ABC$ ، ثم أوجد مساحة سطح المثلث.


٢٩ $\triangle ABC$ مثلث فيه $\text{وـ } (\angle A) = 22^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle B) = 37^\circ$ ، $\text{وـ } (\angle C) = 23^\circ$ ومحطيه 30 سم أوجد كل من A ، B لأقرب سنتيمتر

- ٣٠ أب ج مثلث محيطه ٤٥٠ سم، و($\angle B$) = 82° ، و($\angle C$) = 56° ، أوجد قيمة أ.
- ٣١ أب جي متوازي أضلاع فيه أب = ١٨, ٦ سم، و($\angle A$) = 36° ، و($\angle B$) = 44° ، و($\angle C$) = 38° ، أوجد طول القطر \overline{AC} ومساحة سطح متوازي الأضلاع.
- ٣٢ أب جي شبه منحرف فيه $A\overline{B}\parallel\overline{CJ}$ ، $A_i = 22, 3$ سم، و($\angle D$) = 115° ، و($\angle E$) = 15° ، و($\angle B$) = 66° ، احسب طول كل من \overline{AJ} ، \overline{JB} .
- ٣٣ أب جي هـ مخمس منتظم طول ضلعه ١٨, ٢٦ سم، أوجد طول قطره \overline{AC} .
- ٣٤ أب، \overline{AC} وتران في دائرة طولاهما ٥٤٣, ٥ سم، ٥٢, ١ سم، مرسومان في جهتين مختلفتين من القطر \overline{AD} الذي طوله ١٠٠ سم أوجد:

أ و($\angle B$) ب طول \overline{Bj}

- ٣٥ أب جي دـ شكل رباعي فيه و($\angle B$) = 85° ، و($\angle C$) = 87° ، و($\angle D$) = 36° ، و($\angle A$) = 55° ، جـ = ١٠٠ سم، أوجد طول كل من \overline{Bd} ، \overline{Aj} و($\angle B$) = 38° ، و($\angle C$) = 62° ، أوجد طول العمود النازل من أعلى \overline{Bj} .


- ٣٦ قطعة أرض على شكل مثلث أب جـ فيه $A = 58^\circ$ سم، و($\angle B$) = 38° ، و($\angle C$) = 64° متراً، و($\angle D$) = 53° ، و($\angle E$) = 90° ، أوجد محيط هذه القطعة ومساحتها.



تفكيك إبداعى :

- ٣٨ **الربط بالجغرافيا:** منارتان أ، ب المسافة بينهما ٢٠ كم على خط واحد من الشمال إلى الجنوب، وكانت سفينة في الموقع جـ، بحيث و($\angle A$) = 33° ، و($\angle B$) = 52° ، فأوجد المسافة بين السفينة وكل من المنارتين.

- ٣٩ **الربط بالتسلق:** في الشكل المقابل: يقف عادل وكريم أمام جدار صخري للتسلق عليه وكانت المسافة بينهما ٨ أمتار، كما هو مبين بالشكل المجاور. ما ارتفاع الجدار الصخري مقرباً لأقرب جزء من عشرة.



- ٤٠ يقف أحمد وصلاح أمام مئذنة وكانت المسافة بينهما ٥٠ متراً، كما هو مبين بالشكل المجاور. ما ارتفاع المئذنة لأقرب جزء من عشرة من المتر.

قانون (قاعدة) جيب التمام

The Cosine Rule



سوف تتعلم

- قانون (قاعدة) جيب التمام لأى مثلث.
- استخدام قانون (قاعدة) جيب التمام فى حل المثلث.
- نمذجة وحل مشكلات رياضية وحياتية باستخدام قاعدة جيب التمام.




المصطلحات الأساسية

- | | |
|--------------|------------------|
| Cosine Rule | قاعدة جيب التمام |
| Acute Angle | زاوية حادة |
| Obtuse Angle | زاوية منفرجة |
| Right Angle | زاوية قائمة |

فك و نقاش

كل من المثلثات التالية لها ضلعان طولهما ٣ سم، ٤ سم.



شكل (٣)

شكل (٢)

شكل (١)

أ من شكل (١) \angle أ قائم، أوجد α .


ب ما القيم الممكنة لـ α في حالة ما تكون \angle أ زاوية حادة (شكل ٢)؟

ج ما القيم الممكنة لـ α في حالة ما تكون \angle أ زاوية منفرجة (شكل ٣)؟

د هل يمكن حل المثلثين في شكلي (٢)، (٣) إذا علمت \angle (١) باستخدام قانون الجيب؟ فسر إجابتك.

يساعدنا قانون (قاعدة) جيب التمام في حل مثل هذه المثلثات.

تعلم



قانون (قاعدة) جيب التمام

في الشكل المقابل: $\overline{AC} \perp \overline{AB}$

في $\triangle ABC$: $(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 - 2 \cdot AC \cdot AB \cdot \cos(\angle C)$

(من فيثاغورث)

$(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 - 2 \cdot AC \cdot AB \cdot \cos(90^\circ)$

$= (AC)^2 + (AB)^2 - 2 \cdot AC \cdot AB \cdot 0$

$= (AC)^2 + (AB)^2 - 2 \cdot AC \cdot AB$

$= (AB)^2 + (AC)^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(\angle B)$

لاحظ أن

$$\bullet (AC)^2 + (AB)^2 = (BC)^2$$

$$\bullet \cos(\angle B) = \frac{AC}{BC}$$

أى $\cos(\angle B) = \frac{AC}{BC}$

فكم: أوجد قيمة كل من AB ، AC بدلالة $\angle B$ ، BC وقياسات زوايا $\triangle ABC$.



الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية

ينص قانون (قاعدة) جيب التمام على أنه: في أي مثلث A b c يكون:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$
تفكير ناقد

١ اثبت قاعدة جيب التمام عندما يكون المثلث A B C منفرج الزاوية.

٢ هل قانون (قاعدة) جيب التمام صحيح في حالة المثلث القائم الزاوية؟ فسر إجابتك.

نشاط ٣

ابحث في مكتبك المدرسي أو باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، عن براهين أخرى لقانون (قاعدة) جيب التمام، ثم نقش معلمك فيما توصلت إليه.

إيجاد طول ضلع مجهول في مثلث.

مثال


١ س $\angle C$ مثلث فيه $s = 3,3$ سم، $c = 22,8$ سم، $a = 24,2$ سم، و $\cos C = 0,42$. أوجد $\angle C$ مقرباً لرقم عشري واحد.

الحل

$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{s^2 + a^2 - c^2}{2sa} \\ 0,42 &= \frac{3,3^2 + 24,2^2 - 22,8^2}{2 \times 3,3 \times 24,2} \\ 0,42 &\approx 0,42 \end{aligned}$$

$\angle C \approx 64,9$ درجة

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالتالي :

→ ابدأ 

٤ حاول أن تحل

١ A B C مثلث فيه $a = 72,8$ سم، $b = 4,8$ سم، $c = 58,4$ سم، و $\cos C = 0,64$. أوجد $\angle C$ مقرباً لرقم عشري واحد.

إيجاد قياس زاوية في المثلث إذا علمت أطوال أضلاعه الثلاثة

سبق أن علمت أن :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

أي أن : $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

فتكون: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

كما يمكن استنتاج أن:

$$\cos A = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2bc}, \quad \text{جتا } A = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

(قاعدة جيب التمام)

(بالقسمة على $2bc$)

استخدام قاعدة جيب التمام لأي مثلث في إيجاد قياس زاوية مجهولة في هذا المثلث.

مثال

٢ من الشكل المقابل، أوجد \angle (ج)

الحل

$$\text{جتا ج} = \frac{\frac{٢١ + ٣}{٢} - ج}{ب} \quad \text{(قاعدة جيب التمام}$$

$$\text{بالتعويض)} \quad \frac{٢(١٢) - ٢(٨) + ٢(٥)}{٨ \times ٥ \times ٢} =$$

$$\frac{٥٥ -}{٨٠} =$$

وذلك باستخدام الآلة الحاسبة كالأتي

$$\rightarrow \text{ابدأ} \rightarrow [5 \ \chi^2 \ + \ 8 \ \chi^2 \ - \ 12 \ \chi^2 \ \div \ (2 \times 5 \times 8)] =$$

ونلاحظ أن جيب تمام الزاوية سالب وبالتالي $\cos \theta$ منفرجة فيكون

$^{\circ} 133^{\prime} 20^{\prime\prime} 07 \approx (\searrow \backslash)_{19}$

حاول أن تحل

٢ من الشكل المقابل أوجد فـ (أ) 

مثال

٣) أوجد قياس أكبر زاوية في المثلث $L M N$ ، إذا $\overline{LM} = 12$ سم ، $M = 5$ سم ، $N = 17$ سم ، ومن ذلك أثبت أنه في هذا المثلث يكون :

تذکر ان



$$\frac{1}{2} - = {}^{\circ} 60 \text{ جتا} - =$$

$$\text{جا}(180^\circ - 60^\circ) = \text{جا} 120$$

$$\frac{3}{x} = 60^\circ$$

١٦٢

•

The calculator screen displays the following information:

- Keypad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .
- Arithmetic operators: \div , $($, \times , $.$, 5 , \times , 1 , 2 , $.$, 5 , $)$, $=$.
- Function keys: SHIFT, COS, ANS, $)$, $=$, ...

The current input on the screen is $(2 * 7 + 5)$, and the result is 17 .

الطرف الآيسر = جنا - ٣٦٣ جان + ٥ = جنا ١٢٠ ° - جان ٣٦ جا + °

$$= \text{صفر} = 5 + \frac{\sqrt[3]{1}}{2} \times \sqrt[3]{3} - \frac{1}{2} = \text{الطرف الأيمن.}$$

حاول أن تحل

٣) المثلث A B C إذا كان $A = 12$ سم ، $B = 15$ سم ، $C = 18$ سم ، أثبت أن $\angle A > \angle B$

استخدام قانون (قاعدة) جيب التمام في حل المثلث


يسُمِحُّ لنا قانون جيب التمام بحل المثلث بمعلومية طولي ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما وفي هذه الحالة يوجد مثلثٌ واحدٌ.

حل المثلث بمعلومية طولي ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما

Solving the Triangle in the Terms of the Lengths of Two Sides and Measure of the Included Angle

تنكر أن

حل المثلث يعني إيجاد عناصره المجهولة، وفي هذه الحالة يكون المطلوب هو إيجاد كل من حَـ، $\angle A$ ، $\angle B$ ، $\angle C$



أبداً →

$$\begin{matrix} \sqrt & 1 & 1 & x^2 & + & 5 & x^2 & - & 2 & \times & 1 & 1 & \times & 5 & \cos \\ & & & & & & & & & & & & & & & & \end{matrix}$$

$$2 \quad 0 \quad =$$

معلومة مفيدة

عند إيجاد قياس زاوية في مثلث بمعلومية طولي ضلعين وقياس الزاوية المحصورة، يفضل استخدام قانون جيب التمام بدلاً من استخدام قانون الجيب، وذلك لأن:

في حالة استخدام قانون الجيب فإن جيب الزاوية الحادة أو المنفرجة دائمًا موجب، لأن الجيب موجب في الربعين الأول والثاني.

أما في حالة استخدام قانون جيب التمام فإنه إذا كانت الزاوية منفرجة فإن جيب تمامها يكون سالبًا.

وإذا كانت الزاوية حادة فإن جيب تمامها يكون موجباً.

مثال

٤ حل المثلث $A B C$ الذي فيه $A = 11$ سم، $B = 5$ سم، $\angle C = 20^\circ$

الحل

$$\begin{aligned} \therefore C^2 &= A^2 + B^2 - 2AB \cos C \\ \therefore C^2 &= (11)^2 + (5)^2 - 2 \times 11 \times 5 \cos 20^\circ \\ \therefore C &= \sqrt{(11)^2 + (5)^2 - 2 \times 11 \times 5 \cos 20^\circ} \approx 6,529 \text{ سم} \end{aligned}$$

$$\tan A = \frac{B \sin C}{B \cos C}$$

$$0,817 \approx \frac{\sqrt{(11)^2 - (6,529)^2}}{6,529 \times 5 \cos 20^\circ} =$$

$$\therefore \angle A \approx 144,786^\circ$$

$$\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C$$

$$[180^\circ - 144,786^\circ] =$$

$$15,214^\circ =$$

$$\therefore B = 144,796^\circ - 144,786^\circ =$$


$$15,020^\circ \approx$$

حاول أن تحل

٤ حل المثلث $A B C$ الذي فيه $A = 6,24$ سم، $B = 14,2$ سم، $\angle C = 42,18^\circ$

Solving the Triangle knowing its Three Side Lengths

حل المثلث بمعلومية أطوال اضلاعه الثلاثة



تذکرہ آن

حل المثلث يعني إيجاد عناصره المجهولة، وفي هذه الحالة يكون المطلوب هو إيجاد كل من حـ، (أ)، (ب)، (جـ)، (دـ).

١٦

الذى فيه $\alpha = 6$ سم ، $\beta = 8$ سم ، $\gamma = 12$ سم

المطلوب إيجاد قياسات زوايا المثلث الثلاثة فيكون:

$$\frac{^2(7) - ^2(12) + ^2(8)}{12 \times 8 \times 2} = \frac{^2\cancel{1} - ^2\cancel{1} + ^2\cancel{8}}{2 \cdot \cancel{1} \cdot \cancel{8}} = جـنا$$

$$\therefore 26^{\circ} 23' \approx (1) \Delta$$

2 χ^2 - 6 χ^2 = ÷ (2 \times
1 2) = SHIFT COS ANS) =

$$\frac{٢٩}{٣٦} = \frac{^٢(٨) - ^٢(٦) + ^٢(١٢)}{٦ \times ١٢ \times ٢} = \frac{^٢ب - ^٢١ + ^٢ج}{^٢ج - ^٢ب} = جتاب$$

$$^{\circ}36^{\prime}20^{\prime\prime}10 \simeq (\text{بـ} \searrow) \therefore$$

$$\therefore \varphi(\text{ج}) = 180^\circ - [26^\circ 23' 44"] + 10^\circ 36' 20" = 180^\circ - 16^\circ 56' 44" = 123^\circ 15' 16"$$

° 11V'17" 46 =

حاول أن تحل

٥ حل المثلث أب ج الذي فيه $A = 12^\circ$, $B = 48^\circ$, $b = 18$ سم، $a = 21$ سم


الكتابة في الرياضيات

افرض أنك تعلم قياسات الزوايا الثلاثة في مثلث ما ، فهل يمكنك استخدام قانون جيب التمام أم قانون الجيب لإيجاد طول ضلع في هذا المثلث ؟ فسر إجابتك.

تطبيقات هندسية على قانون (قاعدۃ) جیب التمام Geometrical Applications on the Cosine Rule

٦) أب ج مثلث فيه $A = 5$ سم، $B = 2$ سم، $C = 4$ سم، نصف $\overline{B-C}$ في Δ ثم صل \overline{AD} ، أوجد: $\omega(\Delta AD)$

الحل



في المثلث أب ج

$$\text{جتا ج} = \frac{ج' + ب'}{ب' - ج'}$$

$$\frac{13}{20} = \frac{^r(\varepsilon) - ^r(2) + ^r(5)}{2 \times 5 \times 2} =$$

$$\therefore \text{و}(\triangle) \simeq ٤٩٢٧٣٠^\circ.$$

ابداً → 5 χ^2 + 2 χ^2 - 4 χ^2 = ÷ (2 × 5 × 2) =
 SHIFT COS ANS =

في المثلث أ وج

$$(أ)^2 = (ج)^2 - ٢ ج \times أ ج \text{ جتا ج}$$

$$= ٤٩٢٧٣٠^\circ - ٢ \times \frac{٥}{٣} \times ٢ - ٢ \left(\frac{٥}{٣} \right)^2 =$$

$$٣,٧٤٩٩ \simeq$$

$$\therefore أ = ١,٩٤ \text{ سم}$$

$$\therefore \text{جتا}(\triangle) = \frac{(ج)^2 + (أ)^2 - (جأ)}{٢ \times ج \times أ}$$

$$= \frac{٢(٢,٥) - ٢(١,٩٤) + ٢(٢)}{١,٩٤ \times ٢ \times ٢} = ٠,١٩٥١$$

$$\therefore \text{و}(\triangle) \simeq ٧٨١٤٩٤^\circ$$

ابداً → 2 χ^2 + 1 . 9 4 χ^2 - 2 . 5 χ^2 =
 (2 × 2 × 1 . 9 4) = SHIFT COS ANS =

مثال

الربط بال الهندسة: أ ب ج د شكل رباعي فيه أ ب = ٩ سم، ب ج = ٥ سم، ج د = ٨ سم، د أ = ٦ سم، أ ج = ١١ سم، أثبت أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري.

الحل

في المثلث أ ب ج


$$\text{جتا ب} = \frac{٢(١١) - ٢(٥) + ٢(٩)}{٥ \times ٩ \times ٢}$$

في المثلث أ د ج

$$\text{جتا د} = \frac{٢(١١) - ٢(٨) + ٢(٩)}{٨ \times ٩ \times ٢}$$

أ د جتا د = - جتا ب

ويكون و(ج د) + و(ب د) = ١٨٠^\circ



وحيث أن \triangle ب زاويان متقابلان ومتكاملتان في الشكل أ ب ج د

(وهو المطلوب)


∴ الشكل أ ب ج د رباعي دائري.

حاول أن تحل

٦ أ ب ج د شكل رباعي فيه أ ب = ٧,٢ سم، أ ج = ٦,٢ سم، ب ج = ٣,٤ سم، ج د = ٥,٢ سم، د أ = ٧,٢ سم.

أثبت أنَّ الشكل أ ب ج د رباعي دائري.

مناقشة: لكل من المثلثات التالية ، اكتب الصيغة الصحيحة لقانون الجيب أو قانون جيب التمام لإيجاد ما هو مطلوب (يشار إليه باللون الأحمر)، استخدم فقط المعلومات المعطاة والمشار إليها باللون الأزرق.



Life Applications on the Cosine Rule

تطبيقات حياتية على قانون جيب التمام

مثال



٨

الربط بالرياضة والسياحة: في الشكل المقابل يهوى أحد السائرين رياضة الغطس في مياه البحر الأحمر ليشاهد الأعشاب المرجانية النادرة والأسمال الملونة الرائعة، وفي إحدى مرات الغوص نظر الغواص لأعلى بزاوية قياسها 20° فرأى حبأً يبعد عنه مسافة ٣ أمتار، وعندما نظر لأسفل بزاوية قياسها 40° رأى سمكة حمراء تبعد عنه مسافة ٤ أمتار ، فما المسافة بين الحبار والسمكة الحمراء؟

الحل



واضح من الرسم أننا نعلم طول ضلعين في المثلث وقياس الزاوية المحصورة بينهما؛ لذا يمكننا استخدام قانون جيب التمام، وذلك كالتالي:

$$\begin{aligned} 1^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ 1^2 &= (4)^2 + (3)^2 - 2 \times 4 \times 3 \cos 60^\circ \\ 1 &= \\ 1 &\approx 3.6 \text{ أمتار} \end{aligned}$$

أي أن المسافة بين الحبار والسمكة الحمراء يساوي ٣,٦ أمتار تقريرياً.


حاول أن تحل



الربط بالرياضة: يهوى هانى ركوب الدراجات ، فإذا سار مسافة ٦ كم من نقطة A إلى نقطة B ثم سار مسافة ٧ كم من نقطة B إلى نقطة C بحيث $\angle ABC = 79^\circ$ ما المسافة بين النقطتين A ، C لأقرب كم؟

مثال

الربط بالرياضيات: في إحدى مباريات كرة القدم كان لاعب خط الوسط على بعد ٢٠ متراً من لاعب الجناح الأيمن، ودار لاعب خط الوسط بزاوية قياسها 40° ، فرأى لاعب الجناح الأيسر على بعد ١٦ متراً منه ، ما المسافة بين لاعبي الجناحين ؟ (مقرباً لأقرب رقمين عشرة)


الحل


ارسم شكلاً يمثل المسألة وذلك كما هو موضح،

$$21 = b^2 + j^2 - 2bj \cos 40^\circ$$

$$= (16)^2 + (20)^2 - 2 \times 16 \times 20 \cos 40^\circ$$


$$\approx 12,87 \text{ متر}$$

المسافة بين الجناح الأيمن والجناح الأيسر هو حوالي ١٢,٨٧ متراً.

حاول أن تحل

مثال

الألعاب: في ساحة السيارات المتصادمة في مدينة الملاهي، كما هو مبين بالشكل المقابل ، ما المسافة بين السيارتين أ، ب قبل تصادمهما؟

Measuring the Distance Indirectly



في الشكل المقابل أراد شادي أن يقيس المسافة بين النقطتين أ ، ب في جهتين مختلفتين من مبني ، وذلك من الموقع ج الذي يبعد عن أ مسافة ٣٣ متراً، وعن ب مسافة ٤٨ متراً، كما هو موضح بالشكل المقابل ، إذا كان $\angle (ج) = 54^\circ$ ، فأوجد المسافة أب (مقرباً لأقرب رقمين عشرة).

الحل

في المثلث أب ج المسافة أب = جـ

$$جـ^2 = أ^2 + ب^2 - 2ab \cos جـ$$


$$= (33)^2 + (48)^2 - 2 \times 33 \times 48 \cos 54^\circ$$

$$\approx 1530,8963$$

$$\text{جـ} \approx 39,13 \text{ متراً}$$

حاول أن تحل

حسابات مساحات الأرضى: ارادت سناء قياس المسافة من النقطة أ إلى النقطة ب، الواقعتان على شاطئ البحيرة ، فوقفت في الموقع ج ، الذي يبعد عن النقطة أ مسافة ٢٥٨ متراً ، وعن النقطة ب مسافة ٢٥,٥ متراً ، وقامت $\angle ج$ فوجدها 78° ، أوجد طول أب (مقرباً لأقرب رقمين عشرة)





تمارين (٤-٣)



أكمل ما يأتي:

١ في أي مثلث س ص ع يكون:

$$\underline{\text{س}^2 = \text{ص}^2 + \text{ع}^2}, \text{جتا س} = \underline{\text{ص}^2 + \text{ع}^2}$$

٢ مثلث أطوال أضلاعه ١٧، ١٣، ١٥ من السنتيمترات، فإن قياس أكبر زواياه هو $^\circ$

٣ مثلث أطوال أضلاعه ٧، ٥، ٤ سم، فإن قياس أصغر زواياه هو $^\circ$

٤ مثلث أب ج فيه $\text{أ} = ١٠^\circ$ سم، $\text{ب} = ٦^\circ$ سم، $\text{ج} = ٦٠^\circ$ فإن $\text{ج} =$

٥ في المثلث لم ن يكون $\text{م}^2 + \text{n}^2 - \text{l}^2 =$

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

٦ قياس أكبر زاوية في المثلث الذي أطوال أضلاعه ٣، ٥، ٧ هي:

٥٣٠

٥

٦٠

ج

١٢٠

ب

١٥٠

أ

٧ في أي مثلث لم ن يكون المقدار $\frac{\text{ل}^2 + \text{م}^2 - \text{n}^2}{\text{ل} \cdot \text{م}}$ مساوياً:

٥ جان

ج جتان

ب جتام

أ جال

٥ جاس

ج جاتع

ب جتاس

أ جاع

٨ في المثلث س ص ع يكون $\text{س}^2 + \text{ع}^2 - \text{س}^2 = ٢\text{ص} \text{ع}$...

٥ جاس

ج جتان

ب جتام

أ جال

٩ في المثلث أب ج، إذا كان $\text{أ} : \text{ب} : \text{ج} = ٢ : ٣ : ٢$ فإن حتا أتساوي:

٥





٥

ج

ب

أ

استخدم قانون جيب التمام لإيجاد قيمة س لأقرب جزء من عشرة



في المثلث $\triangle ABC$ إذا كان:

(١٤) $A = 5^\circ$, $B = 7^\circ$, $C = 8^\circ$, فأثبت أن $\sin(\angle B) = \frac{1}{6}$.

(١٥) $A = 3^\circ$, $B = 5^\circ$, $C = 7^\circ$, فأثبت أن $\sin(\angle C) = \frac{1}{12}$.

(١٦) $A = 13^\circ$, $B = 7^\circ$, $C = 13^\circ$, فأوجد $\sin(\angle C)$.

(١٧) $A = 13^\circ$, $B = 8^\circ$, $C = 7^\circ$, فأوجد $\sin(\angle A)$.

(١٨) $A = 10^\circ$, $B = 17^\circ$, $C = 21^\circ$, فأوجد قياس أصغر زاوية في المثلث.

(١٩) $A = 5^\circ$, $B = 6^\circ$, $C = 7^\circ$, فأوجد قياس أكبر زاوية في المثلث.

(٢٠) $A = 17^\circ$, $B = 11^\circ$, $C = 42^\circ$, فأوجد $\sin C$ مقرباً لأقرب رقمين عشررين.

(٢١) $B = 16^\circ$, $C = 14^\circ$, $A = 72^\circ$, فأوجد $\sin A$ مقرباً لأقرب رقمين عشررين.

(٢٢) مثلث $\triangle ABC$ فيه $A = 3^\circ$, $B = 5^\circ$, $C = 196^\circ$ سم أوجد:

أ مساحة المثلث $\triangle ABC$

ب $\sin(\angle C)$

(٢٣) $\triangle ABC$ مثلث فيه $A = 9^\circ$, $B = 15^\circ$, $C = 21^\circ$ سم، أوجد قياس أكبر زاوية في هذا المثلث، وأثبت أنها

تحقق العلاقة $\sin A = \sin(180^\circ - B - C)$.


(٢٤) $\triangle ABC$ شكل رباعي فيه $A = 3^\circ$, $B = 8^\circ$, $C = 7^\circ$, $D = 5^\circ$, $E = 8^\circ$ سم، أثبت أن الشكل رباعي دائري.

(٢٥) $\triangle ABC$ شكل رباعي فيه $A = 15^\circ$, $B = 20^\circ$, $C = 16^\circ$, $D = 25^\circ$ سم، $E = 36.52^\circ$, فأجد طول \overline{AC} لأقرب سنتيمتر، ثم أوجد مساحة سطح الشكل الرباعي $\triangle ABC$.


(٢٦) $\triangle ABC$ متوازي أضلاع فيه $A = 12^\circ$, $B = 10^\circ$, طول القطر \overline{B} يساوى 14° سم، أوجد طول القطر \overline{A} لأقرب سنتيمتر.

(٢٧) $\triangle ABC$ شكل رباعي فيه $B = 78^\circ$, $C = 96^\circ$, $D = 97^\circ$, $E = 72^\circ$, $F = 43^\circ$, فأجد طول \overline{AB} .


(٢٨) $\triangle ABC$ مثلث فيه $A = 16^\circ$, $B = 24^\circ$, $C = 80^\circ$, فأجد طول \overline{BC} , وإذا كان \overline{AD} ينصف $\angle B$ من الداخل ويقطع \overline{BC} في D , فأجد طول \overline{AD} .



(٢٩) **الربط بالرياضيات**: ميدان للسباق على شكل مثلث أطوال اضلاعه 1.2 كم، 1.8 كم، 2 كم، أوجد قياس كل زاوية من زواياه.



(٣٠) **مساحات الأرض**: قطعة أرض على شكل مثلث أطوال اضلاعه 300 م، 210 م، 140 م، استخدم قانون جيب التمام لإيجاد مساحة قطعة الأرض مقرباً لأقرب متر مربع.



الربط بالرياضيات: يركب كريم دراجته ليقطع المسافة من النقطة A إلى النقطة B ثم إلى النقطة C بسرعة ٢٨ كم/ساعة، ثم يعود من النقطة C إلى النقطة A مباشرةً بسرعة ٣٥ كم/ساعة، كم دقيقة تستغرقها رحلة كريم ذهاباً وإياباً، قرب لأقرب جزء من عشرة.

الكتابة في الرياضيات: قارن بين الحالات التي تستطيع فيها استخدام قانون الجيب لحل مثلث بتلك التي تستطيع فيها استخدام قانون جيب التمام.

اكتشف الخطأ: أ ب ج مثلث فيه $A = 5$ سم، $B = 10$ سم، $C = 7$ سم، و $\angle A = 27,66^\circ$.
أوجد $\angle C$:

حل كريم

$$\begin{aligned} \therefore \text{جتا } B &= \frac{ج_1 + ج_2 - ب}{ج_1 ج_2} \\ \therefore \text{جتا } B &= \frac{١٠ - ٧ + ٥}{١٠ \times ٧ \times ٢} \approx ٠,٣٧١٤ \\ \therefore و(\angle B) &\approx ١١١,٨^\circ \end{aligned}$$

حل زياد

$$\begin{aligned} \therefore \frac{ب}{جاب} &= \frac{١}{٢٧,٦٦} \\ \therefore \frac{١}{جاب} &= \frac{٧}{٢٧,٦٦} \\ \therefore جاب &= \frac{٢٧,٦٦}{٧} \approx ٠,٩٤٨٨ \\ \therefore و(\angle B) &\approx ٦٨,١٩^\circ \end{aligned}$$

تفكير إبداعي:

٣٤ ضلعان من أضلاع مثلث طولاهما $٢٠,٦$ و $٢٠,٦$ والزاوية المحصورة بينهما ٦٠° أوجد طول الضلع الثالث.

٣٥ أ ب ج مثلث فيه $U = ٨$ سم، $U - B = ٦$ سم، $U - G = ٤$ سم فأوجد قياس أكبر زاوية في المثلث، حيث $U = A + B + G$

٣٦ في المثلث A B C إذا كان $U = ٢٦$ سم، $B = ٢٨$ سم، $U + A = ٩٨$ سم، حيث $٢H$ هو محيط المثلث، فأوجد أطوال أضلاع المثلث، ثم قياس أصغر زاوية في هذا المثلث.


٣٧ إذا كانت النسبة بين جيوب زوايا مثلث هي $٤ : ٥ : ٦$ أوجد النسبة بين جيوب تمام زوايا هذا المثلث.

٣٨ في المثلث S CH إذا كان $\sin^2 C = (\sin U - \sin S)^2 + \cos^2 C$ أثبت أن $\sin(\angle C) = ٦٠^\circ$

تمارين عامة

لمزيد من التمارين قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

ملخص الوحدة




١ لل مثلث ستة عناصر هي ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا.

٢ حل المثلث يعني إيجاد عناصره المجهولة بدلالة عناصره المعلومة، وقد استخدمنا في هذه الوحدة قانوني الجيب وجيب التمام مع استخدام الآلة الحاسبة العلمية لحل المثلث وحل تطبيقات هندسية وحياتية.

٣ قانون (قاعدة) الجيب: في أي مثلث ، تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع جيوب الزوايا المقابلة لها، أي أنه في

$$\text{أي مثلث } \triangle ABC \text{ يكون: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



وقد أمكن استخدام هذا القانون في حل المثلث متى علم قياسا زاويتين وطول ضلع فيه:

٤ في أي مثلث $\triangle ABC$ يكون:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (\text{نقطة قياس})$$

حيث R طول نصف قطر الدائرة الخارجية للمثلث $\triangle ABC$

٥ قانون (قاعدة) جيب التمام:

وينص قانون (قاعدة) جيب التمام على أنه: في أي مثلث $\triangle ABC$ يكون

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (\text{جتا } A) \quad \text{ومنه}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \quad (\text{جتا } B) \quad \text{ومنه}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (\text{جتا } C) \quad \text{ومنه}$$

استخدام قانون جيب التمام في حل المثلث:

يمكن استخدام قاعدة جيب التمام في حل المثلث إذا علم:

طولا ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما.

أطوال أضلاعه الثلاثة.

معلومات إثرائية @

قم بزيارة الموقع الآتي:



مساحة المثلث: نصف حاصل ضرب ضلعين متجاورين في جيب الزاوية المحصورة بينهما

$$M(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin A = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin B = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin C.$$



اختبار تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد :

- ١** بدون استخدام الآلة الحاسبة تكون قيمة جتا 120° أ - $\frac{1}{2}$
 $\frac{2}{3\sqrt{6}}$ **د** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ **ج** $\frac{1}{2}$ **ب**
- ٢** أي من الزوايا الآتية يكون الجيب وجيب التمام لها سالبان؟ أ 75°
 330° **د** 265° **ج** 125° **ب**
- ٣** إذا كان جا $\theta = 64^\circ$ فإن قياس الزاوية θ بالدرجات يساوي: أ $27,39^\circ$
 $27,39$ **د** $0,008^\circ$ **ج** $0,008$ **ب**
- ٤** العلاقة التي تربط بين ظا هـ، قا هـ تُعطى على الصورة: أ $\text{ظا}^{\text{هـ}} - 1 = \text{قا}^{\text{هـ}}$
 $\text{ظا}^{\text{هـ}} - 1 = \text{قا}^{\text{هـ}}$ **د** $\text{قا}^{\text{هـ}} - 1 = \text{ظا}^{\text{هـ}}$ **ج** $\text{ظا}^{\text{هـ}} - \text{قا}^{\text{هـ}} = 1$ **ب**
- ٥** نصف قطر الدائرة المارة برأوس المثلث أب جـ الذي فيه $\angle A = 60^\circ$ ، $\angle B = 36^\circ$ سم يكون طوله: أ ٢ سم
 $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ **د** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ **ج** $\frac{3}{2}$ **ب**
- ٦** في أي مثلث لم يكن المقدار: $\frac{م^2 + ن^2 - ل^2}{2mn}$ مساوياً أ جتال
جان **د** جال **ج** جتام **ب**
- ٧** في المثلث أب جـ يكون بـ مساوياً أ جـ
جـ جـ جـ **د** جـ جـ جـ **ج** جـ جـ جـ **ب**
- ٨** في المثلث أب جـ ، إذا كان $A = 12^\circ$ ، $B = 28^\circ$ ، $C = 20^\circ$ فإن $\angle B$ تساوى: أ 30°
 150° **د** 120° **ج** 60° **ب**

أسئلة ذات إجابات قصيرة :

- ٩** أوجد بدون استخدام الآلة الحاسبة قيمة كل مما يأتي: أ جتا 2π
 $\frac{\pi\sqrt{7}}{4}$ **د** 330° **ج** 135° **ب**
- ١٠** أوجد القيمة الدقيقة لكل مما يأتي: أ جا $(-300)^\circ$
 $\frac{\pi}{3}$ جـ **د** $\frac{\pi}{7}\text{ جتا}(\frac{\pi}{7})$ **ج** $45^\circ \times \text{جتا } 210^\circ$ **ب**
- ١١** في المثلث سـ صـ عـ إذا كان $S = 10$ سم، $\angle S = 30^\circ$ ، $\angle C = 45^\circ$ ، $\angle U = 45^\circ$ ، فأوجد SC .
أ بـ جـ مـ **د**
- ١٢** أب جـ مثلث فيه $A = 4$ سم، $B = 5$ سم، $C = 6$ سم، أوجد قياس أكبر زاوية في المثلث، ثم أوجد مساحته.




١٣) في الشكل المقابل: استخدم الأطوال المعطاة في المثلث لتتحقق من أن:

$$\text{أ} \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \text{ب} \quad \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

الأسئلة ذات الإجابات الطويلة :

١٤) حل المثلث المقابل مقرّباً طول الضلع إلى أقرب جزء من عشرة والزاوية إلى أقرب درجة




١٥) س ص ع مثلث فيه: $\text{و}(س) = \frac{1}{3} \text{و}(ع)$, $\text{و}(ص) = \frac{1}{3} \text{و}(ج)$, وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه ١ سم، أوجد محيط المثلث س ص ع.

١٦) حل المثلث أ ب ج الذي فيه، $أ = 12$ سم، $\text{و}(ج) = 66^\circ$, $\text{و}(ب) = 5$ سم مقرّباً الطول لأقرب سنتيمتر و الزاوية لأقرب درجة.

١٧) أ ب ج د رباعي فيه $أ ب = 8$ سم، $أ د = 10$ سم، $\text{و}(أ) = 82^\circ$, $ب ج = 12$ سم، $\text{و}(ج ب) = 68^\circ$, أوجد طول $\overline{ج د}$ لأقرب سنتيمتر.

١٨) **الربط بالتاريخ:** الهرم الأكبر (هرم خوفو) هو أكثر آثار العالم إثارة للجدل والخيال حيث يعد نقلة حضارية كبرى في تاريخ مصر القديم، وقد حاول المهندسون في ذلك الوقت بناء الواجهة على شكل مثلث متساوي الأضلاع إذ يقدر طول ضلعه بـ ٢٣٠ متراً. أوجد لأقرب متر ارتفاع المثلث المتساوي الأضلاع لأقرب متر.



إن لم تستطع الإجابة على أحد هذه الأسئلة يمكنك الاستعانة بالجدول المرفق

رقم السؤال	أرجع إلى
١٨	١٧
١٧	١٦
١٦	١٥
١٥	١٤
١٤	١٣
١٣	١٢
١٢	١١
١١	١٠
١٠	٩
٩	٨
٨	٧
٧	٦
٦	٥
٥	٤
٤	٣
٣	٢
٢	١
١	

اختبارات عامة

الجبر


الاختبار الأول

أجب عن الأسئلة الآتية:


السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

إذا كان $d: s \rightarrow s^3$ حيث $s = x$ فإن الشكل الذي يمثل الدالة d هو:


٥




ج



ب



أ

إذا كان $d: s \rightarrow s^3$ فإن $s =$

٥ صفر

ج

ب

أ

مدى الدالة d حيث $d(s) = |s|$ هو٥ $[0, \infty)$ ج $[0, \infty)$ ب $[0, \infty)$ أ $[0, \infty)$ إذا كان $d(s) = s^5$ فإن $d(-2) =$ ٥ $\frac{1}{5}$ ج $\frac{1}{25}$

ب

أ -2

السؤال الثاني:

إذا كان الدالة d حيث $d(s) = \frac{1}{s}$ فأوجد مجال الدالة d وإحداثي نقطة التماثل لمنحنى هذه الدالة . ثمأوجد مجموعة حل المعادلة $d(s) = 4$ ارسم منحنى الدالة d حيث:

$$\begin{cases} d(s) = s^2 \\ \text{لكل } s \geq 2 \\ \text{لكل } s > 5 \end{cases}$$

ومن الرسم عين مدى الدالة وابحث اطرادها.

السؤال الثالث:

ارسم منحنى الدالة d حيث $d(s) = |s-3|$ واستنتج من الرسم مدى الدالة واطرادها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢) أوجد في ع مجموعة الحل لكل من:

ب $|s - 3| = \text{صفر}$

أ $|s - 3|^5 \leq 0$

السؤال الرابع :

١) أوجد في ع مجموعة حل المعادلة:

ب $s^9 - s^{3 \times 3} = \text{صفر}$

أ $\log s = \log 3 + \log 10$

٢) اختصر:

ب $\log_6 54 - \log_6 9$

أ $\frac{4}{2+8} \cdot \frac{1+2 \times 1}{1+2 \times 1}$

السؤال الخامس :

١) بدون استخدام الحاسبة أوجد في أبسط صورة قيمة: $\log_{30} \frac{1}{30} + \log_{30} \frac{1}{\log_e 30} + \log_e \frac{1}{\log_e 30}$

٢) ابحث نوع كلاً من الدالتين الآتتين من حيث كونها دالة زوجية أو فردية:

ب $d(s) = s^3 - 2s^2$

أ $d(s) = s^2 + \log s$

الجبر

الاختبار الثاني

اجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) مجموعة حل المتباينة $|s - 1| < \text{صفر}$ هو:

د $[1, 1]$

ج $[-1, 1]$

ب $[1, -1]$

أ $[-1, 1]$

٢) إذا كان $s^4 = \log_e s$ فإن الصورة الاسية المكافئة هي:

د $s = 8$

ج $s = 16$

ب $s^2 = 2$

أ $s^2 = 4$


٣) مجال الدالة في الشكل المقابل هو:

ب $(-\infty, 0)$

أ $(0, \infty)$

د $[0, \infty)$

ج $(-\infty, 0]$



٤ أى الدوال الآتية تمثل دالة أسيّة تزايدية على مجالها ع:

أ $D(s) = s^3 - 1$ **ب** $D(s) = \frac{1}{s^3}$ **ج** $D(s) = 3s + 5$ **د** $D(s) = 0.05s^0$

السؤال الثاني:

١ إذا كانت $D(s) = |s-3|^{2+} + |s-2|^3$ فاثبت أن $D(2) = D(-1)$

٢ استخدم منحني الدالة D حيث $D(s) = s^3$ في رسم كل من الدوال الآتية:

أ $D(s) = s^3 - 1$ **ب** $D(s) = (s+1)^2$

السؤال الثالث:

١ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في ع:

أ $\log_2 s + \log_2 (s+1) = 1$ **ب** $s^3 + s^2 + s^1 + s^0 = 36$

٢ أوجد في ع مجموعة حل المعادلة الآتية:

ب بدون استخدام الحاسبة أثبت ان: $\log_3 27 + \log_3 8 = \log_3 216$

السؤال الرابع:

١ أوجد في ع مجموعة حل المتباينة $|s+1| > 2$

٢ ارسم الشكل البياني للدالة D حيث $D(s) = \begin{cases} s & s < -1 \\ 1 & -1 \leq s < 2 \\ 5-s & s \geq 2 \end{cases}$

ومن الرسم أوجد مجال ومدى الدالة وابحث اطراها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

السؤال الخامس:

١ ارسم منحني الدالة D حيث:

$$D(s) = \begin{cases} s & s < -1 \\ 1 & -1 \leq s < 2 \\ 5-s & s \geq 2 \end{cases}$$

٢ إذا كانت $D(s) = s^2 + s - 2$ أوجد مجموعة حل كل من:

أ $D(s) = 32$ **ب** $D(s-2) = \frac{1}{8}$

تفاضل وحساب مثلثات

الاختبار الثالث

اجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: أختير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) في $\triangle ABC$ إذا كان $A = 80^\circ$ سم، محيط $\triangle ABC = 26$ سم فإن: $C = \angle C$ \approx

٥ 108° ج $77,4^\circ$ ب $52,3^\circ$ أ $35,3^\circ$

٢) $\frac{1-s^2}{s-1} =$
 $s \leftarrow 1$ أ صفر

٣ 5 ج 2 ب 1

٣) في $\triangle ABC$: إذا كان $C = 30^\circ$ ، $B = 60^\circ$ سم فإن $\frac{1}{\sin A}$ جاب

٤ 12 ج $\frac{1}{2}$ ب 6 أ 3

٤) $\frac{1-s^2}{s-1} =$
 $s \leftarrow 1$ أ صفر

٥ 20 ج 4 ب 1 أ 5

السؤال الثاني:

١) أوجد كلام من:

أ $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^{5/4} + s^{3/4}}{s^2 + s^{1/4}}$

ب $\lim_{s \rightarrow 2^-} \frac{s^{2+} - s^{-3}}{s^{2-} - s^{-2}}$

٢) $\triangle ABC$ فيه: $A = \frac{1}{3} B = \frac{1}{4} C$ أوجد قياس أكبر زواياه**السؤال الثالث:**

١) أوجد قيمة كلام من:

أ $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^{3/4} - s^{4/5}}{s^{5/4} + s^{6/5}}$

ب $\lim_{s \rightarrow 3^-} \frac{\sqrt[4]{s+1} - \sqrt[4]{s-2}}{\sqrt[4]{s-2} - \sqrt[4]{s-3}}$

٢) أوجد محيط $\triangle ABC$ الذي فيه: $A = 80^\circ$ سم، $B = 60^\circ$ سم، $C = 48^\circ$ **السؤال الرابع:**

١) أوجد كلام من:

أ $\lim_{s \rightarrow 3^-} \frac{s^{2-} - s^{-2}}{s^{3-} - s^{-3}}$

ب $\lim_{s \rightarrow 2^-} \frac{s^{2-} - s^{-2}}{s^{3-} - s^{-3}}$

٢) أوجد طول قطر الدائرة المارة ببرؤوس $\triangle ABC$ في الحالتين الآتتين:

$$\begin{array}{l} \text{ا} = 21 \text{ سم} \\ \text{ب} = 15 \text{ سم} \\ \text{ج} = 10 \text{ سم} \end{array}$$

السؤال الخامس:

١) أوجد قيمة كل من :

$$\frac{1 + s^2 - s^3}{1 + s^3} \quad \text{ب} \quad \frac{s^3 - s^2 + 1}{s^3 - s^2} \quad \text{أ}$$

٢) $\triangle ABC$ فيه $\angle A = 36^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ ثم أوجد مساحة الدائرة المارة برؤوسة.

تفاضل وحساب مثلثات

الاختبار الرابع

أجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: اختـر الإجـابة الصـحيحة مـن بـين الإـجابـات المعـطـاة:

١) في أي مثلث L من يكون $\frac{L}{\text{حاج}} = \text{مساوياً}:$

$$\frac{\text{م} / \text{ن}}{\text{جان} + \text{جام}} \quad \text{ج}$$

$$\frac{\text{ن} / \text{م}}{\text{جام}} \quad \text{ب}$$

$$\frac{\text{م} / \text{أ}}{\text{جان}} \quad \text{أ}$$

$$\text{نها} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4s^2}}{2s} \quad \text{نها} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{نها} = \frac{1}{2}$$

٢ د ٥ ج ٥ ب ٤ أ

٧ د ٥ ج ٣ ب ٢ أ

٤) في $\triangle ABC$ إذا كان $BC = 3$ و $AC = 4$ وجاء فإن $\angle A = \angle B$: جـ يساوى

٣:٤:٦ ٥ ٦:٤:٣ ٧ ٢:٣:٤ ٨ ٤:٣:٢ ٩

السؤال الثاني:**١** أوجد قيمة كلًا من:

$$\frac{1-^4(s-^2)}{s-^1} \quad \text{بـ نـهـا} \quad \text{بـ}$$

$$\frac{s-^3}{s-^2} \quad \text{أـ نـهـا} \quad \text{أـ}$$

٢ أب جـى متوازى الأضلاع فيه أب = ٧ سم، القطران أـجـ، بـ يصنعاً مع أـب زاويتين قياسيهما 65° و 28° . على الترتيب أوجد طول كل من بـ، أـجـ.**السؤال الثالث:****١** أوجد كلًا من:

$$\frac{1+^2s-^4}{s-^2} \quad \text{بـ نـهـا} \quad \text{بـ}$$

$$\frac{s-^3}{s-^3} \quad \text{أـ نـهـا} \quad \text{أـ}$$

٢ أب جـى شـكـل رباعـي فيه أـب = ٩ سم، بـ جـ = ٥ سم، جـى = ٨ سم، كـ = ١١ سم، فـأـثـبـتـ أنـ الشـكـلـ أـبـ جـىـ رـبـاعـيـ دائـرـيـ.**السؤال الرابع:****١** أوجد قيمة كلًا من:

$$\frac{32-^0(s+^1)}{s-^1} \quad \text{بـ نـهـا} \quad \text{بـ}$$

$$\frac{s-^3-^6s-^5}{s-^2-^1} \quad \text{أـ نـهـا} \quad \text{أـ}$$

٢ أـبـ جــ مـثـلـثـ فـيـهـ حـتـاـ = $\frac{1}{2}$ هـ، بـ / = $\frac{1}{2}$ ، جـ / = ٢ سم، أـثـبـتـ أـنـ المـثـلـثـ مـتـسـاوـيـ السـاقـيـنـ.**السؤال الخامس:****١** أوجد قيمة

$$\frac{1}{s-^1} \quad \text{بـ نـهـا} \quad \text{بـ}$$

$$\frac{s-^3-^2s-^1}{s-^2-^1} \quad \text{أـ نـهـا} \quad \text{أـ}$$

٢ أـبـ جــ مـثـلـثـ فـيـهـ وـ(ـبـ) = 35° ، وـ(ـجـ) = 70° وـطـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ الدـائـرـةـ المـارـةـ بـرـؤـوسـهـ = ١٦ سـمـ أحـسـبـ مـسـاحـةـ وـمـحـيـطـ المـثـلـثـ أـبـ جــ لـأـقـرـبـ عـدـ صـحـيـحـ.

المواصفات الفنية :

٨٢٥٧ ١/٨	مقاس الكتاب
١٥٢ صفحة بالغلاف	عدد الصفحات
١٨.٥ ملزمه	عدد الملازم
١٤٨ ألوان	ألوان المتن
٤ لون	ألوان الغلاف
٧٠ جرام	وزن المتن
١٨٠ جرام كوشية	وزن الغلاف
جانيبي	التجليد
٤٤٢/١٠/٣/١١/٢/١٢	رقم الكتاب

<http://elearing.moe.gov.eg>



دار السلام

مكتبة وأرشيف

٢٠ شارع ابو يكر الصديق - الملاة - دار السلام - القاهرة

(٠٢) ٢٧٧٧٧٦٠٣ : فاكس

(٠٢) ٠١٢٢٢٤٥٣٧٩ : موبائل